577.2 35 Dirds

Smithsonian Institution *Libraries*



Alexander Wetmore
1946 Sixth Secretary 1953

G. Wilmon



677,2 S35 Birds

KATALOG DER VÖGEL

welche im


Naturhistorischen Museum in Colmar aufgestellt sind.

Bearbeitet und zusammengestellt

von

GUSTAV SCHNEIDER

Correspondirendes Mitglied der naturhistorischen Gesellschaft zu Colmar.



Notiz

und

Anmerkungen.

Die Etiketten, welche an den Gestellen, worauf die Vögel sich befinden, befestigt sind, haben verschiedenartige Ränder, zur Kennzeichnung der Herkunft:

blau: aus dem Elsass stammend,

grün: aus Europa,

roth: aussereuropäisch.

 $[\]sigma^{1}$ bedeutet männliches Geschlecht.

Q do. weibliches Geschlecht.

^{*} do. aus dem Elsass.

AVES.

VÖGEL. - OISEAUX.

Ordnung. ACCIPITRES, Linné.

RAUBVÖGEL. — RAPACES.

Unterordn. Accipitres diurni, Vieillot.

Tagraubvögel. Rapaces diurnes.

Famil. Gypaëtidae, G. R. Gray.

Bartgeier. Gypaètes.

1. GYPAËTUS BARBATUS (Linné), Gray.

Der Lämmergeier, le Gypaète barbu.

alt, aus Algier, Geschenk des Herrn Maritz,

alt, aus Algier, im Museum deponirt von Herrn Bippert.

Anmerk. Dieses letztere Exemplar ist äusserst dunkel (russschwarz) gefärbt.

Famil. Vulturidae, Vigors.

Aasgeier. Vautours.

2. Vultur monachus, Linné.

Der Kutten- oder Mönchs-Geier, le Vautour arrian, alt, aus Frankreich, Clermont (Auvergne), Geschenk des Herrn St. Firmin, 3. Gyps fulvus (Gmelin), Savi.

Der graue Geier, le Vautour griffon,

2 alte, aus Algier, Geschenke des Herrn Maritz,

1 alt, aus der Dobrudscha.

4. GYPS KOLBI, Daudin.

Le Vautour chasse-fiente, alt, aus Spanien, Geschenk des Herrn Professor Schimper, alt und jung, auch aus Spanien.

Unterfamil. Sarcorhamphinae, Gray.

Condore. Condors.

5. Sarcorнamphus gryphus (Linné), Gray.

Der Condor, le Condor,

altes ganz ausgefärbtes ♂, von den Cordilleren.

6. Sarcorhamphus papa (Linné), Gray.

Der Königsgeier, le roi des Vautours, altes 3, aus Centralamerika.

7. CATHARISTA AURA (Linné), Vieill.

Der Trutthahngeier,

1 alter, aus Brasilien.

8. Catharista Burrowiana, Cassin.
2 aus Mexico, Gesch. des Herrn Dr. Reech.

Unterfamil. Neophroninae, Gray.

Schmutzgeier.

9. NEOPHRON PERCNOPTERUS (Linné), Savi.

Der Schmutzgeier, le Vautour alinoche,

of alt, aus Algier, Gesch. des Herrn Maritz,

p alt, aus Algier,

of und p alt, aus Corsika.

10. NEOPHRON PILEATUS, Burchell.

Der Kappengeier,

1, aus Senegambien.

Unterfam. Gypohieracinae, Gray.

11. Gypohierax angolensis (Gmelin), Rüppel.

Der Geierseeadler, le Vautour cathartoïde,
altes ♂, vom Senegal.

Famil. Falconidae, Leach.
Falken. Faucons.

Subfam. **Polyborinae**, Lafresnay. Geierfalken.

12. Polyborus Tharus (Moliere), Gray.

Der Carancho,

1, aus Brasilien.

Subfam. Buteoninae, Swainson.

Bussarde. Buses.

*13. Buteo vulgaris, Bechstein.

2 aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Weniger,
1 » » Gesch. des Hrn. Baron v. Bussierre,

1 Varietät, fast weiss gefärbt, aus dem Elsass, Gesch. des Herra Emil de Bary, 1 Varietät, sehr hell gefärbt, aus dem Elsass (Collection St. Firmin),

1 Varietät, sehr dunkel gefärbt, aus Frankreich (Eure-et-Loire).

14. Buteo desertorum, Daudin.

Der Steppenbussard, la Buse des marais, ou la Buse tacharde,

♂ und \(\text{, aus der Wolgasteppe (S\(\text{udrussland} \)),

1, Algier, Gesch. des Herrn Ch. Grad,

1, Algier, Gesch. des Herrn Maritz.

15. Buteo brachypterus, Pelzeln.

1, aus Madagascar. Gesch. des Museums in Réunion.

16. Buteo ferox, Gmelin.

Der Adlerbussard,

♂ und ♀, aus Südrussland.

17. BUTEO AUGUR, Rüppel.

1, vom Senegal, Gesch. des Herrn André.

18. BUTEO LINEATUS, Gmelin.

2, aus Nordamerika.

19. Buteo unicinctus, Temminck.

1, aus Nordamerika.

20. Buteogallus nigricollis (Latham.), Gray, I, aus Brasilien.

21. HYPOMORPHNUS URUBUTINGA (Gmelin), Cabanis, 1, aus Brasilien.

*22. Archibuteo lagopus (Gmelin), Brehm.

Der Rauchfussbussard, la Buse pattue,

♂ und ♀, aus dem Elsass,

Q, von Ensisheim, Gesch. des Hrn. Baron v. Anthes, &, Elsass, Gesch. des Herrn Scherrer.

Unterfam. Aquilinae, Swainson.

Adler. Aigles.

23. AQUILA CHRYSAËTOS, Linné.

Der Steinadler, l'Aigle royal,

2 alte, aus der Schweiz,
alt, aus Algier, Gesch. des Herrn Grad.

24. Aquila imperialis, Bechstein.

Der Kaiseradler, l'Aigle impérial, jung, aus der Dobrudscha, alt, aus Abyssinien (Schimper).

25. Aquila naevioides, Cuvier.

Der Steppenadler, l'Aigle ravisseur, 2 alte, von der Wolga (Südrussland).

var. Rapax, Temminck.
1 alt, vom Senegal.

var. Adalberti, Brehm.
Der Prinzenadler,

1 alt, aus Spanien.

26. AQUILA CLANGA, Pallas. Der Schelladler.

on und 2 ♀, von der Wolga.

*27. AQUILA NAEVIA, Gmelin.

Der Schreiadler, l'Aigle criard, 1, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Scherer, 1, aus Frankreich (Aisne).

28. AQUILA AUDAX, Latham.

Der australische Adler, alt, aus Australien.

29. PSEUDAETUS BONELLII (Temm.), Gray.

Der Habichtsadler, l'Aigle Bonelli, 1, aus Sardinien, Gesch. des Hrn. Prof. Schimper, 1, aus Algier, Gesch. des Herrn Ch. Grad.

30. HIERAETUS PENNATUS (Cuvier), Kaup. Der Zwergadler, l'Aigle botté,

d und ♀ alt, nebst 1 jungen, aus Spanien.

31. Spizaëtus ornatus, Daudin.

Der geschmückte Haubenadler, 1. aus Mexico.

32. Spizaëtus tyrannus, Wied.

1, aus Cayenne.

33. Spizaëtus occipitalis, Daudin.

Der Schopfadler, 1, aus Südafrika. *34. CIRCAETUS GALLICUS (Gmelin), Gray.

Der Schlangenadler, l'Aigle Jean-le-Blanc,

1, aus d. Münsterthal, Gesch. d. Hrn. v. Peyerimhoff,

Q, von Pulversheim, Gesch. des Hrn. Schlumberger, on Kastenwald, Gesch. des Hrn. René Simottel,

1, aus dem Elsass,

2 &, aus Frankreich (Seine),

1, aus Algier, Gesch. des Herrn Maritz.

*35. PANDION HALIAETUS (Linné), Gray.

Der Fischadler, le Balbuzard,

1, von Gebweiler,

1, aus dem Elsass,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Schlumberger,

1, aus Frankreich,

2, vom Senegal.

36. THRASAETUS HARPYIA (Linné), Gray.

Die Harpye, la Harpyie,

d' alt, aus Surinam.

*37. HALIAETUS ALBICILLA (Linné), Gray.

Der Seeadler, l'Aigle pygarque,

3 alt, von Colmar (12. November 76), Gesch. des Herrn Ch. Dietz,

1, von Markolsheim, Gesch. des Hrn. v. Peyerimhoff,

1, aus dem Elsass.

38. HALIAETUS LEUCOCEPHALUS (Linné), Gray.

Der weissköpfige Seeadler, l'Aigle pygargue à tête blanche,

alt und jung, aus Oregon (Vereinigte-Staaten).

39. Haliaëtus vocifer, Daudin.

Der Schreiseeadler, le Vocifer,

2 3', vom Senegal, Gesch. des Herrn Hubler.

40. GERANOËTUS MELANOLEUCUS (Vieillot), Kaup.

♂, aus Chili.

41. HELOTARSUS ECAUDATUS, Shaw.

Der Gaukler,

7, aus dem Sudan.

Unterfam. Falconinae, Swainson.

Edelfalken. Faucons.

42. FALCO ISLANDICUS, Brünnich.

Der isländische Edel- oder Jagdfalke, le Gerfaut,

2 alte, aus Island,

1 jung, aus Island,

1 alt, aus Labrador, Gesch. des Herrn Barth.

43. FALCO CANDICANS, Gmelin.

Der grönländische Edelfalke,

d alt, aus Grönland.

44. FALCO GYRFALCO, Linné.

Der norwegische Edel- oder Jagdfalke, le Gerfaut de Norvège,

o, aus Norwegen.

*45. FALCO PEREGRINUS, Linné.

Der Wanderfalke, le Faucon commun,

of alt, Colmar, Gesch. der Frau Dietz,

3 alt, Biesheim, Gesch. des Herrn Eggerle,

on alt, Colmar, Gesch. des Herrn Ostermann,

2 Q alt, aus Frankreich (Rambouillet),

Q jung, aus Frankreich (Meurthe).

46. FALCO LANARIUS, Linné.

Der Würgfalke, le Faucon lanier,

∂ und Q, aus Südrussland.

47. FALCO SACER, Schlegel.

1, aus Südrussland,

1, aus Algier.

*48. Hypotriorchis subbuteo (Linné), Boie.

Der Baumfalke, le Hobereau,

3, von Colmar, Gesch. des Herrn Corrigeux,

2, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Schmitt,

o jung, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Claudon,

o jung, aus dem Elsass,

Q alt, aus dem Elsass,

1, aus Frankreich.

49. Hypotriorchis Eleonora, Géné.

Der Eleonorenfalke, le Faucon Eléonore, d'und Q alt, sowie 1 junger, aus Griechenland.

*50. Hypotriorchis aesalon (Linné), Boie.

Der Zwergfalke, l'Émérillon,

2 \triangleleft und 3 \triangleleft , aus dem Elsass,

Q, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn West,

4 Stück, meist noch junge Exemplare, aus Frankreich (Coll. St. Firmin).

51. Hypotriorchis ruficollis (Swainson).

Der Rothhalsfalke,

♂ und ♀, vom Senegal.

*52. TINNUNCULUS ALAUDARIUS (Gmelin), Vieill.

Der Thurmfalke, la Crécerelle,

2 ♂ und ♀, aus dem Elsass,

o, Elsass, Gesch. des Herrn Schlumberger,

J', Elsass, Gesch. des Herrn von Türkheim,

Q alt und of jung, Elsass, Gesch. der Frau Ernst,

Q, Elsass, Gesch. des Herrn Alex. Senn,

Q alt und of jung, aus Frankreich (Coll. St. Firmin).

53. TINNUNCULUS RUFESCENS, Swains.

♂ und ♀, vom Senegal.

54. Tinnunculus rupicolus, Daudin.

♂, aus Abyssinien.

55. Tinnunculus Newtoni, Gurn.

2 ♂ und 2 ♀, aus Madagascar, Gesch. des Museums in Réunion.

*56. Erythropus vespertinus (Linné), Brehm.

Der Rothfussfalke, le Kobez ou le Faucon à pieds rouges,

♂ und Q, aus Südrussland,

♂, aus Algier, Gesch. des Herrn Dr. Hagenmüller, ♂ u. ♀, aus Algier, Gesch. des Hrn. v. Peyerimhoff.

Anmerkung: Dem Museum fehlen noch Exemplare aus dem Elsass, wo der Rothfussfalke schon öfter beobachtet und auch erlegt wurde. 57. Tichornis cenchris (Naumann), Kaup.

Der Rüttelfalke, la Crécerellerette,

2 ♂ und 1 ♀, aus Spanien (Coll. St. Firmin).

58. Poecilornis sparverius (Linné), Kaup.

J, aus Mexico, Gesch. des Herrn Dr. Reech.

59. Jerax caerulescens (Linné), Vigors.

Der Muti,

1 Exemplar, von Java.

Unterfam. Milvinae, Bonaparte.

Milane. Milans.

*60. Pernis apivorus (Linné), Gray.

Der Wespenbussard, la Bondrée commune,

3 ♂ und 1 ♀ alt, aus dem Elsass,

1 3 und 4 \(\nabla\), im zweiten Jahr, Elsass,

♀, einjährig, Elsass,

of jung, Elsass,

Q alt, Ensisheim, Gesch. des Herrn Scherer,

Jund Q, alt, Elsass, Gesch. des Herrn Traut,

♀ im Herbst, Elsass, Gesch. des Hrn. Schlumberger,

1 Varietät, sehr hell gefärbt, mit weissem Kopf, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn von Peyerimhoff,

1 Varietät, ebenfalls sehr hell gefärbt und dem vorigen ziemlich gleich, von Schiltigheim.

*61. Milvus regalis, Bonaparte.

Der rothe Milan, le Milan royal,

 σ und $2 \circ alt$, aus dem Elsass,

3, Elsass, Gesch. des Herrn Dr. Aug. Macker,

ond ♀, aus Algier, Gesch. des Herrn Maritz.

*62. MILVUS ATER, Gmelin.

Der schwarzbraune Milan, le Milan noir,

♂ 1 Palt, Elsass, Gesch. des Hrn. v. Peyerimhoff,

7, Colmar, Gesch. des Herrn Emil Rohte, 1883,

7, Colmar, Gesch. des Herrn Ch. Taillandier,

1 J, Mai, Colmar,

1, Colmar,

1, aus Algier, Gesch. des Herrn Maritz.

63. MILVUS AEGYPTIUS, Gmelin.

Der afrikanische Milan, le Milan d'Afrique, ♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

64. NAUCLERUS FURCATUS (Linné), Vigors.

Der Schwalbenweih,

1, aus Brasilien.

65. CYMINDIS CAYENNENSIS (Gmel.), Gray.

Der Gavilan,

1, aus Cayenne, Gesch. des Hrn. Professor Schimper.

66. Cymindis uncinatus (Illiger).

1, aus Mexico, Gesch. des Herrn Dr. Reech.

67. ELANUS MELANOPTERUS (Daudin), Sws.

Der Gleitaar,

1, aus Sardinien,

1, aus Algier, Gesch. des Herrn Ch. Grad.

68. ELANUS LEUCURUS, Vieillot.

1, aus Mexico, Gesch. des Herrn Dr. Reech.

Unterfam. Accipitrinae, Swains.

Habichte. Autours.

*69. ASTUR PALUMBARIUS (Linné), Gray.

Der Habicht, l'Autour,

3 alte ♂ und 2 alte ♀, aus dem Elsass,
♂ alt (Januar 65), Elsass, Gesch. des Hrn. Eggerle,
altes♀, Elsass, Gesch. des Hrn. Vicom¹e de Bussierre,
junges♀, Elsass, Gesch. des Herrn von Peyerimhoff,
junges ♂, Elsass, Gesch. des Herrn Marcon,
jung (November 75), Gesch. des Herrn Baer,
junges♀ und ein 6 Wochen alter Vogel, aus den
Vogesen,

2 junge Q, aus dem Elsass.

70. RUPORNIS INSECTIVORUS (Spix), Kaup.

2, aus Mexico, Gesch. des Herrn Dr. Reech.

71. GERANOSPIZA GRACILIS (Temm.), Kaup.

♂ und Q, aus Brasilien.

72. Herpetotheres cachinnans, Gray.

Q, aus Mexico, Gesch. des Herrn Dr. Reech.

*73. Accipiter nisus (Linné), Gray.

Der Sperber oder Finkenhabicht, l'Épervier,

J, aus dem Elsass,

2 ♂ und ♀, alt, Colmar, Gesch. des Herrn Dr. Aug. Macker,

Q, alt, Elsass, Gesch. des Herrn Corrigeux,

♂, alt, Elsass, Gesch. des Hrn. Vicomte de Bussierre,

Q, Elsass, Gesch. des Herrn Ernst,

2 ♂ und 2 ♀, aus Frankreich, St-Germain (Collect. St. Firmin),

♂, aus Algier, Gesch. des Herrn Dr. Hagenmüller, ♀, aus Algier, Gesch. des Herrn Lallemand.

74. Accipiter nisosimilis, Tick.

1, aus Cochinchina.

75. Accipiter tachirio, Vieill.

♂ und ♀, vom Senegal, Gesch. des Herrn André.

76. Accipiter Toussenelli, Verreaux.

1, vom Senegal.

77. Accipiter fuscus, Gmelin.

2, aus Mexico, Gesch. des Herrn Dr. Reech.

78. Accipiter zonarius, Temm.

1, vom Senegal.

79. Accipiter Mexicanus, Swains.

1, aus Canada, Gesch. des Herrn Missionar Kohler.

80. NISUOIDES FRANCESI (Smith), Pollen.

♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

81. MELIERAX POLYZONUS, Rüppel.

Der Heuschreckenhabicht,

1, aus Abyssinien,

2 alte und 1 junger, vom Senegal.

Unterfam. Circinae, Bonap.

Weihen. Busards.

*82. CIRCUS AERUGINOSUS (Linné), Gray.

Die Sumpf-oder Rohr-Weihe, le Busard des marais, $2 \circlearrowleft$ und $1 \circlearrowleft$ alt, aus dem Elsass,

2 od und 4 ♀ jung, aus dem Elsass,

junges Q, Elsass, Gesch. des Hrn. Baron von Anthes.

83. CIRCUS RANIVORUS, Daudin.

Die Froschweihe,

1, aus Algier, Gesch. des Herrn Maritz.

*84. STRIGICEPS CYANEUS (Linné), Bonap.

Die Kornweihe, le Busard Saint-Martin, altes ♂, Gebweiler, Gesch. des Hrn. Baron v. Anthes, altes ♂, Rappoltsweiler, Gesch. des Hrn. Salzmann, junges ♀, Colmar (Dezbr. 83), Gesch. des Herrn G. Scheurer,

altes \mathcal{J} und 3 alte \mathcal{Q} , aus dem Elsass, \mathcal{J} alt, von Gebweiler. Gesch. des Hrn. Schlumberger, \mathcal{L} und \mathcal{L} aus dem Elsass.

85. STRIGICEPS MELANOLEUCUS (Gmel.). altes &, aus Cochinchina.

*86. GLAUCOPTERYX CINERACEUS (Mont.), Kaup.

Die Wiesenweihe, le Busard des montagnes,

1 altes o, aus dem Elsass,

1 on und 3 ♀, jung, aus dem Elsass,

Q alt, von Colmar, Gesch. des Herrn Wetterle,

Q alt, von Colmar, Gesch. des Herrn Eggerle,

1 jung, aus Südrussland,

3, Varietät, aus Frankreich (Sarthe).

Dies ist eine sehr schöne Varietät, äusserst dunkel, grauschwarz gefärbt. Die Zeichnung tritt nur auf den Flügeln noch etwas hervor. (Ausgesprochener Melanismus). 87. GLAUCOPTERYX PALLIDUS (Sykes).

Die Steppenweihe, le Busard blafard ou cendré, ♂ alt, aus Ungarn, Gesch. des Hrn. Prof. Schimper, ♀, aus der Turkei.

Var. Swainsoni (Smith). 3, vom Senegal.

Famil. Serpentariidae, Selys.

Kranichgeier. Serpentaires.

88. Serpentarius reptilivorus (Daudin), Gray.

Des Sekretär oder der Kranichgeier, le Serpentaire,

3., aus Südafrika, Gesch. des Herrn Professors
Schimper.

Unterordn. Accipitres nocturni, Gray.

Nachtraubvögel. Rapaces nocturnes.

Famil. Strigidae, Leach.

Eulen. Hiboux.

Unterfam. Surninae, Bonap.

Tageulen. Hiboux diurnes.

*89. Surnia ulula (Linné), Gray (S. nisoria, Bechst.).

Die Sperbereule, la Chouette caparacoche ou Chouette épervière,

- 1, Elsass, Gesch. des Herrn von Peyerimhoff,
- 1, von Brumath,
- 2, aus Labrador.

Anmerkung: Die Sperbereule kommt im Elsass nur zufällig, als sehr grosse Seltenheit vor, sie bewohnt den Norden Europas und Amerikas. 90. NYCTEA NIVEA (Daudin), Gray.

Die Schneeeule, le Harfang,

1, aus Norwegen,

1, aus Norwegen, Gesch. des Hrn. von Peyerimhoff.

*91. ATHENE NOCTUA, Retz.

Der Steinkauz, la Chouette chevèche,

of und Q, aus dem Elsass,

o von Colmar,

♀, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Hackert,

♀, id. id. Gesch. des Herrn Kiener.

92. ATHENE GLAUX, Sav.

Der Wüstenkauz, la Chouette méridionale,

o, aus Tunis,

o, aus Algier,

1, id. id. Gesch. des Herrn Ch. Grad.

93. Microglaux occipitalis (Temm.).

1, vom Senegal.

94. GLAUCIDIUM PUMILUM (Licht.), Boie.

1, aus Brasilien.

*95. MICROPTYNX PASSERINA (L.), Kaup (ATHENE ACADICA, Temm.).

Das Sperlingskäuzchen, la Chouette chevèchette ou la Chouette naine,

2, aus Schweden.

Anmerkung: Diese kleinste der Eulen ist auch im Elsass beobachtet und erlegt worden. Ihr Vorkommen ist indessen sehr vereinzelt. Das Museum hat noch kein Exemplar aus dem Elsass.

96. MICROPTYNX GNOMA (Wagl.).

1, aus Mexiko.

97. MICROPTYNX (unbestimmte Art).

1, Die Herkunft ist zweifelhaft.

98. Speotyto cunicularia (Mol.).

Die Kanincheneule, l'Echasse,

2, aus Brasilien.

Unterfam. Buboninae, Bonap.

Ohreulen. Grand-ducs.

*99. Buco MAXIMUS, Sibbald.

Der Uhu, le Grand-Duc, altes &, von Orbey (Hautes-Huttes), April 75, alt, von Sentheim, Gesch. des Herrn Bian, Q, von Wesserling, Gesch. des Herrn Marozeau, 2 Q, aus dem Elsass.

Var. scandiaca (Linné).

♂ und Q, aus Südrussland.

100. Bubo capensis, Daudin.

Der südafrikanische Uhu,

1, aus Südafrika.

101. Bubo virginianus, Gmelin.

Der nordamerikanische Uhu,

1, aus Nordamerika.

102. Mesomorpha bengalensis (Franklin).

Der bengalische Uhu,

1, jung, aus Cochinchina.

103. NYCTALEUS LACTEUS (Temm.).

1, vom Senegal.

104. KETUPA CEYLONENSIS (Gmel.).

Die Fischeule,

1, aus Cochinchina, Gesch. der Frau Dietz.

105. KETUPA JAVENSIS, Lesson.

Die javanische Fischeule,

2, aus Java.

*106. EPHIALTES SCOPS (Linné), Keyserl. u. Blas.

Die Zwergohreule, le petit Duc ou le Scops,

1, aus dem Elsass,

2, aus Frankreich (Coll. St. Firmin).

Var. longipennis, Kaup.

1, aus Algier, Gesch. des Herrn Maritz.

Anmerkung: Die Zwergohreule ist selten im Elsass, aber sie kommt sehr wahrscheinlich doch da und dort vor, ohne dass sie beachtet wird. Möglicherweise ist sie sogar Nistvogel im Land.

107. MEGASCOPS ASIO (Linné).

1, aus Nordamerika.

108. PTILOPSIS LEUCOTIS, Kaup.

2, vom Senegal,

1. » » Gesch. des Herrn André.

*109. OTUS VULGARIS, Fleming.

Die Waldohreule, le moyen Duc,

of und ♀ alt, sowie ganz jung, aus dem Elsass,

ond Q alt, Elsass, Gesch. des Herrn Traut.

*110. Brachyotus palustris, Forst.

Die Sumpfohreule, le Hibou brachyote,

Q, Elsass, Gesch. des Herrn Dr. Aug. Macker,

ල්, » Gesch. des Herrn Cassron,

1, » Gesch. des Herrn von Peyerimhoff,

d u. Q, aus dem Elsass (Coll. St. Firmin).

111. Brachyotus Cassini, Brew.

Die nordamerikanische Sumpfohreule, 1, aus Canada.

Unterfam. **Syrninae,** Gray.

Nachtkäuze. Chouettes nocturnes.

*112. Syrnium aluco (Linné).

Der Waldkauz, la Chouette hulotte,

1, von Colmar,

♂ u. \, von Colmar,

 $3 \circlearrowleft \text{ und } 1 \circlearrowleft$, aus dem Elsass.

113. Syrnium Woodfordi, Smith.

1, vom Senegal.

114. Syrnium lapponicum, Retz.

Der Bart- oder Lapplandskauz, la Chouette lapone, altes 3, aus Lappland.

115. Syrnium nebulosum, Forst.

J, aus Nordeuropa,

o und ♀, aus Canada.

116. SYRNIUM URALENSE, Pallas.

Die Habichtseule, le Hibou de l'Oural,

o, aus Ungarn.

*117. NYCTALE TENGMALMI (Gmel.).

Der Rauchfusskauz, la Chouette de Tengmalm, alt, von Münster, jung, aus dem Münsterthal (Coll. St. Firmin), alt, aus dem Elsass,

alt, aus der Schweiz.

*118. STRIX FLAMMEA, Linné.

Die Schleiereule, la Chouette effrage,

♀, Elsass, Gesch. des Herrn Christmann,

1, Elsass, sehr hell gefärbt,

o, Elsass, Gesch. des Herrn Laurent,

o, Elsass.

119. STRIX PERLATA, Licht.

1, aus Chile.

Ordn. PASSERES, Linné.

SPERLINGSVÖGEL. — PASSEREAUX.

Unterordn. Fissirostres, Cuvier.

Spaltschnäbler. Fissirostres.

Famil. Caprimulgidae, Vigors.

Nachtschwalben. Engoulevents.

Unterfam. Podarginae, Gray.

Eulenschwalben.

120. Podargus papuensis, Quoy. u. Gaimard. Der Papu Riesenschwalm, altes 3, aus Neu Guinea.

Unterfam. Caprimulginae, Swainson.

Nachtschwalben. Engoulevents.

*121. CAPRIMULGUS EUROPAEUS, Linné.

Die Nachtschwalbe, l'Engoulevent ordinaire, 1, Elsass, Gesch. des Herrn Kampmann,

2 Q, Elsass, Gesch. der Frau Dietz,

7, Elsass, Gesch. des Herrn Scheurer. 122. Caprimulgus ruficollis, Temm.

Der Rothbalsnachtschatten, l'Engoulevent à collier roux.

Q, aus Spanien.

123. CAPRIMULGUS MADAGASCARIENSIS, Sganz.

♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

124. Antrostomus Rufus (Boddaert).

1, aus Cayenne.

125. Nyctidromus albicollis (Gmel.).

1, aus Brasilien.

126. Scotornis Longicaudus (Stephenson).

Die Schleppennachtschwalbe,

1, vom Senegal.

127. STENOPSIS CAYENNENSIS (Gmel.), Cassin. 2, aus Cayenne.

Unterfam. Podagerinae, Gray.

Dämmerungsschwalben.

128. CHORDEILES VIRGINIANUS (Gmelin), Sws. Der Nachtfalk,
1, aus Canada.

Fam. Cypselidae, Cabanis.

Segler. Martinets.

*129. Cypselus apus, Linné.

Der Mauersegler, le Martinet de murailles, 2 ♂ und 1 ♀, aus dem Elsass. 130. CYPSELUS MELBA, Linné.

Der Alpensegler, le Martinet à ventre blanc,

2 Stück, aus der Schweiz,

1 Stück, » » (Coll. St. Firmin).

131. CYPSELUS ABYSSINICUS, Licht.

Der abyssinische Segler,

2, aus Abyssinien.

132. CYPSELUS PARVUS, Licht.

Der Zwergsegler,

1, aus dem Sudan.

Fam. Hirundinidae, Leach.

Schwalben. Hirondelles.

*133. HIRUNDO RUSTICA, Linné.

Die Rauchschwalbe, l'Hirondelle de cheminée,

2, aus dem Elsass.

134. HIRUNDO SENEGALENSIS, L.

Die Senegalrauchschwalbe,

4, vom Senegal.

135. HIRUNDO MELANOCRISSA, Rüpp.

1, aus dem Sudan.

136. HIRUNDO LUNIFRONS, Say.

1, aus Labrador.

137. HIRUNDO ALBIVENTER, Bodd.

1, aus Brasilien.

*138. Cotyle riparia (L.), Boie.

Die Uferschwalbe, l'Hirondelle de rivage,

139. COTYLE RUPESTRIS (Scopoli).

Die Felsenschwalbe, l'Hirondelle de rochers,

1, aus Frankreich (Basses-Alpes).

1, von Nizza.

*140. Chelidon urbica (L.), Boie.

Die Hausschwalbe, l'Hirondelle de fenêtre,

2 ♂ und ♀, von Colmar,

1 ganz weisse Varietät, von Colmar, 1862.

141. Progne purpurea, Boie.

Die Purpurschwalbe,

on und ♀, aus Canada.

Famil. Coraciadae, Gray.

Raken. Rolliers.

*142. Coracias garrula, Linné.

Die Blaurake, le Rollier vulgaire,

1, aus dem Elsass,

1, Elsass, Gesch. des Herrn von Peyerimhoff,

1, von Paris,

2, aus Algier.

143. Coracias pilosa, Latham.

1, aus Westafrika, Gesch. des Herrn Zæppfel,

1, vom Senegal.

144. CORACIAS AFFINIS, M. Clell. alt und jung, aus Cochinchina.

145. CORACIAS CYANOGASTER, Cuvier.

Die Blaubauchrake, le Rollier à ventre bleu,
2, vom Senegal.

146. Coracias abyssinica, Bodd. $2 \circlearrowleft$ und $1 \circlearrowleft$, vom Senegal.

147. Eurystomus madagascariensis (Gmel.).

Der violette Roller,

♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

148. Eurystomus afer (Latham).

d und 2 \, vom Senegal.

149. LEPTOSOMUS DISCOLOR, Herm.

Der Kurol,

🗸, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

150. Atelornis squamigera, Lafr.

7, aus Madagaskar.

Fam. Eurylaimidae, Swainson.

Hornrachen. Eurylaimes.

151. EURYLAIMUS HORSFIELDI, Temm.

o, aus Sumatra.

152. Eurylaimus ochromelas, Raffles.

o, aus Sumatra.

153. EURYLAIMUS SUMATRANUS, Raffl.

J, aus Sumatra.

154. Cymbirhynchus macrorhynchus (Gmel.), Vigors. 2, aus Malakka.

Unterfam. Calyptomeninae, Gray.

Felsenhähnchen.

155. CALYPTOMENA VIRIDIS, Raffl.

Das grüne Felsenhähnchen.

♂ und ♀, aus Malakka.

Famil. Momotidae, Selys.

Sägerraken. Momots.

156. Monotus Brasiliensis, Lath.

Der Motmot,

3 Stück, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

Famil. Trogonidae, Swainson.

Surukus. Couroucous.

157. TROGON MASSENA, Gould.

J, aus Guatemala.

158. TROGON CALIGATUS, Gould.

♂ und ♀, aus Guatemala.

159: Trogon aurantius, Spix.

9, aus Brasilien, Gesch. des Herrn Spætz.

160. Trogon collaris, Vieillot.

3, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

161. TROGON PUELLA, Gould.

J, aus Mexico, Gesch. des Herrn Thomas,

J und Q, aus Mexico.

162. PHAROMACRUS MOCINNA, de la Llave.

Der Quesal oder Pfauenkuruku, le Couroucou-Paon, 3 alt, aus Guatemala.

Famil. Bucconidae, Cabanis.

Faulvögel.

163. Bucco Macrorhynchus, Gmel. Der Dickschnabel-Faulvogel,

J, aus Guyana.

164. Bucco Tectus, Bodd.

1, aus Cayenne.

165. Bucco Maculatus, Gmel.

d, aus Brasilien.

166. Monasa nigra, Müller.

Der schwarze Trappist,

2, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

167. Monasa fusca, Gmel.

Der braune Trappist,

1, aus Cayenne.

168. Chelidoptera tenebrosa, Pallas.

1, aus Cayenne.

Fam. Alcedinidae, Bonaparte.

Eisvögel. Martins-pêcheurs.

Unterfam. Daceloninae, Bonap.

Lieste.

169. DACELO GIGAS, Bodd.

Der Jägerliest, le Martin-chasseur géant, 1, aus Neu Südwales, 170. DACELO GAUDICHANDI, Quoy u. Gaim.

&, aus Neu Guinea.

171. TANYSIPTERA NAIS, Gray.

Der Naisraketenschwanz,

J, aus Amboina.

172. HALCYON CINEREIFRONS, Vieill.

2, vom Senegal.

173. HALCYON SEMICAERULEA, Forskal.

Der Baumliest,

1, vom Senegal.

174. HALCYON CAPENSIS (Linné).

1, aus Bengalen.

175. HALCYON JAVANA (Bodd.).

1, aus Malakka.

176. HALCYON AMAUROPTERA, Pears.

2, aus Cochinchina.

177. HALCYON SANCTA, Vig. u. Horsf.

2, aus Australien.

Subfam. Alcedininae, Gray.

Eisvögel. Martins-pêcheurs.

*178. ALCEDO ISPIDA, L.

Der Eisvogel, le Martin-pêcheur,

1, Elsass, Gesch. des Herrn Doyen,

1, Elsass, Gesch. des Herrn Kampmann,

1, Elsass.

179. ALCEDO BENGALENSIS, Gmel.

1, aus Ostindien.

180. ALCEDO CAERULEO CEPHALA, Gmel.

1, vom Senegal.

181. ALCEDO CRISTATA, L.

3, vom Senegal.

182. ALCEDO VINTSIOIDES, Eyd. u. Gerv.

1, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

183. CERYLE RUDIS (Linné), Boie.

Der Graufischer,

3, vom Senegal,

1, aus Cochinchina.

184. CERYLE MAXIMA, Pallas.

Der Grossfischer,

1, vom Senegal.

185. CERYLE TORQUATA (L.).

Der Halsbandfischer,

♂ u. ♀, aus Mexico, Gesch. des Herrn Dr. Reech.

186. CERYLE ALCYON (L.).

1, aus Mexico, Gesch. des Herrn Dr. Reech.

187. CHLOROCERYLE AMERICANA (Gmel.).

3 d, aus Brasilien.

188. CHLOROCERYLE INDA (L.).

2 ♂ und 3 ♀, aus Brasilien.

Famil. Meropidae, Leach.

Bienenfresser. Guêpiers.

*189. MEROPS APIASTER, Linné.

Der Bienenfresser, le Guépier vulgaire,

2, aus dem Elsass,

2, aus Südrussland.

Anmerkung: Der Bienenfresser kommt im Elsass nur zufällig und höchst selten vor. Das Museum besitzt 2 Exemplare aus dem Elsass, doch fehlen Fundortsangaben und Daten, wann sie erlegt wurden.

190. Merops superciliosus, L.

Ç, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

491. Merops aegyptius, Forsk.

Der Blauwangenspint,

2, vom Senegal.

192. MEROPS SAVIGNYI, Sws.

1, aus Westafrika.

193. MEROPS ALBICOLLIS, Vieill.

Der weisskehlige Spint,
2, vom Senegal.

194. Merops viridissimus, Sws.

2, vom Senegal.

195. Merops nubicus, Gmel.

Der Scharlachspint,

1, vom Senegal,

1, » » Gesch. des Herrn André.

196. MEROPS ORNATUS, Lath.

Der Schmuckspint,

1, aus Australien.

197. Merops hirundinaceus, Vieill.

Der Schwalbenspint,

1, vom Senegal.

198. Melithophagus pusillus (Müller), Boie. Der kleine Honigspint, 3 alte ♂ und 2 junge Exempl. vom Senegal.

Fam. Galbulidae, Cabanis.

Glanzvögel. Jacamars.

199. GALBULA VIRIDIS, Lath.

Der grünschillernde Glanzvogel,

♂ und ♀, aus Cayenne.

200. GALBULA RUFOVIRIDIS, Cabanis.

Der braungrüne Glanzvogel,

3, aus Brasilien.

201. Galbula Ruficauda, Cuvier.

Der rothschwänzige Glanzvogel,

1, aus Brasilien.

202. GALBULA ALBIROSTRIS, Lath.

Der weissschnäblige Glanzvogel,

3, aus Cayenne.

203. Galbula Leucogaster, Vieill.

Der weissbauchige Glanzvogel,

3, aus Cayenne, wovon 2 Gesch. des Herrn Zæppfel.

Unterordn. Tenuirostres, Cuvier.

Dünnschnäbler. Tenuirostres.

Famil. Upupidae, Bonaparte.

Hopfe. Huppes.

*204. Upupa epops, Linné.

Der Wiedehopf, la Huppe,

♂ und \, von Colmar,

J, von Colmar, Gesch. des Herrn Scherer.

205. Upupa senegalensis, Sws.

Der Senegalwiedehopf,

1, vom Senegal.

206. Upupa marginata, Peters.

♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

207. IRRISOR ERYTHRORHYNCHUS (Lath.).

Der Baumhopf,

1, vom Senegal.

208. Irrisor senegalensis, Vieill.

4, vom Senegal, wovon 1 Gesch. des Hrn. Zæppfel.

209. Irrisor aterrimus, Steph.

1, vom Senegal.

210. FALCULIA PALLIATA, J. Geoffr.

Q, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

Fam. **Promeropidae**, Vigors.

Honigsauger.

211. NECTARINIA SPLENDIDA, Shaw.

4 \mathcal{J} , 3 \mathcal{D} und ein \mathcal{J} jung, vom Senegal.

212. NECTARINIA SOVIMANGA, Gmel.

3, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

213. NECTARINIA SENEGALENSIS (L.).

4 ♂ und 1 \,Q, vom Senegal.

214. NECTARINIA CYANOCEPHALA, Gmel.

3 o, vom Senegal, wovon eines Gesch. des Herrn Zæppfel.

215. NECTARINIA PULCHELLA (L.).

4 ♂, 3 ♀, vom Senegal.

216. NECTARINIA PLATURA, Vieill.

o, vom Senegal.

217. NECTARINIA ANGLADIANA, Shaw.

♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

218. CHALCOPAREIA CINGALENSIS (Gmel.), Cab.

1, aus Malakka.

219. Anthobaphes violacea, Cabanis.

J, vom Senegal.

220. ARACHNOTHERA FLAMMAXILLARIS, Blyth.

1 \mathcal{J} , 2 \mathcal{Q} und \mathcal{J} jung, aus Cochinchina.

221. Cyrtostomus pectoralis (Horsfield), Cab.

3 ♂ und 3 ♀, aus Cochinchina.

222. Anthreptes malaccensis (Scopoli), Sws.

o und ♀, aus Cochinchina.

223. Anthreptes Longuemari, Lesson.

1 ♂ und 3 ♀, vom Senegal.

224. DICAEUM FLAMMEUM, Sparrmann.

J, aus Cochinchina.

Famil. Coerebidae, Gray.

Zuckervögel. Sucriers.

225: Coereba cyanea (Linné), Vieill.

Der Lasurblauvogel oder der Sai,

2 ♂ und 1 ♀, aus Cayenne,

♂ und ♀, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

226. Coereba caerulea (L.), Vieill.

Der Ultramarinblauvogel,

 $2 \circlearrowleft$ u. $2 \circlearrowleft$, aus Cayenne, Gesch. des Hrn. Zæppfel.

227. DACNIS CAYANA (L.), Cuvier.

2 o, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

228. DACNIS BICOLOR, Vieill.

2, aus Brasilien.

229. CERTHIOLA CHLOROPYGA, Cabanis.

Der Pipit,

2, aus Brasilien.

Famil. Trochilidae, Vigors.

Kolibris. Colibris.

230. PHAETHORNIS EURYNOME, Lesson.

Der Sonnenkolibri,

2, aus Brasilien,

1, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

231. PHAETHORNIS EREMITA, Gould.

Der Eremit,

3, aus Brasilien.

232. Phaethornis rufigaster, Vieill.

Der braunbauchige Eremit,

1, aus Brasilien.

233. OREOTROCHILUS CHIMBORAZO (Bourcier), Gould.

Der Chimborazokolibri,

J, vom Chimborazo.

234. CAMPYLOPTERUS LARGIPENNIS (Bodd.), Sws.

♂ und 2 \, aus Brasilien.

235. Campylopterus hemileucurus, Licht.

♂, aus Mexico.

236. SAEPIOPTERUS LAZULUS (Vieill.), Reichb.

J, und J aus Venezuela.

237. EUPETOMENA MACRURA (Gmel.), Gould.

Der Gabelschwanzgnome,

♂, aus Brasilien.

238. Lampornis mango (Linné), Sws.

Der Mango.

1 ♂ und 2 ♀, aus Cayenne.

239. GLAUCIS HIRSUTUS (Gmel.), Gould.

1, aus Cayenne.

240. GLAUCIS MAZEPPA (Lesson), Gould.

1, aus Cayenne.

241. Petasophora anais (Lesson), Gray. За Neu Granada.

242. Petasophora thalassina (Swains.), Gray.

243. Argytria albicollis (Vieillot), Cabanis.

244. Polytmus Linnaei, Bonaparte.

2 7, aus Cayenne.

245. Polytmus tephrocephalus (Vieillot), Gould. $2 \, \text{\rotate{O}}$ und $4 \, \text{\rotate{Q}}$, aus Brasilien.

246. Chrysobronchus virescens (Dumont), Bonap. 3 o, aus Brasilien.

247. THALURANIA FURCATA (Gmel.), Gould. 3 3, aus Cayenne.

248. Thalurania glaucopis (Gmel.), Gould.

3 3, aus Brasilien, Gesch. des Herrn Zæppfel.

249. Uranomitra cyanocephalus (Lesson), Gray. 2 o, aus Mexico.

250. URANOMITRA FRANCIAE (Bourc.), Gould. J., aus-Neu Granada.

251. Topaza pella (Linné), Gray.

Der Topaskolibri,

♂ und ♀, aus Cayenne,

2 ♂ u. 1 \(\text{q}\), aus Cayenne, Gesch. des Hrn. Zæppfel.

252. FLORISUGA MELLIVORA (Linné), Bonap.

 $2 \circlearrowleft$ und $1 \circlearrowleft$, aus Brasilien,

J, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

253. FLORISUGA FUSCA (Vieill.), Gould.

254. DELATTRIA VIRIDIPALLENS, (Bourc. u. Muls.), Bonap. S, aus Mexico.

255. CALOTHORAX LUCIFER (Sws.), Gray. 2 of, aus Mexico.

256. EUTIMA LAFRESNAYI, Cabanis u. Heine.

257. Docimastes ensiferus (Boiss.), Bonap. Der Schwertschnabel,

J, aus Neu Granada.

259. Heliantheus heliantheus (Less.), Gould.

260. Heliantheus Bonapartei (Boiss.), Gould. S, aus Neu Granada.

261. Bourcieria torquata (Boiss.), Bonap. S, aus Neu Granada.

262. Heliangelus Clarissa (de Longemare), Bonap 3, aus Neu Granada.

263. Нецоткурна Ракzudacki (de Longem.), Gould.

264. CLYTOLAEMA RUBINEA (Gmel.), Gould. Q, aus Brasilien.

265. Boissoneaua flavescens (Loddiges), Reichb. 81, aus Neu Granada.

266. UROLAMPRA TYRRIANTHINA (Lodd.), Cab. u. H. S, aus Neu Granada.

267. PSALIDOPRYMNA AMARYLLIS (Bourc. u. M.), Cab. u. H. 3, aus Neu Granada.

268. Steganura Unterwoodi (Less.), Gray. Die Flaggensylphe, 31, aus Bogota.

269. Selasphorus rufus (Gmel.), Sws. 2 8, aus Mexico.

270. CALLIPHLOX AMETHYSTINUS (Gmel.), Boie.

271. Lophornis ornatus (Bodd.), Less. Die Schmuckelfe, S, aus Brasilien.

272. Lophornis magnificus (Vieillot), Less.
2 3, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Dr. Meyer.

273. Chrysolampis mosquitus (L.), Boie. 3 ♂ und 2 ♀, sowie junges ♂, aus Cayenne, ♂ u. junges ♂, aus Cayenne, Gesch. d. Hrn. Zæppfel. 274. Hylocharis sapphirina (Gmel.), Boie.

♂, aus Brasilien,

1, aus Südamerika.

275. Prasitis prasina (Less.), Cab. u. H.

8, aus Cayenne.

276. Chlorolampis chrysogaster (Bourc.), Cab. u. II.

277. Basilinna leucotis (Vieill.), Boie.

4 &, aus Mexico.

278. CYANOPHAIA CYANEA (Vieill.), Reichb.

2 o, aus Brasilien.

279. PHEMONOE CUPREIVENTRIS (Fraser), Reichb.

280. ERIOCNEMIS VESTITA (Longem.), Reichb.

3, aus Neu Granada. 281. Eriocnemis Aureliae (Bourc.), Reichb.

d, aus Neu Granada.

282. HELIOTHRIX AURITUS (Gmel.), Boie.

Der Blumenküsser,

o, aus Brasilien.

Famil. Meliphagidae, Vigors.

Pinzelzüngler. Meliphagidés.

- 283. Acanthorhynchus tenuirostris (Lath.), Gould. 1, aus Neu Südwales.
- 284. MELIPHAGA PHRYGIA, Lath. 1, aus Neu Südwales.
- 285. PROSTHEMADERA NOVAE-ZEALANDIAE (Gmel.), Gray.

 Der Poë oder der Pfarrvogel,

 2, aus Neu Seeland.
- 286. Anthochaera carunculata (Lath.), Vig. u. Horsf. 1, aus Neu Südwales.
- 287. TROPIDORHYNCHUS CORNICULATUS (Lath.), Vig. u. Horsf. 1, aus Neu Südwales.

288. Thopidorhynchus marginatus, Gray.?

1, von den Molukken.

289. ZOSTEROPS SENEGALENSIS, Bonap.

1, vom Senegal.

290. ZOSTEROPS HAESITATA, Hartlaub.

1, Insel Réunion, Gesch. des Museums in Réunion.

291. ZOSTEROPS MADAGASCARIENSIS, L.

♂, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

Famil. Anabatidae, Bonaparte.

Steiger. Grives-grimpeuses.

Unterfam. Dendrocoloptinae, Gray.

Baumsteiger.

292. DENDROPLEX PICUS (Gmel.), Sws.

1, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel,

2, » Gesch. des Herrn Aimé Gros,

1, aus Brasilien.

293. XIPHORHYNCHUS TROCHILUROSTRIS, Lichtenstein.

1, aus Brasilien.

294. PICOLAPTES TENUIROSTRIS, Licht.

1, aus Brasilien, Gesch. des Herrn Thomas.

295. PHYLIDOR SUPERCILIARIS, Licht.

1, aus Brasilien.

Unterfam. Sittinae, Bonaparte.

Spechtmeisen. Torche-pots.

*296. SITTA EUROPAEA, Linné.

Die Spechtmeise (auch Blauspecht und Kleiber genannt), le Torche-pot,

♂ und ♀, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Ernst,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. von Peyerimhof,

1, aus dem Elsass,

d und \(\text{, aus Frankreich, (Coll. St. Firmin).} \)

var. uralensis, Licht.

Die Uralspechtmeise, le Torche-pot d'Oural,

1, aus Schweden.

297. SITTA SYRIACA, Ehrenberg.

Der Felsenkleiber, le Torche-pot des roches,

Q, von Smyrna.

298. Dendrophila frontalis, Horsf. 1, aus Cochinchina.

Famil. Certhiidae, Vigors.

Baumläufer. Grimpereaux.

*299. Certhia familiaris, L.

Der Baumläufer. le Grimpereau,

1, aus dem Elsass,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Ernst,

of und \(\rightarrow \), aus den Vogesen,

1, aus Algier.

Unterfamil. Tichodrominae, Bonap.

Mauerläufer. Tichodromes.

*300. TICHODROMA MURARIA, L.

Der Mauerläufer, le Tichodrome de muraille,

1, von Colmar,

1, von der Hoch-Kænigsburg, Dezemb. 1885, Gesch. des Herrn Bückel,

o im Winter, aus dem Elsass,

of im Sommer, aus der Schweiz,

♀ im Winter, aus der Schweiz.

Anmerkung: Dieser zierliche Hochgebirgsbewohner kommt im Winter, wenn dort alles mit Schnee und Eis bedeckt ist, nach den Niederungen und dehnt seine Streifzüge dann oft weit ins Rheinthal hinab aus.

Famil. Menuridae, Bonaparte.

Leierschwänze. Lyres.

Famil. Pteroptochidae, Sclater.

Bürzelstelzer.

302. Pteroptochus megapodius, Kittlitz. Der Türkenvogel, 1, aus Chile.

Famil. Troglodytidae, Sclater.

Zaunkönige. Troglodytes.

- *303. Troglodytes parvulus, Koch.

 Der Zaunkönig, le Troglodyte,
 3, aus dem Elsass,
 1, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Ernst.
 - 304. TROGLODYTES HIEMALIS, Vieillot. Der Winterzaunkönig, 1, aus Canada.
 - 305. Donacobius atricapillus (L.), Sws. 1, aus Brasilien.
 - 306. Campylorhynchus zonatus, Lesson. 2, aus Mexico.
 - 307. Pheugopedius (unbestimmte Art). 1, aus Nordamerika?

PASSERES.

3te Unterordn. Dentirostres, Cuvier.

Zahnschnäbler. Dentirostres.

Famil. Luscinidae, Gray.

Sänger. Chanteurs.

Unterfam. Malurinae, Gray.

Buschsänger.

308. PRINIA FAMILIARIS, Horsfield.

2. aus Java.

309. DRYMOICA ERYTHROPTERA (Jard.), Cray.

of und Q, vom Senegal.

310. DRYMOICA MADAGASCARIENSIS, Hartlaub.

Q, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

311. CISTICOLA SCHOENICOLA, Bonap,

Der Cistensänger,

o' und 2 Q, von Smyrna.

312. EROESSA TENELLA, Hartl.

Q, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

313. Ellisia Typica, Hartl.

o und Q, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

Unterfam. Calamodytinae, Gray.

Rohrsänger. Bousserolles.

*314. ACROCEPHALUS TURDOIDES, Meyer.

Der Drosselrohrsänger, la Bousserolle turdoide, 1. aus dem Elsass.

315. Acrocephalus palustris (Bechst.), Naum.

Der Sumpfrohrsänger, la Bousserolle des marais ou la Verderolle,

1, aus Pommern.

*316. Acrocephalus arundinaceus (Gmel.), Naum.

Der Teichrohrsänger, la Bousserolle efravatte,
1, aus dem Elsass.

317. Acrocephalus horticulus, Naumann.

Der Gartenteichrohrsänger,

♂ und ♀, aus Baden.

318. Lusciniopsis Luscinioides (Savi), Bonap. Der Nachtigallenrohrsänger, 1, aus Italien.

319. CETTIA SERICEA (Natt.), Bonap.

Der Seidenrohrsänger. la Bouscarle Cetti,

1, aus Italien.

*320. CALAMOHERPE PHRAGMITIS, Bechst.

Der Uferschilfsänger, la Calamodyte phragmite, 1. aus dem Elsass.

Anmerkung: Dieses Exemplar soll aus dem Elsass stammen, wo es aber gefunden wurde, ist nicht mehr ausfindig zu machen. Ob es sich um ein zufälliges und vereinzeltes Vorkommen handelt, oder ob die Art regelmässig das Elsass besucht, lässt sich zur Zeit nicht ermitteln.

*321. CALAMOHERPE AQUATICA (Lath.).

Der Binsenrohrsänger, la Fauvette aquatique, 1, aus der Schweiz.

Anmerkung: Der Binsenrohrsänger ist im Rheinthal Brutvogel, dem Museum fehlen aber noch Exemplare aus dem Elsass.

322. Calamoherpe cariceti (Naumann).

J, aus Russland.

323. Iduna caligata (Licht.), Keys. u. Blas.

3, von Astrachan.

324. Lusciniola melanopogon (Temm.), Gray.

Der Tamariskenrohrsänger,

♂, von der Insel Sardinien.

*325. Locustella fluviatilis (Meyer u. Wolff).

Der Flussrohrsänger, la Locustelle fluviatile, 1, aus dem Elsass. *326. LOCUSTELLA NAEVIA, Boddaert.

Der Heuschreckenrohrsänger, la Locustelle tachetée, 2, aus dem Elsass.

*327. AEDON GALACTODES (Temm.).

Die Baumnachtigall, le Bec fin rubigineux,

1, aus dem Elsass,

o, aus Griechenland,

2, aus Tunis.

Anmerkung: Von dem aus dem Elsass stammenden Exemplar ist kein näherer Fundort bekannt. Da die Baumnachtigall aber auch schon in andern Theilen Deutschlands, in Frankreich und selbst in England beobachtet worden ist, so dürfte die Fundortsangabe richtig sein.

Unterfam. Sylvianae, Cabanis.

Grasmücken. Fauvettes.

328. SYLVIA MELANOCEPHALA, Gmel.

Das Sammetköpfchen,

♂ und \, aus Italien.

329. SYLVIA UNDATA, Bodd. (S. PROVINCIALIS, Gmel.)

Die Schlupfgrasmücke,

2 d, von Nizza.

330. SYLVIA SUBALPINA, Bonap.

Die Bartgrasmücke,

1, von Nizza.

331. Sylvia conspicillata, Marm.

Die Brillengrasmücke, la Fauvette à lunettes,

♂ und \(\text{q} \), aus Spanien.

*332. SYLVIA CINEREA, Lath.

Die Dorngrasmücke, la Fauvette cendrée,

4 Stück, darunter ♂ und ♀, aus dem Elsass,

Q, aus Frankreich (Coll. St. Firmin).

*333. Sylvia curucca, L.

Die Zaungrasmücke, la Fauvette babillarde,

 $2 \triangleleft 0$ und $1 \triangleleft 0$, aus dem Elsass.

*334. SYLVIA ATRICAPILLA, L.

Die schwarzköpfige Grasmücke, la Fauvette à tête noire,

2 ♂ und 3 ♀, aus dem Elsass,

Q, von Cannes,

8, aus Algier, Gesch. des Herrn Ch. Grad.

335. Sylvia Rüppeli, Temm.

Die Maskengrasmücke,

o, von Smyrna.

336. SYLVIA ORPHEA, Temm.

Der Meistersänger, la Fauvette orphée,

d' und Q, von Genua.

*337. SYLVIA NISORIA, Bechstein.

Die Sperbergrasmücke, la Fauvette épervière ou rayée,

1, aus dem Elsass.

Anmerkung: Die Sperbergrasmücke kommt nur sehr selten und nur zur Zugzeit im Elsass vor.

*338. Sylvia hortensis, L.

Die Gartengrasmücke, la Fauvette des jardins, 1, von Colmar.

339. SYLVIA OLIVETORUM, Strickland.

Die Olivengrasmücke,

1, aus Italien.

*340. Phyllopneuste sibilatrix (Bechstein).

Der Waldlaubvogel, le Pouillot siffleur, 3, aus dem Elsass.

*341. Phyllopneuste trochilus (L.).

Der Fitislaubvogel, le Pouillot fitis,

♂ und \parts, von Colmar.

*342. PHYLLOPNEUSTE RUFA (Lath.).

Der Weidenlaubvogel, le Pouillot véloce,

2, aus dem Elsass,

1, von Colmar.

*343. Phyllopneuste Bonelli (Vieill.).

Der Berglaubsänger, le Pouillot Bonelli,

♂ und \, aus dem Elsass,

♂, aus Frankreich (Basses-Alpes).

*344. Hypolais salicaria, Bonap.

Der Gartenspötter, le grand Pouillot,

3, aus dem Elsass, darunter ♂ und ♀,

1, von Nizza.

345. Hypolais Polyglotta, Vieill.

Der Sprachmeister, le Pouillot polyglotte,

1, von Nizza.

346. Hypolais icterina, Vieill.

1, von Nizza.

Unterfam. Regulinae.

Goldhähnchen. Roitelets.

*347. REGULUS CRISTATUS, Koch.

Das gelbköpfige Goldhähnchen, le Roitelet huppé,

5 ♂ und 1 \(\text{q}, \) aus dem Elsass,

8, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn H. Geiger.

*348. REGULUS IGNICAPILLUS, Brehm.

Das feuerköpfige Goldhähnchen,

o, aus dem Elsass.

Unterfam. Luscininae, Bonap.

Nachtigallen. Rossignols.

*349. Luscinia minor, Brehm.

Die Nachtigall, le Rossignol,

4, aus dem Elsass.

*350. Ruticilla phoenicurus (L.), Brehm.

Der Gartenrothschwanz, le Rouge-queue de murailles,

4 ♂ alt, 1 ♂ jung und 1 \(\text{Q}, \text{ aus dem Elsass.} \)

*354. RUTICILLA TITHYS (L.), Brehm.

Der Hausrothschwanz, le Rouge-queue tithys,

2 o und 2 Q, aus dem Elsass.

352. RUTICILLA CAIRII, Degland,

1, von Nizza.

*353. DANDALUS RUBECULUS (L.), Boie.

Das Rothkehlchen, le Rouge-gorge,

d, aus dem Elsass,

♀, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Ernst,

1 jung und 1 alt, aus dem Elsass.

*354. Cyanecula suecica (L), Brehm.

Das Rothsternblaukehlchen, le Gorge-bleu ordinaire,

♂ und ♀, aus dem Elsass,

o, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Vogt.

*355. CYANECULA LEUCOCYANEA, Brehm.

Das Weisssternblaukehlchen, le Gorge-bleu à plas-

tron blanc,

5 o, aus dem Elsass.

Unterfam. Saxicolinae, Swainson.

Schmätzer. Traquets.

*356. Saxicola oenanthe (L.), Bechst.

Der graue Steinschmätzer, le Traquet moteux,

2 ♂ und 2 Q, aus dem Elsass,

Jung, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. Grossheinz.

357. SAXICOLA AURITA, Temm.

Der Röthelsteinschmätzer, le Traquet oreillard,

2 alte 🗸 und 1 jung, von Smyrna.

358. Saxicola stapazina (L.), Bechst.

Der Gilbsteinschmätzer, le Traquet stapazin,

8, von Nizza.

359. Saxicola leucomela (Pallas).

Der Nonnensteinschmätzer,

♂, aus Südrussland.

360. Saxicola isabellina, Rüppel.

Der Isabellsteinschmätzer,

 \mathcal{J} , \mathcal{D} und 1 jung, von Smyrna.

361. SAXICOLA CACHINNANS, Temm.

Der Trauersteinschmätzer,

&, aus Italien,

♂, ♀ und 1 jung, von Nizza, Gesch. des Herrn Schlumberger. *362. Pratincola rubicola (L.), Koch.

Der schwarzkehlige Wiesenschmätzer, le Traquet pâtre,

2 ♂ und \(\rightarrow\), aus dem Elsass,

J, aus Algier, Gesch. des Herrn Ch. Grad.

*363. PRATINCOLA RUBETRA (L.), Koch.

Der braunkehlige Wiesenschmätzer, le Traquet tarier,

3 o und 2 ♀, aus dem Elsass.

364. Pratincola sybilla (Gmel.).

♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

365. PETROICA PHOENICEA, Gould.

♂ und Q, aus Neu Südwales.

366. SIALIA WILSONI, Swainson.

2 of und 1 jung, aus Nordamerika.

Unterfam. Accentorinae, Gray.

Braunellen. Pégots.

*367. ACCENTOR ALPINUS, Gmel.

Die Alpenbraunelle, le Pégot des Alpes,

1, aus dem Elsass (Vogesen),

2, aus der Schweiz,

1, aus der Dauphiné, Gesch. des Herrn Karcher.

Anmerkung: Die Alpenbraunelle kommt nur sehr selten und zufällig im Elsass vor.

*368. ACCENTOR MODULARIS, L.

Die Heckenbraunelle, le Pégot mouchet, 1, aus dem Elsass.

Famil. Paridae, Boie.

Meisen. Mésanges.

*369. PARUS MAJOR, L.

Die Kohlmeise, la Mésange charbonnière,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Ernst,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Thierry,

∂ und \, von Colmar.

*370. PARUS ATER, L.

Die Tannenmeise, la Mésange des sapins, 3 3, aus dem Elsass.

*371. PARUS PALUSTRIS, L.

Die Sumpfmeise, la Mésange des marais,

4, aus dem Elsass.

372. PARUS BOREALIS, Selys.

Die nordische Sumpsmeise, la Mésange des marais du nord ou la Mésange nonnette,

1, aus Dänemark,

1, aus der Schweiz.

373. Parus Lugubris, Natterer.

Die Trauermeise,

1, von Smyrna.

374. PARUS CINCTUS, Bodd. (SIBIRICUS, Gmel.).

Die Gürtelmeise,

♂ und ♀, vom Baikalsee.

375. Parus Cyaneus, Pallas.

Die Lasurmeise, la Mésange azurée,

1, aus Sibirien.

*376. Parus coeruleus, L.

Die Blaumeise, la Mésange bleue,

3, aus dem Elsass.

377. Parus ultramarinus, Bonap.

Die Ultramarinmeise,

2, aus Algier.

*378. PARUS CRISTATUS, L.

Die Haubenmeise, la Mésange huppée,

2, aus dem Elsass.

379. PARUS LEUCOPTERUS, Sws.

2, vom Senegal.

380. Melanochlora sultanea (Hodgs.), Less.

Die Sultansmeise,

J, aus Cochinchina.

*381. ACREDULA CAUDATA (L.), Koch.

Die Schwanzmeise, la Mésange à longue queue,

on und ♀, aus dem Elsass,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Ernst.

382. AEGITHALUS PENDULINUS (L.), Boie.
Die Beutelmeise, la Mésange rémiz,
1, aus Russland.

383. Panurus biarmicus (L.), Koch.

Die Bartmeise, la Mésange à moustache,

♂ und ♀, aus Italien.

384. Polioptila Mexicana, Bonap.

1, aus Mexico.

Famil. Mniotiltidae, Sclater.

Waldsänger. Sylvicolidés.

385. MNIOTILTA VARIA (L.), Gray.
2, aus Nordamerika.

386. DENDROICA CANADENSIS (L.), Gray. 1, aus Canada.

387. DENDROICA BLACKBURNIAE (Gmelin). 1, aus Mexico.

388. Dendroica aestiva (Gmelin). 3, aus Nordamerika.

389. DENDROICA, unbestimmte Art, 1, aus Nordamerika.

390. TRICHAS MARILANDICA, Wilson. 2, aus Nordamerika.

391. Setophaga ruticilla (L.), Sws.

392. Setophaga miniata, Swainson. 3 o, aus Mexico.

Famil. Motacillidae, Boie.

Stelzen. Hochequeues.

Unterfam. Motacillinae, Swainson.

Bachstelzen. Bergeronnettes.

*393. MOTACILLA ALBA, Linné.

Die weisse Bachstelze, *la Bergeronnette grise*, 3 ♂, 1 ♀ und 1 jung, aus dem Elsass.

394. MOTACILLA YARELLI, Gould (LUGUBRIS, Vieill.).

Die Trauerstelze, la Bergeronnette de Yarell, 3, von Helgoland,

1, aus der Normandie.

395. MOTACILLA FLAVIVENTRIS, Verreaux.

♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

*396. MOTACILLA SULPHUREA, Linné.

Die graue Bachstelze, la Bergeronnette des montagnes,

4, aus dem Elsass.

*397. Budytes flava (L.), Gray.

Die gelbe Schafstelze, la Bergeronnette jaune ou printanière,

2 & im Sommer, aus dem Elsass,

♂ im Frühjahr, von Nizza,

1, vom Senegal.

398. BUDYTES MELANOCEPHALA, Licht.

Die Kappenstelze, la Bergeronnette à tête noire,

7, aus Griechenland,

o, aus Sicilien.

399. BUDYTES CINEREOCAPILLA, Savi.

Die Graukopfstelze, *la Bergeronnette à tête grise*, & im Frühjahr, von Nizza.

400. BUDYTES CITREOLA, Pallas.

Die Sporenstelze, la Bergeronnette citrine,

J, aus Sibirien.

401. BUDYTES FLAVEOLA, Gould.

♂, aus England.

402. GRALLINA PICATA, Latham.

Die Elsterstelze,

1, aus Neu Südwales.

Unterfam. Anthinae, Sclater.

Piepern. Pipits.

*403. Anthus aquaticus, Bechstein.

Der Wasserpieper, le Pipit spioncelle,

- 1, aus dem Elsass,
- 1, aus der Schweiz,
- 1, aus Frankreich.
- 404. Anthus obscurus, Gmel. (Rupestris, Nilss.).

Der Felsenpieper, le Pipit maritime,

- 2, aus Schweden.
- 405. Anthus Ludovicianus, Gmelin.
 - 1, aus Mexico.
- *406. Anthus arboreus, Bechstein.

Der Baumpieper, le Pipit des arbres,

- 2, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Zimmer,
- 4, aus dem Elsass,
- 2, aus Frankreich.
- 1 Varietät, ganz weiss, vollkommener *Albinismus*, aus dem Elsass,
- 1 Varietät, Oberkopf, Hinterhals, Kehle, Bauchseiten und Armschwingen sind weiss, nur mit wenigen braunen Schaftstrichen gezeichnet; aus dem Elsass,
- 1 Varietät, Scheitel von der Stirne bis zur Kopfmitte gelblich weiss; im Uebrigen normal gefärbt, aus dem Elsass.
- *407. Anthus pratensis (L.), Bechst.

Der Wiesenpieper, le Pipit farlous ou des prés, 2, aus dem Elsass.

408. ANTHUS CERVINUS, Pallas.

Der Rothkehlpieper, le Pipit à gorge rouge, o, von Sarepta.

409. AGRODROMA CAMPESTRIS (Bechst.), Sws.

Der Brachpieper, l'Agrodrome rousseline,

2 o, aus dem Elsass,

♂ und ♀, von Genua,

2, aus Frankreich.

410. AGRODROMA SORDIDA (Rüppel), Gray. 1, aus Abyssinien.

411. Corydalla Richardi, Vieillot.

Der Sporenpieper,

1, aus Italien.

412. MACRONYX CAPENSIS (L.), Sws. 1, aus Südafrika.

413. Macronyx croceus, Vieillot.

1, vom Senegal.

Famil. Turdidae, Gray.

Drosseln. Merles.

*414. Turdus viscivorus, Linné.

Die Misteldrossel, la Grive draine,

4, darunter of und Q, aus dem Elsass.

*415. TURDUS PILARIS, Linné.

Die Misteldrossel, la Grive litorne,

o, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Ch. Kænig,

5 Stück, aus dem Elsass,

1 Varietät, aus dem Elsass. Färbung: Oberseite schwarzgrau, Kehle weisslich, mit vielen schwarzen Streifen, Brust auf beiden Seiten kastanienbraun, was sich nach hinten fortsetzt, der Bauch weiss, mit grossen dreieckigen Flecken.

*416. Turdus musicus, Linné.

Die Singdrossel, la Grive de vigne ou la Grive chanteuse,

3 ♂ und 1 \(\text{q}, \text{ aus dem Elsass.} \)

*417 Turdus iliacus, Linné.

Die Rothdrossel, la Grive mauvis,

♂ und Q, aus dem Elsass,

- 1 Varietät, aus dem Elsass. Färbung: Oberkopf weiss, sonst überall weiss und braun gescheckt, die rothbraune Färbung der Bauchseiten nur schwach angedeutet.
- 418. Turdus Swainsoni, Cabanis.

1, aus Mexico.

*419. MERULA VULGARIS, Leach.

Die Amsel, le Merle ou Merle noir,

3 or alt und 3 ♀ alt, or u. ♀ jung, aus dem Elsass,

- 1 Varietät, jung, Geberschweier, Juli 1890. Vollkommener *Albinismus*; total weiss gefärbt, die Beine und der Schnabel gelb.
- 1 Varietät, &, von Kientzheim, Gesch. des Hrn. von Peyerimhoff. Färbung: Stirn mit weissem Fleck, die beiden ersten Handschwingen jederseits schwarz, aber alle folgenden weiss; die äusserste Schwanzfeder jederseits schwarz, aber alle andern weiss, das übrige Gefieder schwarz.

*420. MERULA TORQUATA, Boie.

Die Ringamsel, le Merle à plastron blanc,

4 ♂ und 2 Q, aus dem Elsass,

- ♂, Varietät, aus dem Elsass. Ueberall weiss und schwarz gescheckt,
- o, Varietät, aus dem Elsass. Ziemlich wie Vorige, nur bei dieser der Brustring sehr breit weiss und mittlere Schwanzfedern weiss,
- Q, Varietät, aus dem Elsass. Beide äusseren Schwanzfedern weiss, um die Augen weiss gescheckt und auf dem Bürzel einige weisse Federn.
- 421. Hodoiporus migratorius (L.), Reichb.

Die Wanderdrossel,

2 8, aus Labrador,

3 d, 1 ♀ und 1 jung, aus Nordamerika.

*422. Monticola saxatilis (L.), Boie.

Die Steindrossel, le Merle des roches,

3 o, aus dem Elsass.

Anmerkung: War früher Brutvogel im Unter-Elsass zu Barr bei Andlau, ob jetzt auch noch, ist fraglich.

*423. Petrocincla Cyanea, Keyserling u. Blasius.

Die Blaudrossel, le Merle bleu,

♂ und \(\text{, aus dem Elsass} \)?

♂ und \(\text{, von Nizza, Gesch. des Hrn. Schlumberger,} \)

♂ und 2 \, aus Algier, Gesch. des IIrn. Ch. Grad.

Anmerkung: Es ist zweifelhaft, ob die beiden Exemplare wirklich aus dem Elsass stammen.

424. MIMUS POLYGLOTTUS (L.), Boie.

Die Spottdrossel,

1, aus Nordamerika.

425. Mimus Theuca (Moliere), Gray.

1, aus Chile.

426. MIMUS GRACILIS, Cabanis.

1, aus Mexico.

427. MELANOTIS CAERULESCENS (Sws.), Bonap.

2, aus Mexico.

428. GALEOSCOPTES CAROLINENSIS (L.), Cabanis.

Der Katzenvogel,

1, aus Nordamerika.

429. HARPORHYNCHUS RUFUS (L.), Caban.

2, aus Nordamerika.

430. Bessonornis albicapilla (Vieillot), Gray.

3, vom Senegal.

431. Bessonornis verticalis, Hartlaub.

2, vom Senegal.

432. Copsychus mindanensis (Gmel.), Gray.

2 ♂ und 1 \(\text{q}\), aus Cochinchina.

433. Copsychus pica, von Pelzeln.

♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

434. GERVAISIA ALBOSPECULARIS (Eyd. u. Gerv.), Bonap.

♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

435. GERVAISIA SECHELLARUM, A. Newton.

7, von den Seychellen, Gesch. des Museums in Réunion.

Famil. Hydrobatidae, Gray.

Wasserschwätzer. Merles d'eau.

*436. CINCLUS AQUATICUS (L.), Bechst.

Die Bachamsel, le Cincle plongeur,

2, aus dem Elsass,

♂ und ♂ jung, von Münster, Gesch. des Hrn. Dietz,

♂, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Scheurer,

1, aus Frankreich (Coll. St. Firmin),

1, aus Algier, Gesch. des Herrn Ch. Grad.

437. CINCLUS MELANOGASTRA, Temminck.

Die schwarzbauchige Bachamsel,

J, aus Schweden.

438. CINCLUS PALLASI, Temm.

♀, von Ussuri.

Famil. Pycnonotidae, Blyth.

Kurzfüsser.

Unterfam. **Pycnonotinae**, Gray.

Fruchtdrosseln. Pycnonotidés.

439. Pycnonotus obscurus (Temm.), Gray.

3, aus Algier, wovon 2 Gesch. des Hrn. Ch. Grad,

1, aus Spanien.

440. Pycnonotus cafer, Temm.

1, aus Südafrika.

441. Pycnonotus jocosus, Linné.

1, aus China.

Unterfam. Phyllornithinae, Cabanis.

Laubvögel.

442. IXOCINCLA MADAGASCARIENSIS (Müll.), Gray.

2 &, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

443. IXOCINCLA CRASSIROSTRIS, E. Newton.

1, von den Seychellen, Gesch. des Museums in Réunion.

444. Bernieria madagascariensis (Ginel.), Gray.

3, aus Madagaskar.

445. XANTHOMISIS ZOSTEROPS, Newton.

1, aus Madagaskar.

446. Andropadus Latirostris, Strickland.

1, vom Senegal.

447. PHYLLORNIS COCHINCHINENSIS (Gmel.), Gray.

1, aus Cochinchina.

Unterfam. Crateropodinae, Swainson.

448. CRATEROPUS REINWARDTI, Swainson.

1, vom Senegal, Gesch. des Herrn Zæppfel.

449. CRATEROPUS ATRIPENNIS, Sws.

3, vom Senegal.

450. CRATEROPUS PLATYCIRCUS, Sws.

1, vom Senegal, Gesch. des Herrn Zæppfel.

451. CRATEROPUS LEUCOPYGIUS, Rüpp.

Der Drossling,

1, aus Abyssinien.

452. CRATEROPUS FULVUS, Desf. (NUMIDICUS, Lev.).

1, aus Algier, Gesch. des Herrn Schlumberger.

453. Crateropus melanops, Hartl.

1, vom Senegal.

454. CRATEROPUS ATRICEPS, Less.

3, vom Senegal.

455. CRATEROPUS LEUCOCEPHALUS, Rüpp.

1, aus Abyssinien.

Famil. **Dicruridae**, Blyth. **Drongos**.

456. DICRURUS MODESTUS, Hartl.

1, vom Senegal.

457. DICRURUS FORFICATUS (L.), Vieill.

2, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

458. DICRURUS PARADISEUS (L.), Vieill.

Der Flaggendrongo,

2, aus Cochinchina.

459. MELAENORNIS EDOLIOIDES (Sws.), Gray.

1, vom Senegal.

460. BRADYORNIS SILENS, Hartl.

3, vom Senegal.

Famil. Artamidae, Blyth.

Schwalbenwürger.

461. ARTAMUS LEUCORHYNCHUS (Gmel.), Vieill.

Der weissschnäblige Schwalbenwürger,

1, von den Philippinen.

462. LEPTOPTERUS VIRIDIS (Müll.), Bonap.

♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

463. ARTAMIA LEUCOCEPHALA (Gmel.), Lafr.

♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

464. CYANOLANIUS BICOLOR, Bonap.

Der Zweifarbenblauwürger,

o und Q, Gesch. des Museums in Réunion.

Famil. Oriolidae, Boie.

Pirole. Loriots.

465. Sphecotheres flaviventris, Gould. 1, aus Australien. *466. ORIOLUS GALBULA, Linné.

Die Goldamsel oder der Pirol, le Loriot,

 $2 \circlearrowleft \text{ und } 1 \circlearrowleft, \text{ aus dem Elsass,}$

o, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Korum,

♀ alt und ♂ jung, aus Frankreich.

467. ORIOLUS AURATUS, Vieillot.

 $3 \circlearrowleft \text{ und } 2 \circlearrowleft, \text{ vom Senegal.}$

468. Oriolus indicus, Jerdon,

2 ♂ und 1 \(\text{, aus Cochinchina.} \)

469. ORIOLUS MELANOCEPHALUS, Linné.

o, aus Bengalen.

470. MIMETA VIRIDIS (Lath.), Gray.

1, aus Neu Südwales.

471. PTILONORHYNCHUS HOLOSERICEUS, Kuhl.

7, aus Neu Südwales.

Famil. Pittidae, Bonaparte.

Pittas.

472. PITTA CYANOPTERA, Temm.

Die Blauflügelpitta,

2, aus Cochinchina.

473. PITTA MAXIMA, Forster.

Die Grosspitta,

1, von Halmahera.

474. PITTA GRANATINA, Temm.

Die Granatpitta,

d, aus Borneo.

475. PITTA ELEGANS, Temm.

♂, aus Sumatra.

476. PHILEPITTA JALA, Boddaert.

♂ und ♀, aus Madagaskar,

Jung, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

Famil. Formicariidae, Sclater.

Ameisenvögel. Fourmiliers.

Unterfam. Formicariinae, Gray.

477. Grallaria guatemalensis, Prevost.

1, aus Guatemala.

478. Formicarius moniligea, Sclater.

J, aus Guatemala.

479. Rhopoterpe formicivora, Caban.

J, aus Brasilien.

480. PITHYS ALBIFRONS (Gmel.), Gray.

J, aus Cayenne.

Subfam. Thamnophilinae, Swainson.

481. Thamnophilus dollatus (L.), Gray. 3 of und 2 Q, aus Brasilien.

482. Thamnophilus cinereus, Vieillot.

♂ und ♀, aus Brasilien.

483. THAMNOPHILUS-LEACHI, Such.

o, aus Brasilien.

484. Erionotus cayanensis (Müll.), Caban.

♂, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

485. Dysithamnus Guttulatus (Licht.), Caban.

1, aus Brasilien.

486. Dysithamnus mentalis (Temm.), Caban. 1. aus Brasilien.

Famil. Aegithinidae, Gray.

Schwatzdrosseln.

487. Timalia nigricollis, Temm.

1, aus Malakka.

488. AEGITHINA SCAPULARIS, Horsfield.

3, aus Java.

489. Bessethera barbata, Cabanis. 3, aus Malakka.

Famil. Muscicapidae, Vigors.

Fliegenfänger. Gobes-mouches.

Unterfam. Muscicapinae, Swainson.

*490. Muscicapa grisola, Linné.

Der graue Fliegenfänger, le Bouvier gris,
2, aus dem Elsass.

*491. Muscicapa atricapilla, Linné (luctuosa, Temm.).

Der Trauersliegenfänger, le Bouvier à manteau noir,

2 3 und 1 \, aus dem Elsass.

*492. Muscicapa albicollis, Temminck.

Der Halsbandfliegenfänger, le Bouvier à collier,

of und \(\rightarrow \), aus dem Elsass.

493. ERYTHROSTERNA PARVA (Bechst.), Bonap.

Der Zwergsliegenfänger, le Gobe-mouche rougeatre,

Q, aus Böhmen.

494. Newtonia Brunneicauda, A. Newt.

♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

Unterfam. Myiagrinae, Cabanis.

Fliegenschnäpper.

495. PLATYSTEIRA CYANEA (Müll.), Gray.

3, vom Senegal, Gesch. des Herrn Zæppfel.

496. Rhipidura pectoralis, Jerdon.
2. aus Cochinchina.

497. Terpsiphone melanogastra (Sws.), Caban. Der Schleppen-Fliegenschnäpper,

3 3, vom Senegal,

of alt und of jung, vom Senegal, Gesch. des Herrn Zæppfel.

498. TERPSIPHONE MUTATA (Gmel.), Gaban.

2 ♂ und 1 ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion,

o jung, aus Madagaskar.

499. TERPSIPHONE BOURBONENSIS (Müll.), Schleg. u. Poll.

1, von Réunion, Gesch. des Museums in Réunion.

Unterfam. Campephaginae, Gray.

Raupenfresser.

500. Pericrocotus cinereus, Lafresnay.

2 ♂ und 3 \, aus Cochinchina.

501. CAMPEPHAGA PHOENICEA (Lath.), Gray.

♂ und Q, aus Westafrika.

502. GRAUCALUS CALEDONICUS, Gmelin.

1, aus Neu Caledonien.

503. CEBLEPHYRIS PECTORALIS, Jard. u. Selby.

2, vom Senegal.

504. CEBLEPHYRIS CANA, Gmelin.

♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

505. CEBLEPHYRIS (unbestimmte Art).

1, unbekannter Herkunft.

Famil. Tyrannidae, Cabanis.

Königswürger. Tyrans.

Unterfam. Taeniopterinae, Gray.

506. ARUNDINICOLA LEUCOCEPHALA (L.), Lafr. 1. aus Brasilien.

Unterfam. Elaininae, Cabanis.

507. ELAINIA PAGANA, Lichtenstein.

2, aus Cayenne.

- 508. Mylozetetes cayennensis (Temm.), Sclater. 2, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.
- 509. LEGATUS ALBICOLLIS (Vieill.), Sclat. 1, aus Brasilien.
- 510. PITANGUS SULPHURATUS (Linné), Sws. 1, aus Brasilien.
- 511. PITANGUS MAXIMILIANI, Cabanis u. Heine. 1, aus Brasilien.
- 512. MYIODYNASTES MACULATUS (Müller), Bonap. 1, aus Cayenne.

Unterfam. Tyranninae, Swainson.

- 513. MEGARHYNCHUS PITANGUA (L.), Thunb. 1, aus Brasilien.
- 544. Pyrocephalus rubineus (Bodd.), Gould. Q, aus Mexico.
- 515. Mylarchus crinitus, Cab. u. H. 1, aus Mexico.
- 516. Myiarchus Swainsoni, Cab. u. H. 2, aus Brasilien.
- 517. Myiarchus ferox (Gmel.), Cab. u. II. 1, aus Cayenne.
- 518. Tyrannus carolinensis, Gmel.

 Der Königsvogel,

 2. aus Mexico.
- 519. Tyrannus melancholicus, Vieillot.
 2, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.
- 520. Tyrannus satrapa, Licht. 2, aus Mexico.
- 521. MILVULUS TYRANNUS (L.), Sws. 3 3, aus Brasilien.
- 522. MILVULUS FORFICATUS (Gmel.), Sws. 8, aus Guatemala.

Famil. Ampelidae, Swainson.

Seidenschwänze. Jaseurs.

*523. Bombycilla garrula (L.), Vieill.

Der Seidenschwanz, le Jaseur ou le Geai de Bohême,

♂ und ♀, aus dem Elsass,

8, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Lefébure, .

Q, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Robin.

524. Bombycilla gedrorum, Vieillot.

Der amerikanische Seidenschwanz, le Jaseur d'A-

mérique,

2 of u. 1 ♀, aus Mexico, Gesch. des Hrn. Dr. Reech,

3, aus Canada, Gesch. des Herrn Missionar Kohler,

♀, aus Nordamerika.

525. BOMBYCILLA JAPONICA, Siebold.

Der Rothflügelseidenschwanz,

of und \, aus Japan.

Unterfam. Ptilogonydinae, Sclater.

526. Phainopepla nitens (Sws.), Sclat.

Famil. Cotingidae, Bonaparte.

Kotingas.

Unterfam. Tityrinae, Gray.

527. TITYRA CAYANA (L.), Gray.

3, aus Cayenne.

528. HADROSTOMUS MINOR (Lesson), Caban.

o, aus Mexico.

Unterfam. Cotinginae, Bonaparte.

529. PHIBALURA FLAVIROSTRIS, Vieillot.

Das Gabeltäubchen,

o, aus Brasilien.

530. COTINGA CAERULEA, Vieill.

Die Blaukotinga,

J, aus Cayenne.

531. Cotinga cincta, Boddaert.

Die Halsbandkotinga,

Q, aus Brasilien.

532. COTINGA CAYANA, Linné.

Die Cayennkotinga,

o, aus Cayenne.

533. XIPHOLENA POMPADORA (L.), Gloger.

Die Pompadurkotinga,

o, aus Cayenne,

J, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Rieger.

534. Helochera rubrocristata (Lafr.), de Fil.

J, aus Neu Granada.

Unterfam. Lipauginae, Sclater.

535. LIPAUGUS CINERACEUS (Vieill.), Boie. 1, aus Cayenne.

Unterfam. Gymnoderinae, Gray.

Kropfvögel.

536. QUERULA PURPURATA (Müll.), Vieill.

♂ und \(\text{q}, \) aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

537. Pyroderus scutatus (Shaw.), Gray.

Der Schildvogel,

A, aus Brasilien, Gesch. des IIrn. von Peyerimhoff.

538. GYMNOCEPHALUS CALVUS (Gmel.), Gray.

Der Kapuzinervogel,

o, aus Cayenne.

539. CEPHALOPTERUS ORNATUS, Geoffroy.

Der Schirmvogel, le Cephaloptère orné,

d', aus Guyana.

Unterfam. Piprinae, Swainson.

Schmuckvögel.

540. PIPRA PAREOLA, Linné.

2 J, aus Brasilien,

2 8, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

541. PIPRA CAUDATA, Shaw.

♂, aus Brasilien.

542. PIPRA AUREOLA, Linné.

3 J, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

543. PIPRA CHRYSOPTERA, Lafr.

o, aus Bogota.

544. PIPRA ERYTHROCEPHALA, L.

3 &, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

545. PIPRA GUTTURALIS, L.

2 3, aus Cayenne.

546. PIPRA SERENA, L.

o, aus Cayenne.

547. PIPRA (unbestimmte Art).

1, aus Südamerika.

548. JODOPLEURA PIPRA, Lesson.

♂, aus Brasilien.

Untersam. Rupicolinae, Sclater.

Klippenvögel. Coqs-de-roches.

549. Phoenicocercus carnifex (L.), Bonap.

2 &, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

550. Rupicola crocea, Vieill.

Der Klippenvogel, le Coq-de-roches, 4 o, aus Cayenne.

551. Rupicola sanguinolenta, Gould.

Der Scharlach-Klippenvogel, le Coq-de-roches sanguinolant,

o, aus Bogota.

Famil. Vireonidae, Sclater.

Grünwürger.

Unterfam. Vireoninae, Sws.

552. VIREO OLIVACEA (L.), Vieill.

1, aus Mexico.

553. VIREOLANIUS PULCHELLUS, Sclater.

J, aus Guatemala.

554. Hylophilus poicilotis, Temin.

1, aus Brasilien.

555. CYCLARHIS GUIANENSIS (Gmel.), Sws.

1, aus Cayenne.

556. CYCLARHIS FLAVIVENTRIS, Lafr.

1. aus Mexico.

Unterfam. Icterianae, Baird.

557. ICTERIA VIRENS (L.), Vieill. 4, aus Mexico.

Famil. Laniidae, Swainson.

Würger. Pies-grièches.

Unterfam. Pachycephalinae, Gray.

Dickkopfwürger.

558. COLLURICINCLA HARMONICA (Lath.), Gray.

1, aus Neu Südwales.

559. PARDALOTUS STRIATUS (Lath.), Gray.

1, aus Australien.

560. PACHYCEPHALA GLAUCURA, Gould. 1, aus Australien,

Unterfam. Laniinae, Sws.

Heckenwürger.

*561. LANIUS EXCUBITOR (L.), Briss.

Der Raubwürger, la Pie-grièche grise,

J, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Boltz,

o, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Roth,

♂, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. Louis Wetterle,

on und ♀, aus dem Elsass,

2 & alt, 1 jung, aus Frankreich (Coll. St. Firmin).

*562. Lanius minor (L.), Briss.

Der kleine Grauwürger, la petite Pie-grièche,

♂ und Q, aus dem Elsass.

563. LANIUS MERIDIONALIS, Temminck.

Der Hesperidenwürger,

o, aus Spanien.

*564. LANIUS RUFUS, Brisson.

Der Rothkopfwürger. l'Écorcheur à tête rousse,

of und ♀, aus dem Elsass,

8, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Scherrer.

*565. LANIUS COLLURIO, Linné.

Der rothrückige Würger, la Pie-grièche écorcheuse,

2 o und 2 ♀, aus dem Elsass.

566. LANIUS COLLARIS (L.).

Der Halsbandwürger,

1, aus Südafrika.

567. LANIUS NUBICUS (Licht.).

Der Maskenwürger,

d' und Q, von Smyrna,

1, vom weissen Nil.

568. LANIUS TEPHRONOTUS, Vigors.

1, aus Bengalen.

569. CORVINELLA CORVINA, Lesson.

Der Rabenwürger,

♂ und 2 \(\text{, vom Senegal} \)

Unterfam. Malaconotinae, Cabanis.

Buschwürger.

570. PRIONOPS PLUMATUS, Shaw.

2, vom Senegal,

1, aus Westafrika, Gesch. des Herrn Zæppfel.

571. PRIONOPS POLIOCEPHALUS, Stanley.

1, aus Abyssinien.

572. VANGA CURVIROSTRIS (Gmel.), Gray.

2 ♂ und 1 ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

573. LANIARIUS BARBARUS (L.), Vieill.

2 d, vom Senegal.

574. DRYOSCOPUS GAMBENSIS, Licht.

3', vom Senegal, Gesch. des Herrn Zæppfel, 2 3' und 1 ♀, vom Senegal.

575. TELEPHORUS VIRIDIS (Vieillot).

1, aus Südafrika.

576. Telephorus erythropterus, Shaw.

Der Tschagra,

1, vom Senegal, Gesch. des Herrn Zæppfel,

1, vom Senegal, Gesch. des Herrn Pfeffel.

PASSERES.

4te Unterordn. Conirostres, Cuvier.

Dickschnäbler. Conirostres.

Famil. Corvidae, Leach.

Rabenvögel. Corbeaux.

Unterfam. Streperinae, Blyth.

Pfeifkrähen.

577. GYMNORHINA LEUCONOTA, Gould.

Der Flötenvogel,

2, aus Neu Südwales.

Unterfam. Garrulinae, Swainson.

Heher. Geais.

578. PLATYLOPHUS GALERICULATUS (Cuvier), Sws.

1, aus Java.

*579. GARRULUS GLANDARIUS, Linné.

Der Eichelheher, le Geai,

4, von Colmar,

1 Varietät; woher ist zweifelhaft, aber wahrscheinlich aus dem Elsass. Färbung: ganz weiss bis auf etwas bräunlichen Anflug am Hals, den Kopfseiten und auf den Flügeln. (Albinismus.)

580. GARRULUS MELANOCEPHALUS, Géné.

Der Schwarzkopf-Eichelheher, le Geai à tête noire,

1, aus Algier,

1, aus Algier, Gesch. des Herrn Ch. Grad,

1, aus Algier, Gesch. des Herrn Manz.

581. GARRULUS CERVICALIS, Bonap.

1, aus Algier, Gesch. des Herrn Dr. Hagenmüller,

1, aus Algier, Gesch. des Herrn Ch. Grad.

582. Perisoreus infaustus (L.), Bonap.

Der Unglücksheher,

2, aus Norwegen.

583. Cyanurus cristatus (L.), Sws.

Der. Blauheher,

2, aus Canada, Gesch. des Herrn Missionar Kohler,

1, aus Canada, Gesch. des Herrn Chevillard,

4, aus Nordamerika.

584. Cyanurus coronatus, Sws.

Der Buschheher,

2 3, aus Mexico.

585. Cyanurus ornatus, Less.

Der Schmuckheher,

1, aus Mexico.

586. CYANOCORAX PILEATUS (Illiger), Boie,

1, aus Brasilien.

587. Cyanocorax cayanus (L.), Gray.

1, aus Cayenne.

588. CYANOCORAX LUXUOSUS, Lesson. 3, aus Mexico.

589. PSILORHINUS MORIO, Licht.

1, aus Mexico.

590. CISSA ORNATA, Licht.

Die geschmückte Schweifkitta,

6, aus Ceylon.

Unterfam. Callacatinae, Gray.

591. DENDROCITTA RUFA (Scop.), Gould.

Die Wanderelster,

1, aus Bengalen.

592. CRYPSIRHINA AFRA (L.), Wagl.

♂ und ♀, vom Senegal.

593. CRYPSIRHINA CUCULLATA, Jerdon. 2, aus Cochinchina.

Unterfam. Corvinae, Vigors.

Raben. Corbeaux.

*594. NUCIFRAGA PACHYRHYNCHUS, Rud. Blasius.

Der dickschnäblige Tannenheher, le Casse-noix à bec robuste,

J, aus der Schweiz,

Q, aus dem Schwarzwald,

o, aus dem Elsass.

*595. Nucifraga leptorhynchus, Rud. Blasius.

Der dünnschnäblige Tannenheher, le Casse-noix à bec fin,

4, aus dem Elsass,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn A. Eggerle,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. v. Peyerimhoff.

*596. PICA CAUDATA, Boie.

Die Elster, la Pie ordinaire,

4, aus dem Elsass, wovon eine Gesch. des Herrn Herscher.

597. PICA MAURITANICA, Malherbe.

1, aus Algier, Gesch. des Herrn Dr. Hagenmüller, Varietät oder eigene Art? 2 vom Senegal.

598. CYANOPICA CYANEA (Gmel.)

Die Blauelster, la Pie bleue,

2, von Amur.

*599. Corvus corax, Linné.

Der Kolkrabe, le Corbeau noir,

1, aus den Vogesen, Gesch. des Hrn. v. Peyerimhoff,

1, aus dem Elsass,

1, aus den Pyreneen, Gesch. des Hrn. Schlumberger,

1, aus Algier, Gesch. des Herrn Dr. Hagenmüller.

*600. Corvus corone, Linné.

Die Rabenkrähe, le Corbeau commun,

1, aus dem Elsass,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. v. Peyerimhoff,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Scheurer.

*601. Corvus cornix, Linné.

Die Nebelkrähe, la Corneille mantelée,

2, aus dem Elsass,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Wetterle.

*602. Corvus frugilegus, Linné.

Die Saatkrähe, le Freux vulgaire,

6, aus dem Elsass.

603. Corvus nobilis, Gould.

1, aus Mexico.

604. Corvus mexicanus, Gmel.

1, aus Mexico.

*605. Lycos monedula (L.), Boie.

Die Dohle, le Choucas,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Scherrer,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. v. Peyerimhoff,

606. CORVULTUR ALBICOLLIS (Lath.).

Der Geierrabe,

1, aus Südafrika,

1, vom Senegal,

1, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

Unterfam. **Pyrrhocoracinae**, Gray.

Felsenraben.

*607. Pyrrhocorax alpinus, Vieillot.

Die Alpendohle, le Chocard des Alpes,

1, von Colmar,

1, von Colmar, Gesch. des Herrn von Peyerimhoff,

1 & alt, von Bartenheim,

1, aus der Schweiz.

608. FREGILUS GRACULUS (L.), Cuv.

Die Alpenkrähe, la Crave,

1, aus den Pyreneen, Gesch. des Herrn H. Schlumberger,

1, aus Frankreich (Hautes-Alpes),

1, aus Afrika, Gesch. des Herrn Maritz.

Famil. Paradiseidae, Boie.

Paradiesvögel. Paradisiers.

Unterfam. Epimachinae, Gray.

Paradieshopfe. Épimaques.

609. PTILORHIS PARADISEUS (Sws.), Caban.
Der Paradieshopf, le Ptilorhis de Paradis,

o', aus Neu Südwales,

610. Craspedophora magnifica, Gray. Der Schildhopf, le Proméfil, on und Q, aus Neu Guinea.

611. Epimachus maximus (Scop.), Cuv.

Der Kragenhopf, l'Épimaque à collet,

o', aus Neu Guinea.

612. Seleucides ignota, Forsten.

Der Fadenhopf, la Séleucide éclatante,

d' und ♀, aus Neu Guinea.

613. Semioptera Wallacei, Gray.

Der Standartenträger, le Sémioptère de Wallace,

3, von Batchian.

Unterfam. Paradiseinae, Gray.

Rabenparadiesvögel.

614. Paradisea apoda, Linné.

Der grosse Paradiesvogel, le grand Émeraude ou grand Paradisier jaune;

♂ und ♀, von Aru.

615. PARADISEA MINOR, Shaw. (PAPUANA, Bechst.).

Der kleine- oder Papu-Paradiesvogel, le petit Paradisier jaune,

disier jaune,

d', aus Neu Guinea.

616. PARADISEA SANGUINEA, Shaw.

Der rothe Paradiesvogel, le Paradisier rouge,

of, von Waigiou.

617. Schlegelia Wilsoni (Cassin), Gray.

Der nacktköpfige Schnirkelschweif, le Paradisier de Wilson,

3, von Waigiou.

618. DIPHYLLODES MAGNIFICUS (Scop.).

Der grünbauchige Schnirkelschweif, le Magnifique,

3, von Salwatti.

619. CICINNURUS REGIUS (L.), Vieill.

Der Königsparadiesvogel, le Roi des oiseaux de Paradis,

3, aus Neu Guinea.

621. Astrapia gularis (Lath.).

Die Paradieselster, l'Astrapie à gorge d'or,

d' und ♀, aus Neu Guinea.

Unterfam. Xanthomelinae.

Paradiespirole. Loriots de Paradis.

622. XANTHOMELUS AUREUS, Bonap.

Der Paradiespirol, le Loriot de Paradis,

3, aus Neu Guinea.

Famil. Sturnidae, Vigors.

Unterfam. **Eulabetinae**, Gray.

Staare. Étourneaux.

Grakeln.

623. Eulabes Javanensis, Osbeck.
Die javanische Atzel,
1, aus Java.

Unterfam. Sturninae, Sws.

Staare. Étourneaux.

*624. Pastor roseus, Linné.

Der Rosenstaar, le Martin roselin,

of alt, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. v. Peyerimhoff,

of alt, aus Frankreich,

o alt und 1 jung, von Smyrna.

Anmerkung: Der Rosenstaar kommt im Elsass nur höchst selten und zufällig vor.

625. ACRIDOTHERES TRISTIS (L.), Vieill.

Der Trauerstaar,

♂ und ♀, von Réunion, Gesch. des Museums in Réunion.

626. ACRIDOTHERES NIGRICOLLIS, Payk.

2, aus Cochinchina.

627. TEMENUCHUS PAGODARUM (Gmel.), Caban.

Der Pagodenstaar,

3, aus Birma.

628. Temenuchus sinensis (Gmel.), Caban.

2, aus Cochinchina.

*629. STURNUS VULGARIS, Linné.

Der gemeine Staar, l'Étourneau vulgaire,

d und Q im Frühjahrskleid, aus dem Elsass,

3 im Herbstkleid, aus dem Elsass,

3 junge (September), aus dem Elsass,

1 Varietät, weiss gescheckt, nur Flügel und Schwanz sind normal gefärbt, aus dem Elsass,

1, aus Algier, Gesch. des Herrn Ch. Grad.

630. STURNUS UNICOLOR, La Marm.

Der Schwarzstaar, l'Etourneau noir,

1, aus Sardinien,

1 alt und 2 jung, aus Algier.

631. CRAEDION CARUNCULATUS, Forst.

Der Lappenstaar,

Q, aus Neu Seeland.

Unterfam. Buphaginae, Sws.

Madenhacker.

632. Buphaga erythrorhyncha, Stanley.

Der rothschnäblige Madenhacker,

2, aus Abyssinien.

Unterfam. Eurycerotinae, Bonap.

633. Euryceros Prevosti, Lesson.

Der Helmschnabelstaar,

1, aus Madagaskar.

Unterfam. Juidinae, Gray.

Glanzstaare.

634. JUIDA AENEA (L.), Gray.

Der Glanzstaar,

5, vom Senegal.

635. Juida purpuroptera, Rüppel. 1, aus Abyssinien.

636. Juida aurata (L.).

Der Goldglanzstaar,

3, vom Senegal.

637. Juida splendida (Vieill.). 3, vom Senegal.

638. Juida nitens (L.).
4, vom Senegal.

639. Pholidauges leucogaster (L.), Caban.

Der Schuppenglanzstaar,

3 ♂ und 3 ♀, vom Senegal.

C40. Notauges chrysogaster, Cabanis.

Der Erzbauchglanzstaar,

2 ♂ und 1 ♀, vom Senegal.

641. Amydrus morio, Cabanis.

642. PSILORHINUS ALBIROSTRIS (Rüppel), Caban. 3, aus Abyssinien.

643. Scissirostrum dubium (Lath.), Gray. 1, von Celebes.

644. HARTLAUBIA AURATA (Müller), Hartl.

♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

Famil. Icteridae, Cabanis.

Stärlinge. Troupiales.

Unterfam. Icterinae, Swainson.

Gilbvögel.

- 645. Cassicus Montezuma, Less.

 Der Montezuma-Krähenstärling,
 1, aus Mexico.
- 646. Cassicus persicus (L.). 2, aus Cayenne.
- 647. Cassicus naemorrhous (L.). 2, aus Brasilien.
- 648. Amblycercus nigerrimus (Spix.), Caban. 4, aus Brasilien.
- 649. ICTERUS JAMACAI (Gmel.).
 1, aus Brasilien.
- 650. Andriopsar Giraudi, Cassin. 1, aus Mexico.
- 651. Andriopsar Gularis (Wagler), Cassin. 2, aus Mexico.
- 652. Andriopsar parisorum, Bonap. 3, aus Mexico.
- 653. Pendulinus rufaxilus, Bonap. 1, aus Mexico.
- 654. Melanopsar cayanensis (L.), Cassin. 2, aus Cayenne.
- 655. Bananivorus spurius (L.), Bonap.
- 656. YPHANTES BALTIMORE (L.), Vieill.

 Der Baltimorvogel,

 1, aus Mexico.
- 657. AGELAIUS PHOENICEUS (L.), Vieill.

 Der Rothflügeltrupial,

 3 ♂ und 1 ♀, aus Nordamerika.
- 658. AGELAIUS GUBERNATOR, Wagler.

 Der Gouverneur,

 O, aus Californien, Gesch. des Herrn Kohler.

659. LEISTES SUPERCILIARIS, Natt. u. Bonap.

3, aus Cayenne.

660. PSEUDOLEISTES VIRIDIS (Cassin.), Sclat.

1, aus Brasilien.

661. XANTHOSOMUS ICTEROCEPHALUS, Cabanis.

2, aus Cayenne,

1, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

662. STURNELLA LUDOVICIANA (L.), Gray.

2, aus Nordamerika, Gesch. des Herrn Dr. Reech.

663. STURNELLA NEGLECTA, Audubon.

1, aus Mexico.

664. STURNELLA MEXICANA, Sclater.

1, aus Mexico.

665. Pezites Defilippii, Bonap.

1, aus Chile.

666. Pezites militaris (L.), Cabanis.

o, aus Bolivia.

667. Dolichonyx oryzivorus (L.), Sws.

Der Reisstärling oder Bobolink,

2, aus Cayenne.

668. ERYTHROPSAR FRONTALIS (Vieill.), Cass.

1, aus Cayenne.

669. MOLOTHRUS ATER (Bodd.), Sws.

Der Kuhstärling,

1, aus Mexico.

670. MOLOTHRUS AENEUS, Wagl.

Der Glanzkuhstärling,

1, aus Mexico.

671. MOLOTHRUS BONARIENSIS, (Gmel.).

1, aus Brasilien.

Unterfam. Quiscalinae, Gray.

Schwarzvögel.

672. QUISCALUS PURPUREUS (Bartr.), Gray. Der Purpurschwarzvogel,

o' und Q, aus Nordamerika.

673. Quiscalus aeneus, Ridgw.

Der Glanzschwarzvogel,

1, aus Labrador,

1 jung, aus Canada.

674. Quiscalus macrurus, Sws.

Der Langschwanz-Schwarzvogel,

1, aus Mexico.

Famil. Ploceidae, Cabanis.

Webervögel. Tisserins.

Unterfam. Ploceinae, Gray.

675. Textor Alecto, Temm.

Der Alectoweber,

2, vom Senegal.

676. HYPHANTORNIS TEXTOR (Gmel.).
Der Viehweber,

2, vom Senegal.

677. HYPHANTORNIS PERSONATUS (Vieill.).

2, vom Senegal.

678. HYPHANTORNIS MELANOTIS (Lafr.).

1, vom Senegal.

679. Hyphantornis brachypterus (Sws.), Bonap.

1, vom Senegal.

680. PLOCEUS SANGUINIROSTRIS (L.).

Der Rothschnabelweber,

3 ♂ und 1 ♀, vom Senegal.

681. Foudia madagascariensis (L.), Reichb.

1 d'alt, 1 jung, aus Madagaskar, Geschenk des Museums in Réunion

682. Foudia erythrops, Hartl.

3 ♂, vom Senegal.

683. EUPLECTES FLAMMICEPS, Sws. 67, vom Senegal.

684. EUPLECTES FRANCISCANUS, Isert.

Der Feuerweber,

3 ♂, vom Senegal.

685. EUPLECTES AFER (Gmel.).

Der Maskenweber, 3 & vom Senegal.

686. PHILETAERUS SOCIUS (Lath.), Smith.

1, aus Südafrika.

687. NIGRITA BICOLOR, Sclater.

2, vom Senegal.

Unterfam. Viduanae, Cabanis.

Widavögel (Hahnenschweifwittwen).

688. VIDUA PRINCIPALIS (L.), Gray.

J, vom Senegal.

689. VIDUA VERREAUXI, Cassin.

2 &, aus Ostafrika.

690. VIDUA LATICAUDA, Licht.

Die Breitschwanzwittwe,

J, aus Abyssinien.

Unterfam. Spermestinae, Cabanis.

Prachtfinken.

691. Spermospiza guttata (Vieill.), Gray.

2, vom Senegal.

692. Spermospiza Haematina (Vieill.), Gray.

1, vom Senegal.

693. ESTRELDA NIGRICAUDA, Reichenbach.

3, vom Senegal.

694. Estrelda melpoda, Vieill.

1, vom Senegal.

695. ESTRELDA BENGALA, L.

Der Bengalifink,

4, vom Senegal.

696. Estrelda natalensis, Cabanis. 2, vom Senegal.

697. ESTRELDA AMANDAVA, L.

1, von der Insel Réunion, Gesch. des Museums in Réunion.

698. Estrélda Minima, Vieill.

Der Blutastrild,

4, vom Senegal.

699. ESTRELDA NIGRICOLLIS, Heuglin. 2, vom weissen Nil.

700. Estrelda phoenicoptera, Sws. 1, vom Senegal.

701. Amadina cucullata, Sws. 5, vom Senegal.

702. AMADINA NANA, Pucher.

1 ♂ und 3 ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

703. AMADINA PECTORALIS, Gould. 1, aus Australien.

704. Amadina oryzivora (L.), Gray. Der Reisfink,

4, aus Java,

1 Varietät, weiss, aus Japan.

705. Amadina punctulata (L.).

1, von der Insel Réunion, Gesch. des Museums in Réunion.

706. Amadina cantans (Gmel.). 3, aus Abyssinien.

707. Amadina striata (L.). 1, aus Malabar.

708. HYPOCHAERA NITENS (Gmel.). 4, aus Abyssinien.

709. Hypochaera spec. (unbestimmt). 1, aus Afrika.

Famil. Tanagridae, Boie.

Tangaren. Tangaras.

Unterfam. Tanagrinae, Swainson.

710. RAMPHOCELUS JACAPA (L.), Boie.

3, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel, 2 3, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Rieger,

2 ♀, aus Cayenne.

711. RAMPHOCELUS BRASILIUS (L.), Boie.

්, aus Brasilien, Gesch. des Herrn Rieger,

♂, aus Brasilien, Gesch. des Herrn Yves,

J jung, aus Brasilien.

712. RAMPHOCELUS SANGUINOLENTUS (Less.), Sclat.

J, aus Mexico.

713. Piranga rubra (L.), Gray.

Die Scharlachtangara,

2 3, aus Canada, Gesch. des Hrn. Missionar Kohler.

714. PIRANGA AESTIVA (Gmel.).

Die Sommertangara,

o, aus Mexico.

715. PIRANGA SAIRA, Spix.

♂ und ♀, aus Cayenne.

716. PIRANGA LUDOVICIANA, Wilson.

2 7, aus Mexico.

717. PIRANGA ERYTHROMELAENA, Sclater.

1, aus Mexico.

718. LANIO ATRICAPILLUS (Gmel.), Vieill.

Die Würgertangara,

3 o, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

719. THRAUPIS EPISCOPUS (L.), Boie.

2 &, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel;

o, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Rieger.

720. THRAUPIS DIACONUS, Less.

o, aus Mexico.

721. THRAUPIS ORNATA, Sparrmann.

2 &, aus Brasilien.

722. THRAUPIS PALMARUM, Wied.

Die Palmentangara,

1, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel,

1, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Rieger,

2, aus Brasilien.

723. THRAUPIS ABBAS, Licht.

3, aus Mexico.

724. THRAUPIS STRIATA, Gmel.

1, aus Brasilien.

725. TACHYPHONUS MELALEUCUS, Sparrm.

o, aus Brasilien, Gesch. des Herrn Rieger,

ond Q, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel,

2 d, aus Brasilien.

726. TACHYPHONUS SURINAMUS (L.), Vieill.

2 3, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel,

8, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Aimé Gros.

727. TACHYPHONUS CRISTATUS (Gmel.), Vieill.

3, aus Brasilien, Gesch. des Herrn Yves.

728. TRICHOTHRAUPIS QUADRICOLOR (Vieill.), Caban.

 $2 \circlearrowleft$ und $4 \circlearrowleft$, aus Brasilien.

729. Phoenicothraupis rubicus (Vieill.), Caban.

2 o, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel,

J jung, aus Brasilien.

730. Phoenicothraupis rubicoides, Lafr.

2 o, aus Mexico, Gesch. des Herrn Thomas.

731. CALLISTE TATAO (L.), Sclat.

7, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Rieger,

2 o, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

732. CALLISTE CYANOCEPHALA (Müll.), Sclat.

J, aus Brasilien, Gesch. des Herrn Yves.

733. CALLISTE PUNCTATA (L.), Sclat.

♂ und Q, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

734. CALLISTE FLAVA (Gmel.), Sclat.

1, aus Brasilien.

735. CALLISTE CAYANA (L.), Sclat.

2 o, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel,

 $2 \circlearrowleft$ und $1 \circlearrowleft$, aus Cayenne.

736. CALLISTE PRETIOSA, Cabanis.

♂, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

737. CALLISTE BRASILIENSIS (L.), Sclat.

o, aus Brasilien.

738. CALLISTE MEXICANA (L.), Sclat.

♂, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

739. PIPRAIDEA MELANONOTA (Vieill.), Sclat.

o, aus Brasilien.

740. Nemosia fulviceps, Cabanis.

1, aus Brasilien.

741. TANAGRELLA VELIA (L.), Sws.

o, aus Cayenne.

Unterfamil. Pitylinae, Cabanis.

742. SALTATOR MAXIMUS (Müll.), Gray.

2, aus Cayenne.

743. SALTATOR MAGNOIDES, Lafr.

1, aus Mexico.

744. SALTATOR ATRICEPS, Less.

1, aus Mexico.

745. SALTATOR SIMILIS, Lafr.

2, aus Brasilien.

746. ORCHESTICUS CAPISTRATUS, Cabanis.

1, aus Brasilien.

747. PITYLUS ERYTHROMELAS (Gmel.), Sclat.

2 3, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

748. CARYOTHRAUSTES VIRIDIS (Vieill.), Rchb.

♂, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

749. CARYOTHRAUSTES BRASILIENSIS, Cabanis.

る, aus Brasilien.

750. CARYOTHRAUSTES POLIOGASTER, Du Bus.

1, aus Mexico.

Unterfam. Procniatinae, Sclater.

751. PROCNIAS TERSA (L.), Gray.

A, aus Brasilien, Gesch. des Hrn. von Peyerimhoff,

7, aus Brasilien, Gesch. des Herrn Zæppfel,

♂, aus Brasilien.

Unterfam. Euphoninae, Cabanis.

Organisten.

752. Euphonia elegantissima, Bonap. 2 ♂ und 1 ♀, aus Mexico.

753. Euphonia chlorotica (L.), Gray. S, aus Cayenne.

754. Euphonia minuta, Cabanis.

7, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

755. EUPHONIA VIOLACEA (L.), Gray.

7, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

756. Сиlоворномы viridis (Vieill.), Bonap.

757. CHLOROPHONIA OCCIPITALIS, Du Bus.

Famil. Fringillidae, Swainson.

Finken. Pinsons.

Unterfam. Fringillinae, Sws.

*758. Fringilla coelebs, Linné.

Der Buchfink, le Pinson ordinaire,

o, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Thierry,

2 9, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Geiger,

2 d, von Colmar.

*759. Fringilla montifringilla, Linné.

Der Bergfink, le Pinson des montagnes,

2 J, im März, Elsass, Gesch. des Herrn Becker,

 $2 \circlearrowleft \text{ und } 2 \circlearrowleft$, aus dem Elsass.

*760. CARDUELIS ELEGANS, Stephenson.

Der Distelfink, le Chardonneret,

2 on und 1 ♀, aus dem Elsass,

O' Varietät (Melanismus) aus dem Elsass. Mit Ausnahme der Ohrfedern, die braun sind, ist das ganze Kopfgefieder schwarz; die andern Theile des Körpers normal gefärbt;

1 jung, Varietät, von Buxweiler, Gesch. des Herrn Becker, September 1876,

(Albinismus). Flügel und Schwanz sind normal gefärbt, aber alles Uebrige ist weiss. Das Roth um den Schnabel kaum angedeutet,

2 Bastarde von Distelfink und Kanarienvogel.

*761. LINARIA ALNORUM, Brehm.

Der Leinfink, le Sizerin,

 $3 \circlearrowleft \text{ und } 1 \circlearrowleft$, aus dem Elsass.

*762. LINARIA HOLBOELLI, Cabanis.

Der Langschnabelleinfink, le Sizerin à bec long,

1, aus dem Elsass.

763. LINARIA BOREALIS, Temm.

Der nordische Leinfink, le Sizerin boréal,

 $2 \circlearrowleft$ und $2 \circlearrowleft$, aus Nordeuropa.

*764. Cannabina sanguinea, Sandberger.

Der Bluthänfling, la Linotte, .

od und Q, im Sommer, aus dem Elsass,

o, im Winter, id.

765. CANNABINA FLAVIROSTRIS (L.).

Der Berghänfling, la Linotte des montagnes,

2 ♂, aus Skandinavien,

1 ♀, aus Pommern.

*766. CHRYSOMITRIS SPINUS, Boie.

Der Erlenzeisig, le Tarin vulgaire,

♂ und \, aus dem Elsass.

767. CHRYSOMITRIS ATRICEPS, Salvin.

2 o, aus Mexico.

*768. CITRINELLA ALPINA, Bonap.

Der Zitronenzeisig, le Venturon,

2 \Im und 1 \Im , aus dem Elsass.

*769. SERINUS HORTULANUS, Koch.

Der Girlitz, le Serin,

3 d, aus dem Elsass.

*770. SERINUS CANARIA (L.).

Der Kanarienvögel,

4, domestizirt.

*771. LIGURINUS CHLORIS, Koch.

Der Grünfink, le Verdier,

 $2 \circlearrowleft$ und $1 \circlearrowleft$, aus dem Elsass,

3, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. A. Macker,

o, id. Gesch. des Herrn Becker.

772. SYCALIS FLAVA, Cab.

1, aus Brasilien.

*773. Pyrgita petronia, Brehm.

Der Steinsperling, le Soulcie,

3 ♂ und 2 ♀, aus dem Elsass.

774. Montifringilla nivalis, Brehm.

Der Schneefink, le Pinson des neiges,

2 ♂ und 1 ♀, aus der Schweiz.

*775. Passer domesticus (Linné).

Der Haussperling, le Moineau.

3 ♂ und 3 ♀, aus dem Elsass,

Q. Varietät, Bollweiler, Gesch. des Hrn. Baumann. Das Exemplar hat theilweise weisse Schwingen, ist aber sonst normal gefärbt.

Q? Varietät, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. Doyen. Vollkommener Albinismus. Total weiss gefärbt.

Q? Varietät, Logelbach, Gesch. des Hrn. A Herzog. Albinismus. Der ganze Vogel grauweiss gefärbt.

♂ und ♀, von der Insel Réunion Gesch. vom Museum in Réunion,

Beide Stücke äusserst klein und sehr blass gefärbt, besonders das Q.

*776. Passer montanus (Linné).

Der Feldsperling, le Friquet,

2 o, aus dem Elsass.

777. PASSER ITALIAE, Vieill.

Der Rothkopfsperling,

d und Q, aus Italien.

778. Passer hispaniolensis, Auct. (P. Rufipectus, Bonap.)
Der Halsbandsperling,
2 3, aus Spanien.

779. Pyrgitopsis simplex (Sws.), Bonap.

2, vom Senegal.

780. Pyrgitopsis diffusus, Smith.

1, aus Südafrika.

Unterfam. Coccothraustinae, Swainson.

Kernbeisser. Gros-becs.

*781. Coccothraustes vulgaris, Pallas.

Der Kirschkernbeisser, le Gros-bec vulgaire,

 $2 \nearrow$, $2 \supsetneq$, 1 junger, aus dem Elsass,

3, aus Algier, Gesch. des Herrn Ch. Grad.

782. HESPERIPHONA VESPERTINA, Bonap.

1, aus Mexico.

Unterfam. Passerellinae, Cabanis.

Ammerfinken.

783. Pipilo erythrophthalmus, Vieill.

2, aus Nordamerika.

784. ZONOTRICHIA SP. (unbestimmt).

1, aus Nordamerika.

785. Passerella Iliaca, Sws.

2, aus Labrador.

786. Coturniculus manimbe, Licht.

1, aus Brasilien.

Unterfam. Cyanospizinae. Sclat.

Buntfinken.

787. TIARIS JACARINA, Sws.

4, aus Brasilien.

788. PASSERINA CYANEA, Vieill.

Der Blaufink,

3 o, aus Mexico.

789. Passerina ciris, Vieill.

Der Pabst,

d, aus Mexico.

790. PAROARIA GULARIS, Sclat.

♂ und ♀, aus Cayenne.

791. PAROARIA CUCULLATA, Bonap.

Der graue Kardinal,

3, aus Brasilien.

792. PHONIPARA PUSILLA, Sclat.

1, aus Mexico.

*793. PYRRHULA EUROPAEA, Vieill.

Der Gimpel, le Bouvreuil,

 $3 \circlearrowleft \text{ und } 2 \circlearrowleft$, aus dem Elsass.

1 Varietät (Melanismus) Käfigvogel.

*?794. Pyrrhula europaea major, Brehm (Pyrrhula coccinea, Selys.).

Der Grossgimpel, le grand Bouvreuil,

3, aus dem Schwarzwald in Baden.

Anmerkung: Der Grossgimpel, welcher sich nur durch weit bedeutendere Grösse von dem bei uns überall vorkommenden Gimpel unterscheidet, bewohnt den Norden von Europa und die höheren Gebirge im Süden. Im Schwarzwald findet er sich in den Gebirgen von 2000 Fuss Höhe an aufwärts. Es ist demnach sehr wahrscheinlich, dass der Grossgimpel auch in den höheren Vogesen vorkommt.

795. CRITHAGRA SULPHURATA (L.), Sws.

♂, und \(\rightarrow\), aus S\(\text{u}\) dafrika.

- 796. Crithagra chrysopyga, Sws.
 - 1, angeblich von Réunion, was aber sehr unwahrscheinlich ist.
- 797. CARPODACUS ERYTHRINUS (Pallas), Kaup.

 Der Karmingimpel, le Gros-bec incertain,

 of und \(\rightarrow \), aus Russland.

Unterfam. Spermophilinae, Sclater.

Knacker.

- 798. Uragus sibiricus (Pallas), Keys. u. Blas. Der Meisengimpel, &, aus Sibirien.
- 799. CARDINALIS VIRGINIANUS (L.), Bonap. Der rothe Kardinal, 2 3, aus Mexico.
- 800. Goniphaea caerulea (L.), Gray. 3 of und 1 ♀, aus Mexico.
- 801. GONIPHAEA CYANEA (L.), Gray. 1, aus Brasilien.
- 802. Hedymeles ludovicianus (L.), Cab.

 Der Rosenbrustknacker,

 3 3, aus Mexico.
- 803. Hedymeles melanocephalus, Sws. 2 3, aus Mexico.
- 804. GYRINORHYNCHUS NIGROAURANTIA (Bodd.), Reichb.

 1, aus Brasilien.
- 805. Gyrinorhynchus Lineolus (L.), Reichb. 1, aus Cayenne.
- 806. Gyrinorhynchus hypoxanthus, Burmeister. 1 Q, aus Brasilien.
- 807. Gyrinorhynchus, collarius (L.); Reichb. 2, aus Brasilien.

Unterfam. Loxianae, Bonaparte.

Kreuzschnäbel. Becs croisés.

*808. Loxia curvirostra, Linné.

Der Fichtenkreuzschnabel, le Bec croisé, 3, aus dem Elsass, 2 3, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Scherrer, 1 jung, von Buxweiler, Gesch. des Herrn Becker, 3, aus der Schweiz.

809. Loxia pithyopsittacus, Bechstein,

Der Kiefernkreuzschnabel, le Bec croisé des sapins,

on und ♀, aus Oesterreich,

♀, aus Frankreich (Coll. St. Firmin).

810. LOXIA LEUCOPTERA, Gmelin,

Der Weissbindenkreuzschnabel,
2 3, alt und jung, aus Canada.

811. Pinicola enucleator (L.), Vieill.

Der Hakengimpel,

♂ und ♀, aus Dänemark.

812. PINICOLA CANADENSIS, Brehm. 3 und Q, aus Labrador.

Famil. Emberizidae, A. Newton.

Ammern. Bruants.

813. Euspiza melanocephala (Scopoli).

Der Kappenammer,

2 3, von Sarepta.

814. Euspiza pithyornus, Pallas.

Der Fichtenammer,

1. aus Sibirien.

*815. Emberiza citrinella, Linné.

Der Goldammer, le Bruant jaune,
2 ♂ und 2 ♀, aus dem Elsass.

*816. EMBERIZA CIRLUS, Linné.

Der Zaunammer, le Bruant zizi,

1, aus dem Elsass,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. v. Peyerimhoff.

*817. Emberiza Hortulana, Linné.

Der Gartenammer, le Bruant ortolan,

1, von Colmar, Gesch. des Herrn von Peyerimhoff, 2, aus Italien.

Anmerkung: Der Gartenammer kommt nur höchst selten und zufällig im Elsass vor.

*818. EMBERIZA CIA, Linné.

Der Zippammer, le Bruant fou,

1, aus dem Elsass,

on und Q, von Oltingen.

819. EMBERIZA AUREOLA, Pallas.

Der Weidenammer, le Bruant auréole,

o, von Sarepta.

820. EMBERIZA RUSTICA, Pallas.

Der Waldammer, le Bruant rustique,

1, aus Sibirien.

821. Emberiza pyrrhuloides, Pallas.

Der Gimpelammer, le Bruant des marais,

J, von Sarepta.

*822. MILIARIA, EUROPAEA, Sws.

Der Grauammer, le Bruant Proyer,

♂ und 2 \(\text{\text{q}}\), von Colmar,

2, von Colmar.

*823. Schoenicola schoeniclus (Linné).

Der Rohrammer, le Bruant des roseaux,

2 ♂ und 1 ♀, im Sommer, aus dem Elsass,

o, im Winter, aus dem Elsass.

824. Fringillaria caesia, Sws.

Der Rostammer,

o und ♀, von Smyrna.

825. PLECTROPHANES NIVALIS, Temm.

Der Schneeammer, le Bruant des neiges,

2, aus Schweden.

826. Plectrophanes lapponicus (Linné).

Der Sporenammer,

3 und \(\text{q}, \) aus Nordeuropa.

Famil. Alaudidae, Boie.

Lerchen. Alouettes.

827. Otocoris alpestris (L.), Bonap. Die Alpenlerche, ♂ und ♀, von Archangel.

828. Otocoris cornuta, Swains.
2, aus Nordamerika.

829. Otocoris bilopha, Temminck. jung, aus Algier, Gesch. des Herrn Scherrer.

*830. ALAUDA ARVENSIS, Linné.

Die Feldlerche, l'Alouette des champs,

1, aus dem Elsass,

♂, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Zimmer,

2, aus Frankreich (Coll. St. Firmin),

- 1 Varietät, aus dem Elsass (Albinismus). Die Schwingen und Schwanzfedern sind weiss, und die oberen Flügeldeckfedern, Oberkopf u. Nacken mit weissen Federn gemischt.
- 1 Varietät, aus dem Elsass (Albinismus). Vollkommen isabellfarbig.
- 1 Varietät, aus dem Elsass (Melanismus). Die Färbung ist schwarzbraun, nur der Bauch etwas heller.

*831. LULLULA ARBOREA, Kaup.

Die Heidelerche, l'Alouette Lulu,

1, aus dem Elsass,

1 Varietät, aus dem Elsass (Albinismus). Mit weissen Flügeldecken u. weissen Federn am Kopf. *832. GALERIDA CRISTATA, Boie.

Die Haubenlerche, l'Alouette cochevis ou Cochevis huppée,

1, aus dem Elsass,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Zimmer,

1, vom Senegal.

833. GALERIDA ISABELLINA, Bonap.

Die Isabelllerche,

1, aus Abyssinien.

834. MEGALOPHONUS CRASSIROSTRIS, Vieill. 1, aus Südafrika.

835. CALANDRELLA BRACHYDACTYLA (Leisler).

Die Stummellerche, la Calandrelle,

1, von Sicilien.

836. CALANDRELLA PISPOLETTA (Pallas).

Die Steppenlerche,
2 ♂ und 1 ♀, aus Südrussland.

837. Melanocorypha calandra, Boie.

Die Kalanderlerche, l'Alouette calandre,
2. aus Italien.

838. Melanocorypha leucoptera, Pallas.

Die Weissflügellerche,

♂ und ♀, aus Sarepta.

839. MELANOCORYPHA TATARICA, Pallas.

Die Mohrenlerche, l'Alouette nègre,
2 o, von Archangel.

840. CERTHILAUDA GARRULA, Smith.
Die Heher-Sandlerche,
1, aus Südafrika.

841. MIRAFRA JAVANICA, Harsf. ?

1. von Java?

842. Mirafra ноva, Hartlaub.

Die Hovalerche,

1, von Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

Famil. Coliidae, Gray.

Mäusevögel. Oiseaux-souris.

843. Colius capensis, Gmelin.

1, aus Südafrika.

844. Colius macrurus, Linné.

Der Mäusevogel, l'Oiseau-souris,

2, vom Senegal,

1, aus Abyssinien.

Famil. Musophagidae, Swainson.

Pisangfresser. Musophages.

845. Musophaga violacea, Isert.

Der Bananenfresser, le Musophage violet,

3, vom Senegal.

846. Turacus persa, Cuvier.

Der Turako, le Touraco commun,

3, vom Senegal.

847. Turacus gigas, Stephenson.

Der grosse Turako, le grand Touraco.

d, aus Niam Niam.

848. Schizorhis Africana (Lath.), Wagl.

Der Lärmvogel, Le Touraco varié,

3, vom Senegal.

849. Schizorhis zonurus, Rüppel.

Der Gürtellärmvogel, 1, aus Abyssinien.

Famil. Bucerotidae, Leach.

Hornvögel. Calaos.

850. Buceros rhinoceros, L.

Der Nashornvogel, le Calao rhinocéros,

d, aus Sumatra.

851. Buceros bicornis, L.

Der Doppelhornvogel, le Calao bicorne,

3, aus Cochinchina.

852. Buceros albirostris, Shaw.

Der Weisshornvogel, le Calao à bec blanc,

1, aus Cochinchina.

853. Toccus erythrorhynchus, Strickl.

Der Tok,

2, vom Senegal.

854. Grammicus nasutus (L.), Reichb.

3, vom Senegal.

855. Grammicus semifasciatus (Temm.).

2, vom Senegal.

856. Bucorvus abyssinicus, Lesson.

Der Hornrabe,

1, aus Abyssinien.

Ordnung Scansores, Gray.

KLETTERVÖGEL. — SCANSORES.

Famil. Ramphastidae, Vigors.

Pfefferfresser. Toucans.

857. RAMPHASTOS TOCO, Müller.

Der Riesentukan, le Toco,

1, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Pfeffel.

858. RAMPHASTOS CARINATUS, Swains.

2, aus Mexico, Gesch. des Herrn Dr. Reech.

859. Ramphastos vitellinus, Illiger.

3, aus Cayenne.

860. Pteroglossus discolor, Gray.

Der vielfarbige Arassari, l'Arassari discolore,

J. aus Guatemala.

861. Pteroglossus Bailloni, Vieill.

1, aus Brasilien, Gesch. des Herrn Pfeffel.

862. Pteroglossus viridis (L.).

Der Grünarassari, l'Arassari vert,

o' und ♀, aus Cayenne.

863. Pteroglossus prasinus, Licht. 2, aus Mexico.

Famil. Psittacidae, Leach.

Papageien. Perroquets.

Unterfam. Pezoporinae, Gray.

Plattschweifsittiche.

864. PLATYCERCUS PENNANTI (Lath.), Gray.

Pennants Plattschweifsittich, la Perruche de Pennant,

J, aus Neu Südwales.

Bie Rosella, la Perruche omnicolore, d'alt und jung, aus Australien.

866. Platycercus haematogaster, Gould. Rothbauch-Plattschweifsittich,

3, aus Südaustralien.

867. PLATYCERCUS SPURIUS, Kuhl.

868. PLATYCERCUS SCAPULATUS (Bechst.).

of und Q, aus Neu Südwales.

869. Platycercus novae-zealandiae, Sparrm. 869. aus Neu Seeland.

870. Melopsittacus undulatus (Shaw.).

Der Wellensittich, la Perruche ondulée,

1, aus Australien, Gesch. des Herrn Simottel, 2, aus Australien, Gesch. der Frau Kestner,

1, aus Australien, Gesch. des Herrn Baron von Rheinwald. 871. EUPHEMA ELEGANS, Gould.

1, aus Südaustralien.

872. PRIONITURUS FLAVICANS, Cassin.

J, von Celebes.

873. PALAEORNIS DOCILIS, Vieill.

d und Q, vom weissen Nil.

874. PALAEORNIS TORQUATUS, Bodd.

Der Halsbandsittich,

2 ♀, aus Indien.

875. PALAEORNIS ERYTHROCEPHALUS (Gmel.).

Der Rothkopfsittich,

♂, aus Ceylon.

876. PALAEORNIS LATHAMI, Finsch.

2, aus Cochinchina, Gesch. des Herrn Lallemand.

Unterfam. Arainae, Gray.

Araras. Aras.

877. ARA MACAO (Linné), Cuv.

Der Arakanga, le grand Ara rouge,

3, aus Mexico, Gesch. des Hrn. Spætz in Isenheim.

878. Ara ararauna (Linné).

Der Ararauna, l'Araraune,

o, aus Bolivia.

879. ARA RUBRIGENYS, Lafr.

Der rothohrige Arara,

J, aus Bolivia.

880. Conurus cyanops, Gray.

Der Blaukopf-Keilschwanzsittich,

1, aus Bolivia, Gesch. des Herrn Soulage.

884. Conurus mitratus, Tschudi.

1, aus Bolivia.

882. Conurus aeruginosus (L.).

2. aus Brasilien.

883. CONURUS CRUENTATUS, Wied.

1, aus Brasilien.

884. Conurus leucotis, Licht. 1, aus Brasilien.

Unterfam. Lorinae, Gray.

Pinselzungenpapageien. Loris.

885. Coriphilus taitanus (Gmel.), Wagl.

886. Loriculus Galgulus (L.), Gray.

Das Blaukrönchen,

3, aus Java.

887. Lorius Lori, Kuhl.

Der Breitschwanzlori, le Lori,

3, aus Neu Guinea.

888. Lorius Erythrothorax, Salvadori.

Der Rothbrustlori,

O, aus Neu Guinea.

889. Trichoglossus novae-hollandiae (Gmel.).

Der Pflaumkopflori.

1, aus Australien.

890. Trichoglossus concinnus, Shaw. 1, aus Südaustralien.

891. Trichoglossus pusillus, Shaw. 1, aus Neusüdwales.

892. Trichoglossus porphyreocephalus, Gray. 1, aus Südaustralien.

893. Trichoglossus subplacens, Schater. &, aus Neu Guinea.

Unterfam. Nestorinae, Wagler.

Bergloris.

894. Nestor meridionalis (Gmel.), Wagl. Der Kaka, 87, aus Neu Seeland.

895. DASYPTILUS PESQUETI (Less), Wagl.
Pesquets-Berglori, le Dasyptile de Pesquet,

on, aus Neu Guinea.

Unterfam. Psittacinae, Swains.

Kurzschwanzpapageien.

896. Eclectus cardinalis (Bodd.), Wagl.

Der Rothedelpapagei,

d', aus Neu Guinea, Gesch. des Herrn Soulage.

897. ECLECTUS POLYCHLORUS (Scop.).

Der Grünedelpapagei,

1, aus Neu Guinea.

898. Tanygnathus megalorhynchus (Bodd.), Gray.

899. Coracopsis nigra (L.), Wagl.

of und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

900. Coracopsis vaza, Shaw.

3, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

901. PSITTACUS ERYTHACUS, L.

Der Jako, le Perroquet gris,

1, aus Westafrika, Gesch. des Herrn Dietrich,

1, id. Gesch. des Herrn Scheurer in Thann,

2, alt und jung, aus Westafrika.

902. PSITTACUS TIMNEII, Fraser.

Der Timneh, le Perroquet cendré noir,
1, vom Gabun.

904. Pionias senegalensis (Sws.).

Der Senegalpapagei,

2, vom Senegal.

- 905. Pionias Meyeri (Rüppel). 1, aus Abyssinien.
- 906. Pionias melanocephalus (Linné). 87, aus Brasilien.
- 907. Chrysotis amazonica (L.), Sws. Der Amazonenpapagei, 2, aus Brasilien.
- 908. Chrysotis Levaillanti, Gray.
 2, aus Mexico, Gesch. des Herrn Dr. Reech.
- 909. Chrysotis leucocephalus, (L.).

 Die Weisskopfamazone,

 Käfigvogel, Cuba? Cesch. der Frau Strich,

 Käfigvogel, Cuba? Gesch. des Herrn Soulage.
- 910. Chrysotis Aestivalis, Bonap. 2, aus Mexico.
- 911. Chrysotis vittata (Bodd.). 2, aus Portorico.
- 912. Chrysotis sp. (Unbestimmt). 1, Woher fraglich.
- 913. PSITTACULA PASSERINA (L.).

 Der Sperlingspapagei,

 o⊓ und ♀, aus Brasilien.
- 914. PSITTACULA MELANONOTA, Licht.

 Der schwarzschulterige Zwergpapagei,
 1, aus Brasilien.
- 915. PSITTACULA PULLARIA (Linné).

 Der unzertrennliche Zwergpapagei, l'Inséparable,
 2 \, vom Senegal.
- 916. PSITTACULA CANA (Gmel.). 2 ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.
- 917. PSITTACULA INCERTA, Shaw. 1, aus Malakka.

Fam. Cacatuidae, Bonaparte.

Kakadus, Cacatoës,

918. Nymphicus novae-hollandiae (Gmel.), Wagl.

Die Korella, la Corella,

2, aus Australien,

1, aus Australien, Gesch. des Herrn Baron von Rheinwald.

919. CACATUA SULPHUREA (Gmel.).

Der schwefelgelbe Kakadu, le Cacatoës à huppe jaune,

1, Käfigvogel (von den Molukken), Gesch. des Herrn Aug. Macker.

920. CACATUA GALERITA (Lath.).

Der grosse Gelbkakadu,

1, aus Australien, Gesch. des Herrn Schmitt,

1, aus Australien.

921. CACATUA ROSEICAPILLA, Vieill.

Der Rosenkakadu, le Cacatoës rose,

J, aus Südaustralien.

922. LICMETIS NASICUS (Temm.), Wagl.

Der Nasenkakadu,

o, aus Südaustralien.

Unterfam. Calyptorhynchinae, Bonap.

Langschwanzkakadus.

923. Calyptorhynchus Banksi (Lath.).

Der Rabenkakadu,

o, aus Neusüdwales.

924. Calyptorhynchus galeatus (Lath.).

Der Helmkakadu,

Q, aus Tasmanien.

Unterfam. Microglossinae, Bonap.

Ararakakadus.

925. Microglossus aterrimus, Wagler.

Der Ararakakadu, le Microglosse noir,

d', aus Neu Guinea.

Famil. Strigopidae, Bonaparte.

Nachtpapageien.

926. Strigops habroptilus, Gray.

Der Eulenpapagei, le Strigops habroptile,

3, aus Neu Seeland.

Famil. Capitonidae, Sclater.

Bartvögel. Oiseaux barbus.

927. Pogonorhynchus dubius (Gmel.).

Der grosse Bartvogel, le Barbicau,
4, vom Senegal,

928. Pogonorhynchus Abyssinicus (Lath.). 2, aus Abyssinien.

929. Pogonorhynchus Vieilloti, Leach.

Der rothstirnige Bartvogel, le Barbicau de Vieillot,
3, vom Senegal.

930. CALORHAMPHUS FULIGINOSUS, Temm.

1, aus Borneo.

931. MEGALAIMA ASIATICA (Lath.), Gray. 1, aus Cochinchina.

932. MEGALAIMA LINEATA (Vieill.).

1, aus Bengalen.

933. MEGALAIMA HAEMACEPHALA (Müller).

3, aus Cochinchina,

2, aus Ceylon.

934. CAPITO ERYTHROCEPHALUS (Bodd.), Gray.

4, aus Cayenne.

Famil. Picidae, Leach.

Spechtvögel. Pics.

Unterfam. Picumninae, Gray.

Weichschwanzspechte.

935. Picumnus minutissimus (Gmel.).

Der Zwergspecht,

1, aus Cayenne.

Unterfam. Picinae, Gray.

Schwarzspechte.

*936. Picoides tridactylus (L.), Gray.

Der dreizehige Specht, le Pic tridactyle,

J, aus den Vogesen, Gesch. des Herrn von Peyerimhoff,

2 ♂ und 2 \(\text{q}, \text{ aus der Schweiz.} \)

Anmerkung: Der dreizehige Specht kommt nur sehr selten und zufällig im Elsass vor.

*937. Picus major, Linné.

Der grosse Buntspecht, l'Epeiche,

o' und ♀, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Baron Meyer von Schauensee,

d und \, aus dem Elsass,

o' jung, aus Frankreich (Coll. St. Firmin).

*938. Picus medius, Linné.

Der Mittelspecht, le moyen Epeiche,

♂ und ♀, aus dem Elsass,

o, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn von Peyerimhoff.

*939. Picus minor, Linné.

Der Kleinspecht, le Pic epeichette,

on und ♀, aus dem Elsass,

7, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. v. Peyerimhoff,

d' und \(\rightarrow\), aus Schweden.

940. Picus Leuconorus, Bechstein.

Der Weissspecht, le Pic leuconote,

♂ und Q, aus der Türkei.

941. Picus analis, Horsf.

1, aus Cochinchina.

942. PICUS PUBESCENS, L.

1, aus Labrador.

943. Picus villosus, L.

od und Q, aus Labrador.

944. Picus varius, L.

♂ und ♀, aus Labrador, Gesch. des Hrn. Missionar Kohler,

Q, aus Mexico, Gesch. des Herrn Dr. Reech.

945. Campephilus Malherbi, Gray.

♂ und \, aus Mexico.

946. CAMPEPHILUS MELANOLEUCUS (Gmel.), Gray.

♂ und ♀, aus Cayenne.

*947. DRYOCOPUS MARTIUS (L.), Boie.

Der Schwarzspecht, le grand Pic noir,

2 of und 2 Q, aus dem Elsass,

d' und \, von Sigolsheim, Gesch. des Hrn. Korum.

948. DRYOCOPUS PILEATUS (L.), Boie.

Der Haubenschwarzspecht,

Q, aus Nordamerika.

949. DRYOCOPUS LINEATUS (L.), Boie.

Q, aus Brasilien.

950. DENDROPICUS LAFRESNAYI, Malherb.

J, vom Senegal.

951. DENDROPICUS GOERTAN, Gmel.

J und Q, vom Senegal, Gesch. des Herrn Zæppfel.

Unterfam. Gecininae, Gray.

Grünspechte. Pics verts.

*952. GECINUS VIRIDIS (L.), Boie.

Der Grünspecht, le Pic vert,

d' und ♀, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Ilæn in Beblenheim,

♂ u. ♀, von Colmar, Gesch. des Hrn. Alb. Thierry, ♀, aus Canada, Gesch. des Herrn Missionar Kohler.

*953. GECINUS CANUS (Gmel.), Boie.

Der Grauspecht, le Pic cendré,

2 o und 1 ♀, aus dem Elsass.

954. GECINUS VAILLANTI, Malherb.

Der afrikanische Grünspecht,

2 Q, aus Algier, Gesch. des Herrn Ch. Grad.

955. Campethera punctata (Cuv.), Gray.

2 d, vom Senegal.

956. TRIPONAX JAVENSIS, Cab. u. Heine.

o, aus Sumatra.

957. CELEUS ELEGANS (Müller), Boie.

Der zimmetbraune Gelbspecht,

2 d, aus Cayenne.

958. CHRYSOPTILUS MELANOCHLORUS, Licht.

d, aus Brasilien.

959. Brachypternus aurantius (L.), Strickl.

♀, aus Cochinchina.

Unterfam. **Melanerpinae**, Gray.

960. Centurus Aurifrons, Wagler.

Der Goldstirnspecht,

o, aus Mexico, Gesch. des Herrn Dr. Reech.

961. CHLORONERPES YUCATANENSIS, Cabot.

o, aus Mexico.

962. Chloronerpes aurulentus (Illig.), Sws.

♂, aus Brasilien.

963. Chloronerpes Selysi, Malh.

d, aus Brasilien.

964. Chloronerpes tephrodops, Wagler.

♂ u. ♀, aus Cayenne, Gesch. des Herrn A. Gros, ♂, aus Cayenne.

965. MELANERPES ERYTHROCEPHALUS (L.), Sws.

Der Rothkopfspecht, le Pic à tête rouge,

o, aus Labrador.

966. Melanerpes flavifrons (Vieill.).

Der Gelbstirnspecht, le Pic à front doré,

o', aus Brasilien.

Unterfam. Colaptinae, Gray.

Kukuksspechte.

967. Colaptes auratus (L.), Sws.

Der Goldspecht, le Pic doré,

Q, aus Labrador.

968. COLAPTES MEXICANUS, Sws.

Der Kupferspecht,

of und Q, aus Mexico.

969. Colaptes chilensis, Garnier.

Der Kukuksspecht,

Q, aus Chile.

Unterfam. Yunginae, Bonaparte.

Wendehälse. Torcols.

*970. Yunx torquilla, Linné.

Der Wendehals, le Torcol,

3, aus dem Elsass,

\$\varphi\$, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Niegre.

Famil. Cuculidae, Leach.

Kukuksvögel. Coucous.

Unterfam. Indicatorinae, Swainson.

Honigkukuke.

971. Indicator major, Stephenson.

Der grosse Honiganzeiger,

of, vom Senegal,

Unterfam. Phoenicophaeinae, Gray.

Buschkukuke.

972. Phoenicophaeus curvirostris, Shaw.

1, aus Java.

973. ZANCLOSTOMUS TRISTIS (Less.).

Der Trauerbuschkukuk,

1, aus Cochinchina.

974. RIIINORTHA CHLOROPHAEA, Raffles.

♀, aus Java.

Unterfam. Couanae, Gray.

Kuas.

975. COUA CRISTATA (L.), Cuv.

Die Haubenkua,

o und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

976. COUA CAERULEA (L.), Cuv.

Die Blaukua,

on und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

Unterfam. Diplopterinae, Sclater.

Fasanenkukuke.

977. DIPLOPTERUS NAEVIUS (L.), Boie.

2, aus Cayenne.

978. Dromococcyx mexicanus, Sclater.

Der Fasanenkukuk, 1, aus Guatemala.

Unterfam. Crotophaginae, Swainson.

Madenfresser.

979. CROTOPHAGA ANI, L. Der Ani, l'Ani, 2, aus Brasilien.

980. CROTOPHAGA MAJOR, Gmel.

Der grosse Madenfresser, l'Ani des Palétuviers, 1. aus Brasilien.

981. CROTOPHAGA SULCIROSTRIS, Swainson.

Der schwielenschnäblige Ani,

2, aus Mexico, Gesch. des Herrn Thomas.

Unterfam. Coccyzinae, Swainson.

Fersenkukuke.

982. Coccyzus AMERICANUS (L.), Vieill.

Der Regenkukuk,
2, aus Canada.

983. PIAYA CAYANA, (L.).

Der Rothkukuk,

1, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

984. PIAYA MELHERI, Bonap.

1, aus Mexico, Gesch. des Herrn Dr. Reech.

985. PIAYA RUTILA (Illig.).

1, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

Unterfam. Centropodinae, Bonap.

Sporenkukuke.

986. Centropus senegalensis (L.), Illig.

1, vom Senegal, Gesch. des Herrn André.

987. CENTROPUS AEGYPTIUS, Gmel.

2, aus Abyssinien.

988. Centropus superciliosus, Hemprich u. Ehrbg. 1, von Kordofan.

989. Centropus philippinensis, Cuvier.

1, von den Philippinen.

990. CENTROPUS BENGALENSIS, Gmel.

3 alte und 1 junger, aus Cochinchina.

991. CENTROPUS TOULOU (Müll.), Gray.

♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

Unterfam. Cuculinae, Swainson.

Kukuke. Coucous.

*992. Cuculus canorus, Linné.

Der Kukuk, le Coucou,

J, aus dem Elsass,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn E. Rohté, jung, aus dem Elsass,

jung, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Dr. Macker, 3, aus Frankreich (Coll. St. Firmin).

993. Cuculus Rochi, Hartlaub.

♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

994. CUCULUS LEPTODETUS, Cabanis u. Heine.

1, vom Senegal.

995. Cuculus clamosus, Lath.

Q, vom Senegal.

996. Chrysococcyx smaragdinus, Sws.

Der Smaragdkukuk,

2 ♂ und 1♀, vom Senegal,

8, vom Senegal, Gesch. des Herrn Dr. Hirtz.

997. LAMPROCOCCYX KLAASI (Shaw.).

♂ und Q, aus Südafrika.

998. LAMPROCOCCYX CHRYSITES, Heine.

1, vom Senegal, Gesch. des Herrn André,

1, vom Senegal.

999. Coccystes glandarius (L.), Glog.

Der Strausskukuk,

1, aus Spanien,

1, aus Algier.

1000. Coccystes serratus, Sparrm.

3, vom Senegal, Gesch. des Herrn Zæppfel.

1001. Eudynamys honorata (L.), Vig. u. Horsf. Der Koel,

2 ♂ und 2 ♀, aus Cochinchina.

1002. Scythrops novae-hollandiae, Lath.

Der Riesenkukuk, le Scythrops géant,

o', aus Neu Südwales.

Ordnung Columbae, Latham.

GIRRVÖGEL. — GYRATORES.

Famil. Columbidae, Leach.

Tauben. Pigeons.

Unterfamil. Treroninae, Gray.

Fruchttauben.

1003. TRERON AROMATICA, Bonap.

Die Gewürztaube,

J, aus Java.

1004. TRERON CURVIROSTRA (Gmel.).

1, aus Malakka.

1005. TRERON PHOENICOPTERA, Lath.

♂, aus Nepaul.

1006. TRERON VIRIDIS, Scop.

1, aus Cochinchina.

1, aus Java.

1007. TRERON AUSTRALIS, Mont.

8 aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

1008. TRERON CALVA, Temm.

1, von Senegal, Gesch. des Herrn Zæppfel.

1009. TRERON DELALANDI, Bonap.

8, aus Südafrika.

1010. TRERON NUDIROSTRIS, Sws.

2, vom Senegal.

- 1011. TRERON ABYSSINICA, Lath. 3, aus Abyssinien.
- 1012. PTILINOPUS PURPURATUS (Gmel.), Sws.
- 1013. PTILINOPUS MELANOCEPHALUS (Gmel.), Sws. Q, aus Java.
- 1014. PTILINOPUS JAMBU (Gmel.), Sws. jung, aus Java.
- 1015. ALECTRAENAS SPANZANI (Verr.), Gray. Die Warzentaube,
 1, von den Comoren.

Unterfam. Columbinae, Selby.

Tauben.

- 1016. CARPOPHAGA SYLVATICA, Tick. 2, von Malabar.
- 1017. CARPOPHAGA OCEANICA (Lesson). 1, von den Carolinen.
- 1018. Carpophaga magnifica, Temm. Q, aus Australien.
- 1019. CARPOPHAGA NORFOLCIENSIS (Lath.), Gray. Q, aus Australien.
- 1020. COLUMBA LIVIA, Bonap.
 Die Felsentaube, le Bizet,
 1, aus Italien.
- *1022. Columba Palumbus, Linné. Die Ringeltaube, la Colombe ramier, 3 alte und 1 junge, aus dem Elsass.
 - 1023. COLUMBA CORENSIS, Gmel. of, von St. Domingo.
 - 1024. COLUMBA GUINEA, Linné. Q, aus Abyssinien.

1025. COLUMBA PLUMBEA, Vieill.

1, aus Brasilien.

1026. COLUMBA RUFINA, Temm.

1, aus Cayenne,

1, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Rieger.

1027. COLUMBA SP. (unbestimmt).

1, vom Senegal.

1028. COLUMBA SP. (unbestimmt).

1, vom Senegal.

1029. Ectopistes marginata (L.), Sws.

3, aus Mexico, Gesch. des Herrn Dr. Reech.

1030. Ectopistes migratorius (L.), Sws.

Die Wandertaube, le Pigeon migrateur,

2, aus Labrador, Gesch. des Hrn. Missionar Kohler,

1, aus Canada.

1031. OENA CAPENSIS (L.), Selby.

2, vom Senegal, Geschenk des Herrn Baron von Bheinwald.

1032. GEOPELIA TRANQUILLA, Gould.

1, aus Australien.

1033. Geopelia humeralis, Temm.

1, aus Australien.

1034. MACROPYGIA AMBOINENSIS (L.), Gray.

1, von Amboina.

*1035. Turtur auritus, Gray.

Die Turteltaube, la Tourterelle,

3, von Colmar,

1, » » Gesch. des Herrn Dr. Macker.

1036. Turtur rupicolus, Pallas.

1, aus China.

1037. TURTUR PICTURATUS, Temm.

2, von Réunion, Gesch. des Museums in Réunion.

1038. Turtur chinensis (Scop.).

1. aus Java.

1039. TURTUR SENEGALENSIS (L.).

1, aus Abyssinien.

*1040. Turtur risorius (Linné).

Die Lachtaube,

2, domestizirt. (Die Heimath ist China.)

1041. CHAMAEPELIA PASSERINA (L.).

Das Sperlingstäubchen,
1, aus Brasilien.

1042. CHAMAEPELIA GRISEOLA, Spix. 1, aus Brasilien.

1043. Chamaepelia amazilia, Bonap. 2, aus Mexico.

1044. Chamaepelia rufipennis, Gray. 1, aus Mexico.

1045. Columbula cruziana, Lafr. 1. aus Peru.

1046. SCARDAFELLA SQUAMOSA (Temm.), Bonap. 1, von Bahia.

1047. SCARDAFELLA INCA (Less.), Bonap. 1, aus Mexico.

1048. Zenaida leucoptera (L.), Bonap. ♀, von den Antillen.

1049. Zenaida sp. (unbestimmt). Woher ist fraglich.

1050. Zenaida sp. (unbestimmt). Woher ist fraglich.

1051. Peristera cinerea, Temm. 1, aus Cayenne.

1052. Oreopelia montana (L.), Rchb. 1, aus Brasilien.

1053. LEPTOPTILA VERREAUXI, Bonap. 1, aus Neu Granada.

Unterfam. Geotrygoninae, Brehm. Lauftauben.

1054. GEOTRYGON CRISTATA, Temm.
Die Haubenlauftaube,
1, aus Jamaica.

1055. GEOTRYGON LINEARIS, Prevost.

1, aus Neu Granada.

1056. APLOPELIA TYMPANISTRIA (Temm.), Bonap.

1, aus Südafrika.

1057. OCYPHAPS LOPHOTES (Temm.), Gould.

Die Schopftaube,

d, aus Neusüdwales.

1058. Chalcophaps Javanensis (Müll.), Gray. 1, aus Java.

1059. Рпарѕ снассортева (Lath.), Selby.

Die Erzslügeltaube,

1, aus Neusüdwales.

1060. LEUCOSARCIA PICATA (Lath.), Gould. Die Elstertaube, la Colombe pie, 1, aus Neusüdwales.

1061. OTIDIPHAPS NOBILIS, Gould.

3, aus Neu Guinea.

1062. PHLEGOENAS LUZONICA (Scop.), Rchb.

Die Dolchstichtaube,

Q, von den Philippinen.

Unterfam. Caloenadinae, Brehm.

Mähnentauben.

1063. CALOENAS NICOBARICA (L.), Gray.

Die Mähnentaube, le Nicobar à camail,
2, aus Neu Guinea.

Unterfam. Gourinae, Gray.

Krontauben.

1064. Goura Albertisi, Salvadori.

Die Albertis Krontaube, le Goura couronné d'Albertis,

J, aus Neu Guinea.

Ordn. Gallinae, Linné.

HÜHNERVÖGEL. — GALLINACÉS

Fam. Pteroclidae, Bonap.

Flughühner. Gangas.

1065. Pterocles arenarius, Pallas.

Das Ringelflughuhn, le Ganga unibande,

of und Q, aus Spanien.

1066. Pterocles fasciatus, Scopoli.

Das gebänderte Flughuhn,
2, aus Indien.

1067. Pterocles alchata (Linné).

Das Spiessflughuhn, le Ganga,

3, aus Spanien,
Gesch. des Herrn Zimmer.

1068. PTEROCLES GUTTATUS, Licht. 1, aus Algier.

Unterfam. Syrrhaptinae, Bonap.

Steppenhühner. Syrrhaptes.

*1069. Syrrhaptes paradoxus, Pallas.

Das Steppenhuhn, le Syrrhapte,

Jung, im Dezember 1888 todt auf dem Feld bei Meyenheim (Elsass) gefunden, Gesch. des Herrn Jung-Gully.

Die Zeichnung des Gefieders ist wie beim alten \mathcal{S} , aber die Färbung viel dunkler; Kehle, Oberbrust und Flügeldecken dunkelrauchschwarz, Oberkopf und Brust bis zum Bauch hinab quergebändert. \mathcal{S} und \mathcal{P} (alt) von Gurgew (Turkestan).

Famil. **Cracidae**, Vigors. Hokkovögel.

Unterfam. Penelopinae, Gray.

Schakuhühner. Jacus.

1070. PENELOPE JACUACA, Spix.

Das Schakuaka,

1, aus Brasilien.

1071. ORTALIDA VETULA, Wagler. 1, aus Mexico.

Unterfam. Oreophasidinae, Sclater.

Berghokkos. Oréophases.

1072. Oreophasis Derbianus, Gray.

Der Berghokko, l'Oréophase de Derbi,

d', aus Guatémala.

Unterfam. Cracinae, Gray.

Hokkos.

Famil. Opisthocomidae, Selys.

Zigeunerhühner. Hoazins.

1074. Opisthocomus cristatus, Gmel.

Das Schopfhuhn, l'Hoazin huppé,
1, aus Surinam.

Fam. Megapodidae, Swainson.

Grossfusshühner.

Unterfam. Talegallinae, Gray.

Hühnerwallnister.

1075. MEGACEPHALON MALEO, Temm.

Das Hammerhuhn, le Maléo,

o', von Celebes.

Famil. Phasianidae, Vigors.

Fasanenvögel.

Unterfam. Pavoninae, Gray.

Pfauen. Paons.

*1076. PAVO CRISTATUS, L.

Der Hauspfau, le Paon,

♂ und ♀, domestizirt,

2 &, weisse Varietät, domestizirt, Gesch. des Hrn. E. Fauconnot-Dufresne.

1077. Pavo muticus, Linné.

Der Wildpfau, le Paon sauvage,

o, aus Java.

1078. Polyplectron bicalcaratum (L.), Temm.

Der Spiegelpfau,

♂ und Q, aus Assam.

1079. Argusianus giganteus, Temminck.

Der Argus, l'Argus,

J, aus Sumatra.

Unterfam. Phasianinae, Gray.

Fasanen. Faisans.

*1080. Phasianus colchicus, Linné.

Der Edelfasan, le Faisan commun,

on und ♀ alt, sowie ganz jung, aus dem Elsass,

2 of alt, von Gebweiler, Gesch. des Hrn. Schlumberger,

d'alt, Varietät, aus dem Elsass,

(Albinismus), ganz weiss gefärbt, mit Ausnahme weniger dunkler Federchen am Hals und den Brustseiten, sowie der oberen Flügeldecken, welche grau angeflogen und gesprenkelt sind.

♀ Varietät, von Gebweiler, Gesch. des Herrn E. de Bary,

(Albinismus), Kopf und Hals weiss, nur mit einzelnen grauen Federn gemischt, Tibia weiss, Backen hellbraun; auf den Flügeln, dem Rücken und Bürzel einzelne weisse Federn.

♀ Varietät, aus dem Elsass,

(Albinismus), ziemlich gleich der vorigen Henne gefärbt, hat nur etwas mehr Weiss.

o, Varietät, aus dem Elsass, durch Innzucht sehr blass gefärbt,

7, Varietät, von Staffelfelden, Gesch. des Herrn E. de Bary, gleichfalls durch Innzucht blass gefärbt

♀ hahnenfedrig, von Gebweiler, Gesch. des Herrn E. de Bary,

Kopf und Hals haben die Färbung des Hahnes, alle übrigen Theile diejenigen der Henne.

♀ hahnenfedrig, von Pulversheim, Gesch. des Herrn E. de Bary,

Fast gleich dem vorigen Exemplar.

1081. Phasianus torquatus, Temm.

Der Halsbandfasan, le Faisan à collier, 3, aus China. 1082. Phasianus mongolicus, Brandt.

Der mongolische Fasan,

d, vom Altai.

1083. Phasianus versicolor, Vieill.

Der Buntfasan, le Faisan versicolore,

J, aus Japan.

1084. Syrmaticus Reevesi, Gray.

Der Königsfasan, le Faisan vénéré,

J, aus China.

*1085, Chrysolophus pictus (L.), Gray.

Der Goldfasan, le Faisan doré,

2 of, domestizirt, Gesch. des Herrn Baron von Rheinwald,

1 ♂ u. 2 Q, domestizirt, Gesch. des Herrn Barth,

♀ und ganz jung, domestizirt.

1086. Chrysolophus Amherstiae, Leadbeater.

Der Lady-Amherstfasan, le Faisan de Lady Amherst,

o, aus Thibet.

1087. GALLOPHASIS LEUCOMELANUS (Lath.).

2 ♂ und 1 ♀, vom Himalaya, Gesch. des Herrn

Baron von Rheinwald.

*1088. Gennaeus nycthemerus (L.), Wagl.

Der Silberfasan, le Faisan argente,

♂ u. Q, domestizirt, Gesch. des Hrn. Schlumberger,

o, domestizirt, Gesch. des Herrn Baer.

1089. LOPHOPHORUS IMPEYANUS (Lath.), Temm.

Der Glanzfasan, le Lophophore resplendissant,

♂ und ♀, vom Himalaya.

Unterfam. Gallinae, Gray.

Kammhühner. Coqs.

1090. GALLUS BANKIVA, Temminck.

Das Bankivahuhn, le Coq sauvage,

Q, aus Java.

1091. GALLUS SONNERATI, Temm.

Das Sonneratshuhn, le Coq de Sonnerat,

8, aus Bengalen.

Das Djungelhuhn, le Coq de Lafayette, d', aus Ceylon.

1093. CERIORNIS MELANOCEPHALUS, Gray.

Der Jewar, le Tragopan à tête noire,

o', vom Himalaya.

Unterfam. Meleagrinae, Gray.

Truthühner. Dindons.

1095. Meleagris gallopavo, Linné.

Das wilde Truthuhn, le Dindon sauvage,

3, aus Virginien.

Unterfam. Numidinae, Bonap.

Perlhühner. Pintades.

*1096. Numida meleagris, L.

Das gemeine Perlhuhn,
2. domestizirt.

1097. Numida мітката, Pallas. d', aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

Famil. **Tetraonidae**, Vigors. Waldhühner.

Unterfam. Perdicinae, Bonaparte.

Feldhühner. Perdrix.

1098. Francolinus bicalcaratus (L.), Grav.

Der Doppelsporn-Frankolin,

2 ♂ und 1 \,Q, vom Senegal.

1099. Francolinus vulgaris, Steph.

Der Frankolin, le Francolin à collier,

♂, 2 \(\varphi\) und 1 junger, aus Griechenland.

*1100. STARNA CINEREA (Lath.), Bonap.

Das Feld- oder Rebhuhn, la Perdrix grise,

3 ♂, 2 ♀, 1 junges, aus dem Elsass.

1 Varietät, aus Frankreich (Coll. St. Firmin).

(Melanismus und Albinismus). Die allgemeine Färbung ist kastanienbraun, der Hals weiss, Kopf, Kehle und Nacken sind isabell, die Tibien und Bauchmitte weiss, Flügeldecken mit weissem Längsstreif.

1 Varietät, aus Frankreich (Coll. St. Firmin).

(Melanismus und Albinismus). Das Exemplar gleicht dem Vorigen im Allgemeinen, nur ist die kastanienbraune Färbung viel dunkler, fast schwarzbraun und am Hals fehlt das Weisse.

1 Varietät, aus Frankreich (Coll. St. Firmin).

(Albinismus). Das Colorit erscheint weiss, nur der Schwanz hellbräunlich und die Zeichnung der seitlichen Bauchfedern, wie die der Kehle, silbergrau.

*1101. Coturnix dactylisonans, Meyer u. Wolf.

Die Wachtel, la Caille commune,

5 ♂, 1 ♀, und 1 junge, aus dem Elsass,

of und Q, aus Frankreich (Coll. St. Firmin).

1102. Coturnix Australis, Lath.

Die australische Wachtel, la Caille d'Australie, 1, aus Australien.

1103. Coturnix sp. (Unbestimmt).

Unbekannt woher.

Unterfam. Rollulinae, Bonaparte.

Strausswachteln.

1104. Rollulus Roulroul, Scop. Die Strausswachtel, o, aus Java.

Unterfam. Turnicinae, Gray.

Laufwachteln.

1105. TURNIX SYLVATICA (Desf.), Gray. Das Laufhähnchen, 2 3, aus Spanien.

1106. Turnix nigricollis, Gmel.

Das schwarzkehlige Laufhähnchen, of und Q, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

Unterfam. **Odontophorinae**, Gray.

Baumhühner.

1107. ORTYX VIRGINIANUS (L.), Gray. Die Baumwachtel, 1, aus Nordamerika.

1108. ORTYX PECTORALIS, Gould.

♂ und \(\text{q} \), aus Mexico.

1109. CALLIPEPLA SQUAMATA (Vigors), Wagl. J und Q, aus Mexico.

1110. LOPHORTYX CALIFORNICA (Lath.).

Die Kalifornische Schopfwachtel, le Colin huppé, o, aus Californien,

Gesch. des Hrn. Kestner in Thann, 0,

 Gesch. des Herrn. Hertrich,
 Gesch. des Herrn Scheurer,
 Herrn Emil de B ♂ u. ♀, φ,

» Gesch. des Herrn Emil de Bary. 0,

1111. LOPHORTYX GAMBELI, Nutt.

Gambels Schopfwachtel,

d' und Q, aus Neu-Mexico.

Unterfam. Caccabinae, Gray.

Berghühner. Bartavelles.

1112. CACCABIS SAXATILIS, Naumann,

Das Steinhuhn, la Bartavelle,

♂ und Q, aus der Schweiz,

1, aus der Schweiz, Gesch. des Hrn. v. Peyerimhoff, 2, aus Frankreich (Coll. St. Firmin).

1113. CACCABIS CHUCAR, Gray.

Das Chukarsteinhuhn,

1, aus Griechenland.

1114. CACCABIS RUFA (L.), Gray.

Das Rothhuhn, la Perdrix rouge,

d und ♀, aus Spanien,

of und ♀, aus Frankreich, Gesch. des Herrn Baron von Rheinwald.

1115. CACCABIS PETROSA (Gmel.), Gray.

Das Klippenhuhn, la Perdrix des roches,

♂ und ♀, sowie junges, aus Sardinien,

Q, aus Algier, Gesch. des Herrn Ch. Grad,

1, aus Algier (Coll. St. Firmin),

1, aus Algier, Gesch. des Hrn. Baron v. Rheinwald.

Unterfam. Tetraoninae, Gray.

Rauchfusshühner. Tétras.

*1116. Tetrao urogallus, Linné.

Das Auerhuhn, le grand Coq de Bruyère,

2 o, aus dem Elsass,

2 Q, aus dem Elsass,

7, von Geberschweier, Gesch. des Herrn Forstrath Grimmel,

Q hahnenfedrig, aus dem Elsass.

Färbung: Kopf und Hals schieferschwarz, Kehle weiss mit wenigen schwarzen Federn gemischt, Flügel, Rücken und Bürzel dunkelbraun, Schwanz schwarz mit schmaler weisser Endbinde, Brust dunkelbraun, grünlich schillernd, Bauch bis zum After weiss und braun gesprenkelt, die Federn mit weissen Endspitzen, Tibien weiss, Läufe grau.

1117. Tetrao hybridus, Linné.

Das Rackelhuhn, le Tetras Rackelhahn,

J, aus Schweden.

1118. TETRAO CANADENSIS, L.

o, aus Labrador.

*?1119. TETRAO TETRIX, Linné.

Das Birkhuhn, le Coq de bouleau,

on, aus Tirol,

of und Q, aus dem Elsass,

♂ und Q, aus Frankreich (Coll. St. Firmin).

Anmerkung: Ob das Birkenhuhn in den Vogesen vorkommt ist zweifelhaft.

*1120. Bonasa sylvestris, Brehm.

Das Haselhuhn, la Gelinotte,

 $2 \circlearrowleft$ und $2 \circlearrowleft$, aus dem Elsass.

1121. Bonasa cupido (L.).

Das Prairiehuhn, le Tetras cupidon,

8, aus Nebraska,

o, aus Java.

1122. Bonasa umbellus (L.).

♂ und ♀, aus Canada:

1123. LAGOPUS ALBUS (Gmel.), Vieill.

Das Moorhuhn, le Lagopède du Nord, ou le Tetras des saules,

1 im Herbst, aus Norwegen,

3 im Winter, aus Norwegen.

1124. LAGOPUS SCOTICUS (Lath.).

Das Schottenhuhn, le Grousse d'Ecosse,

of im Sommer, aus Schottland,

2 ♂ im Frühjahr, aus Schottland, ♂ und 2 ♀, aus Schottland.

1125. Lagorus mutus (Leach.).

Das Schneehuhn, le Lagopède des Alpes, 1 im Sommer, aus der Schweiz, 4 im Winter, aus der Schweiz, 5 im Frühjahr, aus der Schweiz.

1126. Lagopus rupestris (Gmel.).

Das arktische Schneehuhn,

3 im Winter, aus Labrador.

Ordn. Struthiones, Latham.

STRAUSSVÖGEL. - AUTRUCHES.

Famil. Struthionidae, Vig. Strausse.

1127. STRUTHIO CAMELUS, L.

Der Strauss, l'Autruche,

Q, aus Südafrika.

Famil. Rheidae, A. Newton. Nandus. Nandous.

1128. RHEA AMERICANA, Lath.

Der Nandu, le Nandou,

altes o, aus La Plata,

ganz jung, ca 3 Monate alt, id.

Famil. Casuariidae, Kaup.

Unterfam. **Dromaiinae**, Gray.

Emus. Emous.

1129. Dromaius novae-hollandiae, Vieill. Der Emu, l'Emou,
1, aus Australien.

Unterfam. Casuariinae, Reichb.

Kasuare. Casoars.

1130. CASUARIUS GALEATUS, Vieill.

Der Helmkasuar, le Casoar,

3 alt, aus Ceram (Molukken).

Famil. Apterigidae, Selys.

Schnepfenstrausse. Apteryx.

1131. APTERYX OWENI, Gould.

Der kleine Schnepfenstrauss, le petit Kiwi,

3, aus Neu-Seeland.

Ordn. Grallae, Linné.

STELZVÖGEL. - ÉCHASSIERS.

Famil. Otididae, Selys.

Trappen. Outardes.

*1132. Otis tarda, L.

Die Grosstrappe, l'Outarde barbue, 2 ♀, aus dem Elsass, ♀, 1862 bei Colmar erlegt, ♂, von Sarepta.

*1133. Otis tetrax, L.

Die Zwergtrappe, la Cannepetière,

d und 2 \(\text{q}, \) aus dem Elsass,

d jung, von Colmar,
d, aus Algier, Gesch. des Herrn Maritz.

1134. Eupodotis Denham, Childr.

Die Denhamstrappe, l'Outarde de Denham, 1, vom Senegal.

1135. EUPODOTIS MELANOGASTER, Rüpp.

Die Schwarzbauchtrappe, l'Outarde à ventre noir,

of und Q, vom Senegal.

1136. EUPODOTIS SENEGALENSIS (Vieill.).

Die Senegaltrappe, l'Outarde du Sénégal,

of und Q, vom Senegal.

1137. Eupodotis houbara (Gmel.).

Die Kragentrappe,

♂ und \(\rightarrow \), aus Algier, Gesch. des Herrn Dr. Reech.

Famil. Charadriadae, Vigors.

Regenpfeifer. Pluviers.

Unterfam. Oedicneminae, Gray.

Dickfüsse. Oedicnèmes.

*1138. OEDICNEMUS CREPITANS, Temm.

Der Triel, l'Oedicnème criard,

Q, von Wattweiler, Gesch. des Hrn. Baron von Goor,

o, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. v. Peyerimhoff,

id.

Ritzenthaler,

 \mathcal{O} , id.

1, id.

1, aus Egypten.

1139. OEDICNEMUS SENEGALENSIS, Sws.

2, vom Senegal.

1140. ESACUS MAGNIROSTRIS, Geoffr.

J, aus Südaustralien.

Unterfam. Charadrinae, Gray.

Regenpfeifer. Pluviers.

*1141. Vanellus cristatus, Meyer u. W. Der Kiebitz, le Vanneau huppé, 2 Q, von Colmar,

♀ jung, von Colmar (Mai 1870),

o, von Colmar (November),

3, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Scherrer, jung, von Bollweiler. id. Baumann,

jung, von Bollweiler, 1, aus Frankreich.

1142. CHETTUSIA GREGARIA, Pall.

Der Steppenkiebitz, le Vanneau social,

on alt und ♀ jung, von Sarepta.

1143. LOBIVANELLUS INDICUS, Strickl.

3, von Calcutta, Gesch. des Hrn. Prof. Dr. Schimper.

1144. LOBIVANELLUS LOBATUS, Strickl.

1, aus Neu-Südwales.

1145. LOBIVANELLUS SENEGALENSIS (Müll.).

1, vom Senegal, Gesch. des Herrn Zæppfel.

1146. Hoplopterus spinosus, Bonap.

Der Sporenkiebitz,

1, vom Senegal, Gesch. des Herrn Zæppfel.

1147. HOPLOPTERUS VENTRALIS (Cuv.).

2, aus Cochinchina.

1148. HOPLOPTERUS CAYANUS (Lath.).

1, aus Cayenne,

1, aus Chile.

1149. Hoplopterus melanopterus, Rüpp.

2, vom Senegal.

*1150. SQUATAROLA MELANOGASTER, Bechst.

Der Kiebitzregenpfeifer, le Vanneau pluvier,

of im Sommerkleid, aus dem Elsass,

1, im Winterkleid, aus dem Elsass,

o, im Winter, von Rügen,

1, im Sommerkleid, aus Frankreich,

1, im Uebergangskleid (Herbst), aus Frankreich,

1, aus der Schweiz, Gesch. des IIrn. v. Peyerimhoff.

*1151. Charadrius pluvialis, L.

Der Goldregenpfeifer, le Pluvier doré,

1, von Colmar (Dezbr.), Gesch. des Herrn Math. Schwartz, 2 im Winter, aus dem Elsass,

⊋ id. id.

1, im Winter, von Pulversheim, Gesch. des Herrn Schlumberger,

1, aus Algier, Gesch. des Herrn Maritz.

1152. CHARADRIUS VOCIFERUS, L.

1, aus Labrador,

3, aus Mexico.

*1153. Eudromias morinellus (L.), Boie.

Der Mornellregenpfeifer, le Pluvier guignard,

1, im Sommerkleid, aus dem Elsass,

1, im Winterkleid, id.

1154. EUDROMIAS ASIATICUS (Pall.), Boie.

Der Steppenregenpfeifer,

1, aus Algier, Gesch. des Herrn Maritz.

*1155. AEGIALITES HIATICULA (L.), Kaup.

Der Halsbandregenpfeifer, le Pluvier à collier.

4 or und 1 Q, aus dem Elsass.

of im Sommer, id.

*1156. AEGIALITES MINOR, Meyer u. W.

Der Flussregenpfeifer, le petit Pluvier à collier,

1, von Colmar,

2 d und 1 ♀, von Colmar,

1, von Colmar, Gesch. des Herrn Meyer,

2 ♂ und 1 ♀, aus Frankreich.

1157. AEGIALITES CANTIANUS (Lath.).

Der Seeregenpfeiser, le Pluvier à collier interrompu,

3, aus Frankreich.

1158. Aegialeus semipalmatus, Kaup.

2, aus Labrador.

1159. Leucopolius tenellus, Heuglin.

d und ♀, vom Senegal.

Famil. Glareolidae, Selys.

Schwalbenwader. Glaréoles.

1160. GLAREOLA PRATINCOLA, L.

Die Brachschwalbe, la Glaréole,

1, von der Wolga,

1, vom Senegal, Gesch. des Herrn Zæppfel,

jung, aus Algier, » » Dr. Hagenmüller

1161. GLAREOLA MELANOPTERA, Nordm.

Die Steppenbrachschwalbe,

1, von Sarepta.

1162. GLAREOLA MEGAPODIA, Gray.

1, vom Senegal.

Unterfam. Cursorinae, Gray.

Rennvögel.

1163. PLUVIANUS AEGYPTIUS (L.), Gray.

Der Krokodilwächter,

1, vom Senegal, Gesch. des Herrn André.

1164. Cursorius gallicus, Gmel.

Der Wüstenläufer,

1, aus Frankreich,

1, ans Algier.

1165. Cursorius superciliosus, Heuglin.

1, vom Senegal.

Famil. Haematopodidae, Selys.

Austernfischer. Huîtriers.

1166. HAEMATOPUS OSTRALEGUS, L.

Der Austernfischer, l'Huitrier pie,

2, von der Nordseeküste.

1167. HAEMATOPUS PALLIATUS, Temm.

1, aus Peru.

1168. Haematopus longirostris, Vieill. 1, aus Australien.

Unterfam. Strepsilinae, Gray. Steinwälzer. Tourne-pierres.

1169. STREPSILAS INTERPRES, Illig.

Der Steinwälzer, le Tourne-pierre,

of und ♀, aus Frankreich,

of, aus Nordeuropa,
♀, aus Mauritius.

Famil. Gruidae, Vigors.

Kraniche. Grues.

*1170. GRUS CINEREA, Bechst.

Der graue Kranich, la Grue cendrée,

J, von Lützelburg (Dezember 1851),
jung, von Versailles,
1, aus Algier.

1171. Anthropoides virgo, Vieill.

Der Jungfernkranich, la Grue demoiselle,
1, von der Wolga.

1172. BALEARICA PAVONINA, Briss.

Der Pfauenkranich, la Grue couronnée,

J, aus Abyssinien,
J, vom Senegal.

Famil. Ardeidae, Vigors.

Reiher. Hérons.

d jung, von Hüningen, Gesch. der Fischzuchtanstalt,

♀, aus dem Elsass,

of aus Algier, Gesch. des Herrn Ch. Grad.

*1174. ARDEA PURPUREA, L.

Der Purpurreiher, le Héron pourpré,

o, aus dem Elsass,

jung, von Sarepta,

o, von Nizza,

J, vom Senegal.

1175. ARDEA HERODIAS, L.

o, aus Mexico, Gesch. des Herrn Dr. Reech.

1176. ARDEA MELANORHYNCHA, Wagl.

3, vom Senegal.

1177. ARDEA EGRETTA, Gmel.

Der Edelreiher, l'Egrette,

♂ und ♀, von Sarepta,

o, aus Algier, Gesch. des Herrn Dr. Hagenmüller.

*1178. ARDEA GARZETTA, L.

Der Seidenreiher, la Garzette,

jung, aus dem Elsass,

Q, vom Senegal.

1479. Ardea candidissima, Gmel.

2, aus Mexico, Gesch. des Herrn Thomas.

1180. ARDEA AGAMI, Gmel.

♂, aus Mexico, Gesch. des Herrn Zæppfel.

1181. ARDEA COROMANDA, Bodd.

aus Cochinchina,

id. Gesch. der Frau Dietz.

*1182. ARDEA COMATA, Pall.

Der Rallenreiher, le Crapier huppé,

1, aus dem Elsass, Gesch. des IIrn. v. Peyerimhoff,

1, aus Frankreich,

1, aus Italien,

1, aus Algier, Gesch. des Herrn Maritz,

1183. Ardea flavicollis, Lath.

1, aus Cochinchina.

1184. ARDEA VIRESCENS, L.

1, aus Canada.

1185. ARDEA JAVANICA, Horsf.

1, aus Cochinchina.

1186. ARDEA ATRICAPILLA, Afz.

3 alt, vom Senegal,

1 jung, id.

Unterfam. Botaurinae, Reichb.

Rohrdommeln. Butors.

*1187. ARDETTA MINUTA, Gray.

Die Zwergrohrdommel, le Blongios vulgaire,

3, von Colmar, Gesch. des Herrn V. Eggerle,

J, aus dem Elsass, id. Napol. Baumann,

 \mathcal{J} , id.

1, aus Frankreich.

1188. ARDETTA PODICEPS, Gray.

1, aus Westafrika, Gesch. des Herrn Maritz.

*1189. BOTAURUS STELLARIS, Steph.

Die Rohrdommel, le Butor étoilé,

o, von Colmar, Gesch. des Herrn Aug. Macker,

1, von Staffelfelden, id. Emil de Bary,

J, von Colmar, id. Radat,

Q, von Ensisheim, id. Meyer.

4190. BOTAURUS LENTIGINOSUS (Mont.).

1, aus Californien.

*1191. NYCTICORAX EUROPAEUS, Steph.

Der Nachtreiher, le Bihoreau à manteau,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Baumann in Bollweiler,

Q, aus der Dobrudscha,

o, aus Algier,

1, vom Senegal.

1192. NYCTICORAX CALEDONICUS (Gmel.).

o aus Neu Caledonien, jung, aus Cochinchina. 1193. Nycticorax naevius (Bodd.).

of und jung, aus Mexico, Gesch. des Herrn Thomas.

Unterfam. Scopinae, Bonap.

Hammerköpfe.

1194. Scorus umeretta, Gmel.

Der Schattenvogel,

1, vom Senegal,

1, vom Cap der g. Hoffnung.

Unterfam. Cancrominae, Bonap.

Kahnschnäbler. Savacous.

1195. CANCROMA COCHLEARIA, L.

Der Kahnschnabel, le Savacou huppé,

3, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

Famil. Ciconiidae, Selys.

Störche. Cigognes.

*1196. CICONIA ALBA, Bechst.

Der weisse Storch, la Cigogne blanche, S, von Colmar, Gesch. des Herrn Scherrer, jung, id. id. Senk, d id.

*1197. CICONIA NIGRA, L.

Der schwarze Storch, la Cigogne noire,

alt, aus dem Elsass, Gesch. d. Hrn. v. Peyerimhoff,
1, von Colmar (Aug. 77), id. Ostermeyer,
1, von Pulversheim (Septbr. 91), Gesch. des Herrn
Aimé Gros-Schlumberger,
2 jung, aus dem Elsass,
1 alt, im Sommer, aus dem Elsass.

1198. CICONIA EPISCOPUS, Bodd.

1199. LEPTOPTILUS DUBIUS, Strickl.
Der Marabu, le Marabou,
1, aus Cochinchina.

Unterfam. Anastomatinae, Bonap.

Klaffschnäbel. Anastomes.

1200. Anastomus lamelligerus, Temm. Der Klaffschnabel, l'Anastome, o', von Sennaar.

Famil. Plataleidae, Bonap.

Löffelreiher. Spatules.

*1201. PLATALEA LEUCORODIA, L.

Der Löffelreiher, la Spatule blanche,

o, von Colmar, Winter 1879/80,

Q, aus Ungarn.

1202. PLATALEA AJAJA, L.

Der rothe Löffelreiher, la Spatule rose,

3, aus Cayenne.

Famil. Phoenicopteridae, Bonap.

Flamingos. Flamants.

1204. Phoenicopterus erythraeus, Verreaux.
♂, aus Algier.

Famil. Tantalidae, Bonap.

Nimmersatts. Tantales.

1205. TANTALUS LOCULATOR, L.

Der amerikanische Nimmersatt,

1, aus Cayenne, Gesch. der Frau Dietz,

1, id.

1206. TANTALUS IBIS, L.

Der Nimmersatt, le Tantale,

o und Q, vom weissen Nil,

2 junge, vom Senegal.

Unterfamil. Ibidinae, Gray.

Ibise. Ibis.

1207. IBIS RUBRA, Moehr.

Der rothe Ibis, l'Ibis rouge,

J, aus Cayenne.

*1208. IBIS FALCINELLUS, Leach.

Der gemeine Ibis, l'Ibis commun,

1, von Egisheim (22. Septbr. 67),

jung, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Cassron,

jung, aus der Dobrudscha.

1209. IBIS FALCINELLUS, Leach.

var. BENGALENSIS, Licht.

1, aus Cochinchina, Gesch. der Frau Dietz.

1210. GERONTICUS CALVUS (Bodd.).

Der Nacktkopfibis,

d, aus Südafrika, Gesch. des Herrn Maritz.

1211. GERONTICUS MELANOCEPHALUS, Gray.

1, aus Cochinchina.

1212. GERONTICUS CARUNCULATUS, Rüpp.

1, aus Abyssinien.

1213. GERONTICUS HAGEDASCH (Lath.).

2, vom Senegal.

1214. Geronticus comatus, Ehrbg. &, aus Abyssinien.

Famil. Scolopacidae, Vigors.

Schnepfenvögel. Bécasses.

Unterfam. Limosinae, Gray.

Uferschnepfen. Barges.

*1215. Numenius arquatus, Cuvier.

Der grosse Brachvogel, le Courlis cendré,

3, aus dem Elsass,

1, von Sennheim, Gesch. des Herrn Zürcher.

*1216. Numenius phaeopus, L.

Der kleine Brachvogel, le Courlis courlieu,

1, aus dem Elsass,

1, aus Frankreich,

1, aus Madagaskar. Gesch. des Museums in Réunion.

1217. Numenius tenuirostris, Vieill.

Der Sichlerbrachvogel, le Courlis tenuirostre,

o, von Marseille.

*1218. Limosa aegocephala, Aldrov.

Die schwarzschwänzige Uferschnepfe, la Barge à queue noire,

2 (Sommer und Winter), aus dem Elsass,

1, im Sommer, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Schlumberger,

♂ und ♀, aus Frankreich.

1219. LIMOSA LAPPONICA (L.), (L. RUFA, Temm.).

1, im Herbst, von Rügen,

1, aus Frankreich.

1220. Limosa fedoa (L.).

1, aus Nordamerika.

Unterfam. Totaninae, Gray.

Wasserläufer. Chevaliers.

*1221. Totanus stagnatilis, Bechst.

Der Teichwasserläufer, le Chevalier stagnatile,

1, aus dem Elsass,

*1222. Totanus ochropus, Temm.

Der punktirte Wasserläufer, le Chevalier cul-blanc,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Hanser,

Q, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Ernst,

2, aus dem Elsass.

1223. TOTANUS GLAREOLA (L.).

Der Waldwasserläufer, le Chevalier sylvain,

1, von Sarepta,

4, aus Frankreich,

d' und Q, von Genua.

1224. Totanus chloropygius, Vieill.

1, aus Brasilien,

1, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

*1225. Totanus calidris (L.).

Der Gambettwasserläufer, le Chevalier gambette,

Q, aus dem Elsass,

2, aus dem Elsass,

1, aus Frankreich.

*1226. Totanus fuscus (L.).

Der dunkle Wasserläufer, le Chevalier arlequin,

2, im Winter, aus dem Elsass,

1, im Frühjahr, aus dem Elsass,

1, im Sommer, aus Schweden,

2, aus Frankreich.

*1227. Totanus glottis (L.).

Der helle Wasserläufer, le Chevalier aboyeur,

3, im Winter, aus dem Elsass,

1, im Frühjahr, aus dem Elsass.

1228. Totanus floridanus, Bonap.

1, aus Mexico.

1229. TOTANUS SEMIPALMATUS, Gmel.

Der Schwimmwasserläufer,

2, aus Florida.

*1230. Tringoides hypoleucus, Bonap.

Der Flussuferläufer, la Guignette vulgaire,

2 o, im Mai, aus dem Elsass,

2, im September, von Colmar,

1, von Colmar, Gesch. des Herrn Zimmer.

1231. TRINGOIDES HYPOLEUCUS, Bonap.

var. leucopterus (Pall.).

♂ und ♀, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion,

1, aus Algier,

1, vom Senegal.

1232. ACTITIS MACULARIUS (L.).

Der Drosseluferläufer,

1. aus Nordamerika.

1233. Actiturus Longicaudus (Nilss.).

Der Hochlandwasserläufer,

1, aus Nordamerika.

Unterfam. Recurvirostrinae, Bonap.

Säbelschnäbler. Avocettes.

1234. RECURVIROSTRA AVOCETTA, L.

Der Säbelschnäbler, l'Avocette,

d' und \, aus Ungarn,

o, aus Frankreich.

*1235. Himantopus candidus, Bonn.

Der Stelzenläufer, l'Échasse à manteau noir,

Q, von Hüningen, Gesch. des Herrn Petit,

of und ♀, aus Ungarn, Gesch. des Herrn Maritz.

1236. Himantopus intermedius, Blyth.

1, aus Cochinchina, Gesch. der Frau Dietz.

1237. HIMANTOPUS NIGRICOLLIS, Vieill.

Der schwarzhalsige Stelzenläufer,

1, aus Mexico.

Unterfam. Tringinae, Gray.

Strandläufer. Bécasseaux.

*1238. MACHETES PUGNAX, Cuv.

Der Kampfläufer, le Combattant,

1, im Winter, aus dem Elsass,

1, im Frühjahr, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Schlumberger,

1, im Herbst, von Bollweiler, Gesch. des Herrn Zürcher,

on Peyerimhoff,

of und 2 9, aus Frankreich,

6 ♂, im Hochzeitskleid, aus Nordeuropa,

o und Q, im Winter, aus Italien,

1, aus Bengalen.

*1239. TRINGA CANUTUS, L.

Der Roststrandläufer, le Bécasseau Maubèche,

1, im Winter, aus dem Elsass,

1, im Sommer und 1 im Winter, aus dem Elsass,

o, im Sommer, aus Frankreich.

1240. TRINGA MARITIMA, Brünn.

Der Seestrandläufer, le Bécasseau violet,

J, im Winter, von den Orkney-Inseln,

♂, aus Nordeuropa.

1241. Tringa maculata, Vieill.

Der Streifenstrandläufer,

1, aus Labrador.

*1242. TRINGA SUBARQUATA, Güld.

Der Sichlerstrandläufer, le Bécasseau cocorli,

3, im Winter, aus dem Elsass,

1, im Frühjahr, aus dem Elsass,

1, im Sommer, aus Nordeuropa.

*1243. Tringa alpina, L. (T. variabilis, Meyer).

Der Alpenstrandläuser, le Bécasseau cincle,

6, im Winter, aus dem Elsass,

2, im Herbst, aus dem Elsass,

o, im Sommer, aus Pommern,

1, im Sommer, aus Schleswig.

*1244. TRINGA MINUTA, Leisl.

Der Zwergstrandläufer, le Bécasseau à échasse,

2, aus dem Elsass,

2, aus Frankreich.

*1245. TRINGA TEMMINCKI, Leisl.

Das Sandläuferchen, le Bécasseau de Temminck,

1, aus dem Elsass,

1. aus Frankreich.

1246. LIMICOLA PYGMAEA, Koch (TRINGA PLATYRHYNCHA, Temm.).

Der Sumpstäufer, le Bécasseau platyrhynque,

1, aus Schweden.

*1247. CALIDRIS ARENARIA (L.), Cuv.

Der Sanderling, le Sanderling des sables,

2, aus dem Elsass,

2, aus Frankreich.

Unterfam. Scolopacinae, Bonap.

Schnepfen. Bécasses.

1248. MACRORHAMPHUS GRISEUS, Leach.

Die Schnepfenlimose,

o, im Winter, aus Mexico.

*1249. Gallinago major, Bonap.

Die grosse Sumpfschnepfe, la Bécassine double,

Q. von Colmar, November 1871,

1, aus dem Elsass.

*1250. GALLINAGO SCOLOPACINA, Bonap.

Die Heerschnepfe, la Bécassine,

1, von Colmar, Gesch. des Herrn Ch. König,

1, aus dem Elsass,

od und ♀, aus Schweden,

1 Varietät, aus dem Elsass (Albinismus). Vorherrschend isabellfarbig, nur Kopf, Schulter und Flügeldecken grau. *1251. GALLINAGO GALLINULA (L.).

Die Moorschnepfe, la Sourde,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Radat,

o und Q, aus dem Elsass,

1, von Colmar, November 1878.

*1252. Scolopax rusticola, L.

Die Waldschnepfe, la Bécasse,

1, aus dem Elsass,

1 Varietät, von Freistadt in Baden, Gesch. des Herrn de Bary-Schlumberger,

(Albinismus). Die Färbung ist ganz isabell.

1253. RHYNCHAEA CAPENSIS, Cuv.

1, vom Senegal.

1254. RHYNCHAEA BENGALENSIS, Cuv.

1, aus Cochinchina, Gesch. der Frau Dietz.

Famil. Phalaropodidae, Bonap.

Wassertreter.

1255. PHALAROPUS FULICARIUS, Briss.

Der Pfuhlwassertreter,

o, im Sommer, von Island.

1256. PHALAROPUS HYPERBOREUS (L.), Briss.

Die Odinshenne,

2, im Winter, aus Nordeuropa.

Famil. Rallidae, Vigors.

Rallen. Râles.

1257. OCYDROMUS AUSTRALIS, Sparrm.

J, aus Neu Seeland.

1258. Eulabaeornis Bernieri, Bonap.

3 aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

1259. LEWINIA ALBIVENTER, Bonap.

1, aus Cochinchina.

*1260. RALLUS AQUATICUS, L.

Die Wasserralle, le Râle d'eau,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Scheurer,

1, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. v. Peyerimhoff,

Q, von Colmar, December 1869,

1, von Colmar.

1261. RALLUS ELEGANS, Audub.

1, aus Canada.

1262. ARAMIDES MANGLE, Spix.

Q, aus Brasilien.

#1263. CREX PRATENSIS, Bechst.

Die Wiesenralle (Wachtelkönig), le Râle de genêts,

2 ♂, und 2 ♀, aus dem Elsass,

3, von Colmar, Gesch. des Herrn Nitschelm.

Famil. Eurypygidae, Bonap.

Sonnenrallen. Paons des Zoses.

1264. EURYPYGIA HELIAS (Pall.).

Die Sonnenralle, le petit Paon des Zoses, 1, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

Fam. Gallinulidae, Blasius.

Teichhühner. Poules.

Unterfam. Porphyrioninae, Reichenb.

Sultanshühner. Poules sultanes.

1265. Porphyrio melanotus, Temm.

1, aus Neu Caledonien.

1266. Porphyrio smaragnotus, Temm.

Das Smaragdhuhn,

1, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

1267. Jonornis martinicus, Reichb.

Das Purpurhuhn,

1, aus Brasilien.

Unterfam. Gallinulinae, Gray.

Teichhühner. Poules d'eaux.

*1268. GALLINULA CHLOROPUS, L.

Das grünfüssige Teichhuhn, la Poule d'eau commune,

♂, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. Schlumberger, 3 ♂, aus dem Elsass,

3, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Baron von Rheinwald,

of jung, von Bollweiler, Gesch. des Hrn. Baumann,

du. Q, von Thann, Gesch. des Herrn Scheurer,

o, aus Algier,

♂, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

*1269. GALLINULA PORZANA, L.

Das getüpfelte Sumpfhühnchen, la Poule d'eau marouette,

♂ und ♀, von Colmar, Gesch. des Herrn Aug. Macker,

4, aus Frankreich.

*1270. GALLINULA PUSILLA, Gmel.

Das kleine Sumpfhühnchen, la Poule d'eau poussin,

2 Q, aus dem Elsass,

2 8, aus Südrussland,

2 Q, von Nizza.

*1271. GALLINULA PYGMAEA, Naum. (G. BAILLONI, Vieill.).

Das Zwergsumpfhühnchen, la Poule d'eau Baillon,

♂, aus dem Elsass,

o und 2 ♀ jung, aus Frankreich.

1272. Gallinula sp. (Unbestimmt).

Fraglich woher.

1273. LIMNOCORAX FLAVIROSTRIS, Hartl.

3, vom Senegal.

1274. GALLICREX CRISTATUS, Blyth.

Die Hühnerralle,

o, aus Ceylon.

Unterfam. Fulicinae, Bonap.

Wasserhühner. Foulques.

*1275. Fulica atra, L.

Das Wasser- oder Blässhuhn, la Foulque macroule, $1 \triangleleft 1$ und $3 \triangleleft 1$, aus dem Elsass.

1276. Fulica cristata, Ginel.

Das Kammblässhuhn, 1, vom Senegal.

1277. FULICA GIGANTEA, Eyd. u. Soul.

Das Riesenwasserhuhn, la Foulque géante, 1. aus Chile.

Famil. Heliornithidae, Selys.

Saumfüsse.

1278. Heliornis fulica, Bodd.

Das Taucherhühnchen,

J, aus Surinam.

1279. Podica senegalensis, Vieill. 1, vom Senegal.

1280. Podica personata, Gray. 1, aus Cochinchina.

Famil. Parridae, Selys.

Blätterhühnchen. Jacanas.

1281. PARRA JACANA, Gmel.

Die Jassana, le Jacana commun, d'alt und d' jung, aus Brasilien.

1282. PARRA AFRICANA, Lath.

Der afrikanische Spornflügel, le Jacana d'Afrique, 3, vom Senegal.

1283. PARRA INDICA, Lath.

Der indische Spornslügel, le Jacana indien, 2. aus Gochinchina.

1284. Hydrophasianus chirurgus, Wagl. Der Chirurg,

3, aus Ceylon.

Famil. Palamedeidae, Gray.

Wehrvögel. Kamichis.

1285. PALAMEDEA CORNUTA, L.

Der Kamichi oder Aniuma, le Kamichi, o, aus Argentinien.

1286. CHAUNA CHAVARIA, Illig.

Der graue Wehrvogel, la Chaune cendrée, 3, aus Argentinien.

Ordn. Anseres, Linné.

SCHWIMMVÖGEL. — NATATORES.

Unterordn. Lamellirostres, Cuvier.

Hautschnäbler. Lamellirostres.

Famil. Anatidae, Leach.

Entenvögel. Anatides.

Unterfam. Cygninae, Bonap.

Schwäne. Cygnes.

*1287. Cygnus olor, Gmel.

Der Höckerschwan, le Cygne muet, 2, von Colmar, domestizirt.

*1288. Cygnus musicus, Bechst.

Der Singschwan, le Cygne sauvage,

1, von Riedweier, Dezember 1879,

1, von Breisach,

1, von Kuenheim, Februar 1875, Gesch. des Herrn Vicomte de Bussierre,

1, aus dem Elsass.

*1289. CYGNUS ATRATUS, Lath.

Der Trauerschwan, *le Cygne noir*, Colmar, domestizirt, Gesch. des Herrn Vicomte de Bussierre.

Unterfam. Anserinae, Swains.

Gänse. Oies.

*1290. Anser cinereus, Meyer u. W.

Die Graugans, l'Oie cendrée,

1, aus dem Elsass.

*1291. Anser segetum, Gmel.

Die Saatgans, l'Oie sauvage,

od alt und jung, von Colmar, Dezember 1871,

2, aus dem Elsass,

1 Nestjunges, aus Nordeuropa.

*1292. Anser albifrons, Gmel.

Die Blässgans, l'Oie rieuse,

1 alt, aus dem Elsass,

1 jung, aus Südrussland.

1293. Anser minutus, Naum.

Die Zwerggans, l'Oie naine,

♀, aus Frankreich.

1294. CHEN HYPERBOREUS (Pall.), Boie.

Die Schneegans, l'Oie des neiges,

o im Frühjahr, aus Alaska.

*1295. BERNICLA TORQUATA, Bechst.

Die Ringelgans, l'Oie cravant,

1, von Colmar, Dezember 1879, Gesch. des Herrn Scheurer, 1, von Neudorf, Dezember 1894,

1, von Rügen,

1, aus Frankreich.

1296. BERNICLA LEUCOPSIS, Bechst.

Die Nonnengans, l'Oie Bernache,

1, aus Nordeuropa.

1297. Bernicla sandwichiensis, Vig.

1, von den Sandwich-Inseln.

1298. NETTAPUS AURITUS, Gray.

3 o, vom Senegal.

1299. NETTAPUS COROMANDELICUS, Gray.

♂ und Q, von Kalkutta.

1300. CHENALOPEX AEGYPTIACA, Steph.

Die aegyptische Gans, &, aus Nordafrika.

Unterfam. Anatinae, Sws.

Enten. Canards.

1301. DENDROCYGNA ARCUATA, Sws.

1, aus Java.

1302. DENDROCYGNA AFRICANA, Bonap.

1, aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

1303. DENDROCYGNA VIDUATA, Sws.

3, aus Brasilien.

*1304. TADORNA CORNUTA, Leach.

Die Brandente, le Canard tadorne,

1, aus dem Elsass,

1, von Astrachan.

1305. CASARKA RUTILA, Bonap.

Die Rostente, le Casarke,

♂ und ♀, von der Wolga.

1306. AIX SPONSA, Boie.

Die Brautente,

♂ und \, aus Nordamerika,

👌, aus Nordamerika, Gesch. des Hrn. Schlumberger.

*1307. MARECA PENELOPE, Steph.

Die Pfeifente, le Canard siffleur,

3, von Gebweiler, Gesch. des Hrn. Schlumberger,

o, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Rolle,

of, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Scheurer,

Q, aus dem Elsass.

1308. MARECA AMERICANA, Steph.

Die amerikanische Pfeifente, le Canard siffleur d'Amérique,

J, aus Labrador.

*1309. DAFILA ACUTA, Leach.

Die Spiessente, le Canard pilet,

2 \triangleleft und 2 \triangleleft , aus dem Elsass,

1, von Colmar, Gesch. des Herrn Taron.

1310. DAFILA OXYURA, Meyer.

J, aus Chile.

*1311. ANAS BOSCHAS, L.

Die Stockente, le Canard sauvage,

on und ♀, aus dem Elsass,

o, aus Labrador,

o, von Colmar, domestizirt,

♂ und ♀, Varietät, von Gemar, Dezemb. 1879, Gesch. des Herrn Doll.

(Albinismus und Melanismus).

Färbung des 3: weiss, nur Scheitel, Rücken, Bürzel, Zügel, obere Flügeldecken und eine seitliche Brustbinde schwarz;

Färbung des ♀: diese entspricht genau derjenigen des ♂, nur sind die Körpertheile, welche bei diesem schwarz gefärbt sind, beim ♀ grau.

Beide wurden auf dem Entenfang in Gemar bei Colmar mit andern Wildenten gefangen.

o, Bastard, aus dem Elsass, domestizirt.

*1312. Querquedula circia, Steph.

Die Knäckente, la Sarcelle commune,

2 ♂ u. 1 ♀, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. Baron von Rheinwald,

1 ♀, aus dem Elsass.

*4313. QUERQUEDULA CRECCA (L.).

Die Kriekente, la Sarcelle ou petite Sarcelle,

♂ und \(\text{q} \), aus dem Elsass,

8, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Taron,

3, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Baron von Rheinwald.

1314. Querquedula discors (L.).

8, aus Labrador.

1315. Querquedula carolinensis (Gmel.).
3, aus Labrador.

1316. QUERQUEDULA CRECCOIDES (King). Q, aus Chile.

1317. QUERQUEDULA ERYTHRORHYNCHA (Gmel.). 1, aus Südafrika.

1318. Querquedula formosa (Georgi). Q, aus Nord-Asien.

*1319. Chaulelasmus strepera (L.), Gray.

Die Schnatterente, le Canard chipeau,

Q, aus dem Elsass.

1320. MARMONETTA ANGUSTIROSTRIS (Ménétr.).

*1321. Spatula clypeata (L.), Boie.

Die Löffelente, le Canard souchet,

3 3 und 1 \, aus dem Elsass.

1322. MALACORHYNCHUS MEMBRANACEUS, Sws.

*1323. CAIRINA MOSCHATA (L.), Flem.

Die Moschus- oder Bisamente,
2, von Colmar, domestizirt.

*1324. Fuligula rufina, Steph.

Die Kolbenente, le Canard siffleur huppé,

d' und \(\rangle \), aus dem Elsass.

*1325. FULIGULA CRISTATA (Leach.).

Die Reiherente, le Canard morillon,

of und \(\rightarrow \), aus dem Elsass,

of, jung, von Sarepta.

1326. FULIGULA COLLARIS (Don.).

Die Ringelente, le Canard à collier,

d, aus Nordamerika.

*1327. Fuligula marila, Steph.

Die Bergente, le Canard milouinan,

d und \, aus dem Elsass,

Q, aus Algier.

*1328. Fuligula ferina (L.), Sws.

Die Tafelente, le Canard milouin,

d' und ♀, von Colmar,

d, von Gemar, Gesch. des Herrn Bohn.

1329. Fuligula americana, Eyton.

o, aus Labrador.

*1330. Fuligula nyroca (Güld.).

Die Moorente, le Canard à iris blanc,

o', vom Ladhof bei Colmar, Gesch. des Herrn von Peyerimhoff,

of und Q, von Sarepta.

*1331. CLANGULA GLAUCION (L.).

Die Schellente, le Canard garrot,

♂ und 2 \(\text{q}, \text{ aus dem Elsass,} \)

3, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Corrigeux.

1332. CLANGULA ISLANDICA (Gmel.).

Die isländische Schellente, le Canard garrot d'Islande.

on und ♀, von Island.

1333. CLANGULA ALBEOLA (L.).

J, aus Labrador.

1334. CLANGULA HISTRIONICA (L.).

Die Kragenente, le Garrot histrion,

♂, aus Nordeuropa,

♂ und ♀, aus Labrador.

*1335. HARELDA GLACIALIS (L.), Gray.

Die Eisente, le Canard de Miquelon,

♀ jung, von Colmar, November 1864,

3 alt, aus Nordeuropa,

d' und ♀ alt, aus Labrador,

of jung, aus Labrador.

1336. Stelleria dispar, Bonap.

Die Prachteiderente, l'Eider magnifique,

d' und Q, aus Norwegen.

1337. Somateria mollissima (L.), Leach.

Die Eiderente, l'Eider vulgaire,

2 or jung, aus Nordeuropa,

o' im Uebergangskleid, aus Nordeuropa,

d' und Q, aus Labrador.

1338. Somateria spectabilis (L.), Leach.

Die Königseiderente, l'Eider à tête grise,

o, aus Nordeuropa,

Q, aus Labrador.

1339. OIDEMIA PERSPICILLATA (L.), Flem.

Die Brillenente, la Macreuse à large bec,

od und \, aus Nordeuropa,

1340. OIDEMIA NIGRA, Flem.

Die Trauerente, la Macreuse,

d' und Q, aus Nordeuropa.

1341. OIDEMIA FUSCA, Flem.

Die Sammetente, la double Macreuse,

d, aus Nordeuropa,

Q, aus Labrador.

1342. OIDEMIA AMERICANA, Rich.

1, aus Labrador.

1343. OIDEMIA DEGLANDI, Bonap.

d' und \, aus Labrador.

1344. Erismatura Leucocephala, Bonap.

Die Ruderente, l'Erismature couronnée,

o' u. Q alt und 1 Nestjunges, von der Wolga.

1345. Erismatura rubida, Bonap.

1, aus Nordamerika.

Unterfam. Merginae, Bonap.

Säger. Harles.

*1346. MERGUS MERGANSER, L.

Der Gänsesäger, le grand Harle,

Jund 2 Q, von Colmar,

o, von Schlettstadt, Gesch. des Herrn Thomas,

od und ♀, aus Labrador.

*1347. MERGUS SERRATOR, L.

Der mittlere Säger, le Harle huppé,

o, aus dem Elsass.

Q, von Colmar.

1348. MERGUS CUCULLATUS, L.

J, aus Labrador.

*1349. MERGUS ALBELLUS, L.

Der kleine Säger, le Harle piette,

o, von Colmar,

o, von Strassburg,

of jung, aus dem Elsass,

Q, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Deschamps.

Unterordn. Longipennes, Cuv.

Seeflieger. Longipennes.

Famil. Procellariidae, Boie.

Sturmvögel. Pétrels.

1350. Puffinus major, Faber.

Der Wasserscherer,

1, vom atlantischen Ocean.

1351. Puffinus anglorum, Temm.

Der Sturmtaucher,

1, von der Küste Schottlands,

Q, von Nizza.

1352. THALASSIDROMA PELAGICA, Vig.

Die Sturmschwalbe, le Pétrel tempête,

2, vom atlantischen Ocean.

1353. Thalassidroma leucorrhoa, Vieill. (Th. Leachi, Temm.).

Der Sturmsegler,

1, vom atlantischen Ocean.

1354. THALASSIDROMA OCEANICA, Kuhl.

Der Meerläufer,

1, von der Küste Schottlands.

1355. THALASSIDROMA GRALLARIA, Vieill.

Der Fregattsegler,

1, von der Küste Neu Caledoniens.

1356. FULMARUS GIGANTEUS, Leach.

Der Riesensturmvogel, le Pétrel géant,

1, von der südafrikanischen Küste.

1357. Fulmarus glacialis (L.).

Der Eissturmvogel, le Pétrel des glaces,

1, von der Nordsee.

1358. Fulmarus glacialoides, Smith.

Der Polarsturmvogel,

1, von der Küste la Plata's.

1359. DAPTION CAPENSIS, Steph.

Die Kaptaube,

2, vom Kap Horn.

Unterfam. Diomedeinae, Gray.

Albatrose. Albatroses.

1360. DIOMEDEA EXULANS, L.

Der Albatros, l'Albatros géant,

1, vom Kap der guten Hoffnung.

1361. DIOMEDEA CHLORORHYNCHA, Gmel.

Der Grünschnabelalbatros, l'Albatros à bec vert,

1, von der Küste Neu Caledoniens.

Famil. Laridae, Vigors.

Möven. Mouettes.

Unterfam. Lestridinae, Bonap.

Raubmöven. Stercoraires.

*1362. Lestris parasitica, Brünn.

Die Schmarotzer-Raubmöve, la Stercoraire parasite,

jung, von Colmar, Septemb. 1882, Gesch. des Herrn Eggerle,

jung, von Egisheim, Gesch. des Herrn Carro, alt, aus Nordeuropa.

*1363. Lestris pomarina, Temm.

Die Spatelraubmöve, *la Stercoraire labbe*, 2 alt, aus dem Elsass, 1, aus Nordeuropa.

1364. LESTRIS CREPIDATA, Naum. (L. BUFFONI, Boie).
Die Kreischraubmöve,
1, von Archangel.

Unterfam. Larinae, Bonap.

Möven. Mouettes.

*1365. LARUS CANUS, L.

Die Sturmmöve, le Goëland à pieds bleus, 1, von Colmar, Gesch. des Herrn Georg Scheurer, 1 jung, von Andolsheim, 1 jung, von Colmar.

*1366. LARUS MARINUS, L.

Die Mantelmöve, le Goëland à manteau noir, o', von Oberbergheim, November 1876. Gesch. des Herrn Bürgermeister Beltz,

1 alt und 1 jung, aus Nordamerika.

1367. LARUS VETULA, Bruch.

2, vom Senegal.

*1368. Larus fuscus, L.

Die Häringsmöve, le Goëland à pieds jaunes,

♀ jung, von Oberhergheim, Februar 1879, Gesch.
des Herrn Bürgermeister Beltz,

Q, aus dem Elsass,

1, aus Nordeuropa.

*1369. Larus glaucus, Brünn.

Die Eismöve, le Goëland Bourgmestre, ♀ jung, von Schlettstadt, Februar 1876, 1, vom Ladhof bei Colmar, 12. Januar 75, Gesch. des Herrn Jul. Karcher,

1, aus Nordeuropa.

1370. LARUS LEUCOPTERUS, Faber.

Die Polarmöve, le Goëland leucoptère,

1, von Island.

*1371. LARUS ARGENTATUS, Brünn.

Die Silbermöve, le Goëland à manteau bleu,

1, aus dem Elsass,

alt und jung, aus Nordeuropa,

1, vom Senegal.

1372. LARUS ICHTHYAETUS, Pallas.

Die Fischermöve, le Goëland ichthyète,

d, von der Wolga.

*1373. XEMA RIDIBUNDUM, Boie.

Die Lachmöve, la Mouette rieuse,

3 im Winter, aus dem Elsass,

1 im Winter, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn Schlumberger,

1 jung, aus dem Elsass,

1 im Sommer, aus dem Elsass,

1 ganz jung, aus dem Elsass.

1374. XEMA ATRICILLA (L.).

Die Kaputzenmöve, la Mouette à capuchon,

1, vom Mittelmeer.

1375. XEMA MELANOCEPHALA (Natt.).

Die Hutmöve, la Mouette mélanocéphale,

J, von Genua.

1376. XEMA POIOCEPHALA (SWS.).

1, vom Senegal.

1377. XEMA CIRRHOCEPHALA (Vieill.).

2, von Martinique, Gesch. des Herrn Zæppfel.

1378. XEMA PHILADELPHIA (Ord.).

2, aus Labrador.

1379. XEMA SP. (Unbestimmt).

Woher ist unbekannt.

1380. CHROICOCEPHALUS MINUTUS (Pall.), Bonap.

Die Zwergmöve, la Mouette naine,

♂ und Q, von der Wolga.

1381. CHROICOCEPHALUS GELASTES (Licht.).

Die Rosensilbermöve,

♂, aus der Dobrudscha.

*1382. RISSA TRIDACTYLA, Leach.

Die Stummelmöve, la Mouette tridactyle,

4, aus dem Elsass,

1, von Colmar, Gesch. des Herrn Wüst,

1. von Ensisheim, Gesch. des Herrn Schwindenhammer.

Unterfam. Sterninae, Bonap.

Seeschwalben. Hirondelles de mer.

1383. STERNA MACROURA, Nauin.

Die Küstenseeschwalbe,

1, aus Nordeuropa.

*1384. STERNA FLUVIATILIS, Naum.

Die Flussseeschwalbe, l'Hirondelle de mer,

1, von Colmar,

1, von Colmar, Gesch. des Herrn Zimmer,

1, von Colmar, Gesch. des Herrn Petit.

1385. STERNA WILSONI, Bonap.

1, aus Labrador.

1386. STERNA CANTIACA, Gmel.

Q, von Genua,

♂, aus Dänemark,

2, vom Senegal.

1387. STERNA ACUTIFLAVIDA, Cabot.

2, von den Antillen.

1388. STERNA CASPIA, Pall.

Die Raubseeschwalbe,

1, von der Wolga,

1, vom Senegal.

*1389. STERNA MINUTA, L.

Die Zwergseeschwalbe, la petite Hirondelle de mer,

1, aus dem Elsass,

1, vom Senegal.

*1390. HYDROCHELIDON NIGRA, Boie.

Die Trauerseeschwalbe, l'Hirondelle de mer épouvantail,

of im Sommer, aus dem Elsass,

2 im Winter, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. Ernst,

1, aus dem Elsass.

1391. HYDROCHELIDON HYBRIDA (Pall.).

Die Bartseeschwalbe, l'Hirondelle de mer moustache,

1, aus Deutschland,

2, aus Algier,

1392. Hydrochelidon plumbea (Wils.).

1, aus Labrador.

1393. HYDROCHELIDON FISSIPES (L.), Boie.

4, aus Algier.

1394. Hydrochelidon anosthaetus (Scop.).

1, von den Seychellen.

1395. Hydrochelidon leucoptera (Meisn.).

Die Schildseeschwalbe, l'Hirondelle de mer leucoptère,

♂ und ♀, von der Wolga.

1396. Gygis Alba, Wagl.

Die Feenseeschwalbe,

3, von den Seychellen.

1397. Anous stolidus, Leach.

Der Noddi,

1, von den Seychellen.

1398. Anous LEUCOCAPILLUS, Gould.

Die weissköpfige Tölpelseeschwalbe,

1, von den Fiji-Inseln.

Unterfam. Rhynchopsinae, Bonap.

Scheerenschnäbel. Becs en ciseaux.

1399. RHYNCHOPS NIGRA, L.

Der Trauerscheerenschnabel, le Bec en ciseaux noir, 1, aus Centralamerika.

Unterord. Steganopodes, Illig.

Ruderfüssler. Stéganopodes.

Famil. Phaëtontidae, Selys.

Tropikvögel. Oiseaux du Tropique.

1400. PHAETON AETHEREUS, L.

Der Tropikvogel, Oiseau du Tropique, 3, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

Famil. Plotidae, Selys.

Schlangenhalsvögel. Anhingas.

1401. PLOTUS ANHINGA, L.

Der Anhinga, *l'Anhinga*, 3, aus Cayenne, Gesch. des Herrn Zæppfel.

1402. PLOTUS MELANOGASTER, Penn.

Der schwarzbauchige Schlangenhalsvogel, l'Anhinga à ventre noir,

2, aus Cochinchina.

1403. PLOTUS LEVAILLANTI, Licht.

Der afrikanische Schlangenhalsvogel, 1, vom Senegal.

Famil. Pelecanidae, Vig.

Pelekane. Pélicans.

Unterfam. Sularinae, Reichb.

Tölpel. Fous.

1404. SULA BASSANA, Briss.

Der Tölpel, le Fou,

♂ und ♀, von der Nordsee.

1405. Sula SERRATOR, Banks.

Der australische Tölpel, le Fou d'Australie, 1, aus Australien.

Unterfam. Graculinae, L.

Scharben. Cormorans.

*1406. GRACULUS CARBO, L.

Der Kormoran, le Cormoran,

3, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. v. Peyerimhoff,

3 ♀, aus dem Elsass.

1407. Graculus novae-hollandiae, Steph.

Die australische Scharbe, le Cormoran d'Australie,

1, aus Tasmanien.

1408. GRACULUS MELANOGASTER, Cuv.

Die Trauerscharbe,

4, vom Senegal.

1409. GRACULUS CRISTATUS, Faber.

Die Krähenscharbe,

J, von der Nordsee.

1410. GRACULUS BRASILIENSIS, Gmel.

Die brasilianische Scharbe,

1, aus Brasilien.

1411. GRACULUS GAIMARDI, Less.

Die Gaimardscharbe,

1, aus Cayenne.

1412. GRACULUS PYGMAEUS, Pall.

Die Zwergscharbe, le Cormoran nain,

2 &, von der Wolga,

1 & aus Madagaskar, Gesch. des Museums in Réunion.

1413. GRACULUS AFRICANUS, Gmel.

Die afrikanische Zwergscharbe, le Cormoran nain d'Afrique,

2, vom Senegal.

1414. GRACULUS MELANOGNATHUS, Brandt.

Die indische Zwergscharbe, le Cormoran nain d'Inde,

J, aus Cochinchina.

1415. GRACULUS SINENSIS, Shaw.

Der chinesische Kormoran, 1, aus Cochinchina.

Unterfam. Pelecaninae, Bonap.

Pelekane. Pélicans.

1416. Pelecanus onocrotalus, L.

Der Pelekan, le Pélican onocrotale,

2, aus Südeuropa, Gesch. des Herrn Soulage,

1, aus Cochinchina, Gesch. der Frau Dietz.

1417. Pelecanus crispus, Bruch.

Der krausköpfige Pelekan, le Pélican frisé, &, aus Dalmatien.

1418. Pelecanus rufescens, Gmel.

1, vom Senegal.

1419. Pelecanus Trachyrhynchus, Lath.

1, aus Mexico, Gesch. des Herrn Thomas,

1, aus Nordamerika.

1420. Pelecanus fuscus, L.

1, aus Nordamerika.

Unterfam. Atageninae, Gray.

Fregattvögel. Frégates.

1421. ATAGEN AQUILA, Moehr.

Der Fregattvogel, la Frégate aigle, 1, von der mexikanischen Küste.

Unterordn. Urinatores, Sundavall.

Taucher. Plongeurs.

Famil. Colymbidae, Vig.

Seetaucher. Plongeons.

*1422. COLYMBUS GLACIALIS, L.

Der Eistaucher, le Plongeon imbrin, ♀, aus dem Elsass, Gesch. des Hrn. Schælhammer, ♂, aus Nordeuropa, 3 ♂ im Frühjahr, aus Nordamerika.

*1423. COLYMBUS ARCTICUS, L.

Der Polartaucher, le Plongeon lumme, d'im Frühjahr, aus dem Elsass,

Jung, von Colmar, 6. Dezember 1876,

Jung, aus dem Elsass,

d im Uebergangskleid, von Gebweiler, Gesch. des Herrn Schlumberger.

*1424. COLYMBUS SEPTENTRIONALIS, L.

Der Rothkehltaucher, le Plongeon cat-marin, ♂ im Frühjahr, aus dem Elsass, ♂ jung, aus dem Elsass, 1 ♀ und 2 junge, aus dem Elsass.

Famil. Podicipidae, Selys.

Steissfüsse. Grèbes.

*1425. Podiceps cristatus, L.

Der Haubensteissfuss, le Grèbe huppé,

J im Frühjahr, aus dem Elsass, Gesch. des Herrn von Peyerimhoff,

2 im Winter, aus dem Elsass,

of im Frühjahr, aus Nordeuropa.

1426. Podicers Griseigena, Bodd.

Der Rothhalssteissfuss, le Grèbe jougris,

2 ♂, aus Ungarn.

*1427. Podiceps Auritus, L.

Der Ohrensteissfuss, le Grèbe oreillard,

o im Frühjahr, aus dem Elsass,

Q, aus dem Elsass.

*1428. Podiceps cornutus, Gmel.

Der Hornsteissfuss, le Grèbe arctique,

♀, von Colmar,

1 im Winter, von Colmar, Gesch. des Herrn

Charles König.

*1429. Podiceps minor, L.

Der Zwergsteissfuss, le Grèbe castagneux,

of im Herbst, aus dem Elsass,

2 im Winter, aus dem Elsass,

of im Sommer, aus dem Elsass,

1 ganz jung, im September, aus dem Elsass.

1430. Podiceps dominicus, L.

1, aus Nordamerika.

Famil. Alcidae, Vig.

Alken. Alques.

1431. Alca Torda, L.

Der Tordalk, le Pingouin torde,

2, von der Nordsee,

2, von Labrador.

1432. Fratercula arctica, Briss.

Der Lund, le Macareux moine,
1, von der Nordsee.

1433. Fratercula Glacialis, Leach.

Der Eislund, le Macareux glacial,
1, von Labrador.

1434. Cheniscus cirrhatus, Moehr. 2, von der Vancouver Insel.

1435. SIMORHYNCHUS CRISTATELLUS, Pall.

1436. Simorhynchus Kamtschaticus, Lepech. 1, von Kamtschatka.

Famil. Uriidae, Bonap.

Lummen. Guillemots.

*1437. URIA GRYLLE (L.), Mochr.

Die Grylllumme, le Guillemot à miroir,
1, im Frühjahrskleid, von Neufreistadt in Baden, im März 1870 erlegt,
(höchst zufälliges Vorkommen in hiesiger Gegend.)
1, von der Nordsee.

1438. URIA TROILE (L.).

Die Trottellumme, 1, von der Nordsee.

1439. MERGULUS ALLE (L.), Vieill.

Der Krabbentaucher,

2, von Labrador.

Famil. Spheniscidae, Bonap.

Flossentaucher. Sphénisques.

1440. Spheniscus demersus, Briss.

Der Brillenfetttaucher, le Sphénisque à lunettes,

3, vom Kap der guten Hoffnung.

Nachtrag.

Auf Seite 130 nach Nr. 1169 ist einzuschalten:

Famil. Cariamidae, Bonap. Schlangenstörche.

1169a. Cariama cristata, Brisson. Die Seriema, og alt, aus Paraguay.

(Anmerkung: Diesen interessanten Vogel hat das Museum gerade vor gänzlichem Druck des Kataloges erworben, so dass er noch hier aufgenommen werden konnte.)

Schlussbemerkungen zu vorstehendem Katalog.

Derselbe verzeichnet 3260 Exemplare in 1441 Arten, welche sich auf 729 Gattungen und Untergattungen, 259 Familien und Unterfamilien von 18 Ordnungen und Unterordnungen vertheilen. Von den 3260 Exemplaren stammen 949 aus dem Elsass, die 259 Arten angehören. Daraus folgert, dass die inländischen Vögel sehr gut repräsentirt sind und das ist nicht nur der Fall in Bezug auf Arten- und Stückzahl, sondern auch hinsichtlich der verschiedenen Färbungen, je nach dem Alter und den Jahreszeiten, sowie interessanter Varietäten. Ziemlich vollständig sind auch die Arten des übrigen europäischen Faunengebietes vertreten, während bei den exotischen noch manche Lücke auszufüllen bleibt.

Alphabetisches Namensverzeichniss

der im Katalog genannten

Ordnungen, Familien und Arten der Vögel.

(Die Zahlen hinter den Namen beziehen sich auf die Nummern im Katalog.)

Aasgeier, 2-11.	Actitis macularius, 1232.
ACANTHORHYNCHUS TENUIROS-	Actiturus longicaudus, 1233.
TRIS, 283.	A dler, 23-41.
ACCENTOR ALPINUS, 367.	Adler, der australische, 28.
- modularis, 368.	Fisch- Adler, 35.
Accentorinae, 367-368.	Geiersee- — 11.
Accipiter fuscus, 77.	Habichts- — 29.
— MEXICANUS, 79.	Hauben- — geschmü-
- nisosimilis, 74.	ckter, 31.
— nisus, 73.	Kaiser- — 24.
— таснігіо, 75.	Prinzen- — 25.
- Toussenelli, 76.	Schell- — 26.
- zonarius, 78.	Schlangen- — 34.
Accipitres, 1-119.	Schopf 33.
— diurni, 1-88.	Schrei- 27.
— nocturni, 89-119.	Schreisee- — 39.
Accipitrinae, 69-81.	See- — 37.
ACREDULA CAUDATA, 381.	— — weissköp-
ACRIDOTHERES NIGRICOLLIS, 626.	figer, 38.
— TRISTIS, 625.	Stein- — 23.
ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS,	Steppen- — 25.
316.	Zwerg- — 30.
- Horticulus, 317.	AEDON GALACTODES, 327.
- PALUSTRIS, 315.	AEGIALEUS SEMIPALMATUS,

AEGIALITES CANTIANUS, 1157.

- HIATICULA, 1155.
- MINOR, 1156.

AEGITHALUS PENDULINUS, 382.

AEGITHINA SCAPULARIS, 488.

Aegithinidae, 487-489.

AGELAIUS GUBERNATOR, 658.

- PHOENICEUS, 657.

AGRODROMA CAMPESTRIS, 409.

sordida, 410.

Agrodrome rousseline, 409. Aigle Bonelli, 29.

- botté, 30.
- criard, 27.
- impérial, 24.
- Jean-le-Blanc, 34.
- pygargue, 37.
- à tête blanche, 38.
- ravisseur, 25.
- royal, 23.

Aigles, 23-41.

AIX SPONSA, 1306.

ALAUDA ARVENSIS, 830.

Alaudidae, 827-842.

Albatros, 1360.

- der Grünschnabel, 1361.
- Albatros à bec vert, 1361.
 - géant, 1360.

Albatrose, 1360-1361.

Albatroses, 1360,4361.

ALCA TORDA, 1431.

Alcedinidae, 169-188.

Alcedininae, 178-188.

ALCEDO BENGALENSIS, 179.

- CAERULEOCEPHALA, 180.
- CRISTATA, 181.
- ISPIDA, 178.

ALCEDO VINTSIOIDES, 182.

Alcidae, 1431-1436.

ALECTRAENAS SPANZANI, 1015.

Alken, 1431-1436.

Alouette calandre, 837.

- cochevis, 832.
- des champs, 830.
- lulu, 831.
- *nègre*, 839.

Alouettes, 827-842.

Alques, 1431-1436.

AMADINA CANTANS, 706.

- CUCULLATA, 701.
- NANA, 702.
- ORYZIVORA, 704.
- PECTORALIS, 703.
- PUNCTULATA, 705.
- STRIATA, 707.

Amazone, Weisskopfamazone,

909.

Amazonen papagei, 907.

Amblycercus nigerrimus, 648.

Ameisenvögel, 477-486.

Ammer — Fichtenammer, 814.

Garten- — 817.

Gimpel- - 821.

Gold- — 815.

Grau- 822.

Kappen- — 813.

Rohr- — 823.

Rost- — 824.

Schnee- — 825.

Sporen- — 826.

Wald- — 820.

Weiden- — 819.

Zaun- — 816.

Zipp- — __ 818.

Ammerfinken, 783-786.

Ammern, 813-826.

Ampelidae, 523-526.

Amsel, 419.

Bachamsel, 436.

schwarzbauchige,

Gold-466.437.

Ring-**420.**

Amydrus morio, 641.

Anabatidae, 292-298.

ANAS BOSCHAS, 1311.

Anastomatinae, 1200.

Anastome, 1200.

Anastomes, 1200.

Anastomus Lamelligerus, 1200

Anatidae, 1287-1349.

Anatides, 1287-1349.

Anatinae, 1301-1345.

Andriopsar Giraudi, 650.

- GULARIS, 651.
- PARISORUM, 652.

Andropadus latirostris, 446. Anhinga, 1401.

Anhinga, 1401.

à ventre noir, 1402.

Anhingas, 1401-1403.

Ani, 979.

 der schwielenschnäblige, [981.

Ani, 979.

— des palétuviers, 980.

Aniuma, 1285.

Anous Leucocapillus, 1398.

— stolidus, 1397.

Anser, Albifrons, 1292.

- cinereus, 1290.
- minutus, 1293.
- SEGETUM, 1291.

Anseres, 1287-1440.

Anserinae, 1290-1300.

Anthinae, 403-413.

Anthobaphes violacea, 219.

Anthochaera carunculata, 286 Anthreptes Longuemari, 223.

MALACCENSIS, 222.

Anthropoides virgo, 4171. ANTHUS AQUATICUS, 403.

- ARBOREUS, 406.
- cervinus, 408.
- LUDOVICIANUS, 405.
- obscurus, 404.
- PRATENSIS, 407.

Antrostomus rufus, 124.

APLOPELIA TYMPANISTRIA, 1056.

Apterigidae, 1131.

APTERYX OWENI, 1131.

Apteryx, 1131.

AQUILA AUDAX, 28.

- CHRYSAËTOS, 23.
- GLANGA, 26.
- IMPERIALIS, 24.
- NAEVIA, 27.
- NAEVIOIDES, 25.
- var. ADALBERTI, 25.
- var. rapax, 25.

Aquilinae, 23-41.

ARA ARARAUNA, 878.

- масло, 877.
- RUBRIGENYS, 879.

Ara rouge, le grand, 877.

ARACHNOTHERA FLAMMAXILLARIS

220.

Arainae, 877-884.

Arakanga, 877.

Aranides mangle, 1262. Arara, der rothohrige, 879. Ararakakadu, 925.

Ararakakadus, 925.

Araras, 877-884.

Ararauna, 878.

Araraune, 878.

Aras, 877-884.

Arassari, der vielfarbige, 860. Grün-Arassari, 862.

Arassari discolore, 860.

- vert, 862.

ARCHIBUTEO LAGOPUS, 22. ARDEA AGAMI, 1180.

- ATRICAPILLA, 1186.
- CANDIDISSIMA, 1179.
- CINEREA, 1173.
- сомата, 1182.
- COROMANDA, 1181.
- EGRETTA, 1177.
- FLAVICOLLIS, 1183.
- GARZETTA, 1178.
- HERODIAS, 1175.
- JAVANICA, 1185.
- MELANORHYNCHA, 1176.
- PURPUREA, 1174.
- VIRESCENS, 1184.

Ardeidae, 1173-1195.

ARDETTA MINUTA, 1187.

— ропсеря, 1188.

Argus, 1079.

Argus, 1079.

ARGUSIANUS GIGANTEUS, 1079.

ARGYRTRIA ALBICOLLIS, 243.

ARTAMIA LEUCOCEPHALA, 463.

Artamidae, 461-464.

ARTAMUS LEUCORHYNCHUS, 461.

ARUNDINICOLA LEUCOCEPHALA, 506.

ASTRAPIA GULARIS, 621.

Astrapie à gorge d'or, 621.

ASTUR PALUMBARIUS, 69.

ATAGEN AQUILA, 1421.

Atageninae, 1421.

Atelornis squamigera, 150.

ATHENE GLAUX, 92.

— постил, 91.

Atzel, japanische, 623.

Austernfischer, 1166-1169.

Austernfischer, 1166.

Autour, 69.

Autours, 69-81.

Autruche, 1127.

Autruches, 1127-1131.

Aves, 1-1440.

Avocette, 1234.

Avocettes, 1234-1237.

Bachstelzen, 393-402.

Balbusard, 35.

BALEARICA PAVONINA, 1172.

Baltimorvogel, 656.

Bananenfresser, 845.

Bananivorus spurius, 655.

Barbicau, 927.

-- de Vicillot, 929.

Barge à queue noire, 1218.

Barges, 1215-1220.

Bartavelle, 1112.

Bartavelles, 1112-1115.

Bartgeier, 1.

Bartvögel, 927-934.

Bartvogel, der grosse, 927.

- der rothstirnige, 929.

Basilinna leucotis, 277.

Baumhühner, 4107-1111.

Baumläufer, 299-300.

Baumläufer, 299.

Baumsteiger, 292-295.

Bec-croisé, 808.

- des sapins, 809.

Bec-en-ciseaux noir, 1399.

Bec-fin rubigineux, 327.

Bécasse, 1252.

Bécasseau à échasse, 1244.

- cincle, 1243.
- cocorli, 1242.
- de Temminck, 1245.
- Maubèche, 1239.
- platyrhynque, 1246.
 - violet, 1240.

Bécasseaux, 1238-1247.

Bécasses, 1215-1254.

Bécassine, 1250.

— double, 1249.

Becs-croisés, 808-812.

Becs-en-ciseaux, 1399.

Bergeronnette à tête grise, 399.

- à tête noire, 398.
- citrine, 400.
- de Yarell, 394.
- des montagnes, 396.
- *grise*, 393.
- jaune, 397.
- printanière, 397.

Bergeronnettes, 393-402.

Berghokkos, 1072.

Berghühner, 1112-1115.

Berglori-Pesquetsberglori, 895.

Bergloris, 894-895.

Bernicla Leucopsis, 1296.

- SANDWICHIENSIS, 1297.
- топриата, 1295.

BERNIERIA MADAGASCARIENSIS,

444.

Bessethera barbata, 489. Bessonornis albicapilla, 430.

ESSONORNIS ALBICATION, 400

- VERTICALIS, 431.

Bienenfresser, 189-198.

Bienenfresser, 189.

Bihoreau à manteau, 1191.

Bizet, 1020.

Blässhuhn, 1275.

— Kammblässhuhn,1276.

Blätterhühnchen, 1281-

1284.

Blaukehlchen -- Rothsternblau-

kehlchen, 354.

Weisssternblau-

kehlchen, 355.

Blaukrönchen, 886.

Blongios vulgaire, 1187.

Blumenküsser, 282.

Blutastrild, 698.

Bobolink, 667.

Boissoneaua flavescens, 265.

Bombycilla Garrula, 523.

- CEDRORUM, 524.
- JAPONICA, 525.

BONASA CUPIDO, 1121.

- SYLVESTRIS, 1120.
- umbellus, 1122.

Bondrée commune, 60.

Botaurinae, 1187-1193.

BOTAURUS LENTIGINOSUS, 1190.

- stellaris, 1189.

Bourcieria torquata, 261. Bouscarle Cetti, 319. Bousserolle des marais, 315.

- efravatte, 316.

— turdoide, 314.

Bousserolles, 314-327.

Bouvier à collier, 492.

- à manteau noir, 491.
- gris, 490.

Bouvreuil, 793.

- le grand, 794. Brachschwalbe, 4160.
 - Steppenbrachschwalbe,
 1161.

BRACHYOTUS CASSINI, 111.

- PALUSTRIS, 110.

Brachvogel, der grosse, 1215.

- der kleine, 1216. Sichlerbrachvogel,1217.

BRACHYPTERNUS AURANTIUS,

959.

Bradyornis silens, 460. Braunelle – Alpenbraunelle, 367. Heckenbraunelle, 368.

Braunellen, 367-368.

Bruant auréole, 819.

- des marais, 821.
- des neiges, 825.
- des roseaux, 823.
- fou, 818.
- jaune, 815.
- ortolan, 817.
- Proyer, 822.
- rustique, 820.
- zizi, 816.

Bruants, 813-826. Bubo capensis, 400. Bubo maximus, 99.

— VIRGINIANUS, 101.

Buboninae, 99-111.

Bucco macrorhynchus, 163.

- MACULATUS, 165.
- тестия, 164.

Bucconidae, 163-168.

Buceros albirostris, 852.

- BICORNIS, 851.
- RHINOCEROS, 852.

Bucerotidae, 850-856.
Bucorvus abyssinicus, 856.

BUDYTES CINEREOCAPILLA, 399.

- CITREOLA, 400.
- FLAVA, 397.
- FLAVEOLA, 401.
- MELANOCEPHALA, 398.

Buntlinken, 787-797.

BUPHAGA ERYTHRORHYNCHA,632.

Buphaginae, 632.

Bürzelstelzer, 302.

Busard blafard, 87.

- -- cendrė, 87.
- de Saint-Martin, 84.
- des marais, 82.
- des montagnes, 86.

Busards, 82-87.

Buschkukuke, 972-974.

Buschsänger, 308-313.

Buschwürger, 570-576.

Buse commune, 13.

- des marais, 14.
- pathue, 22.
- tacharde, 14.

Buses, 13-22.

Bussard — Adlerbussard, 16.

Mäuse- — 13.

Bussard – Rauchfussbussard,22. Steppen – 14.

Wespen- — 60.

Bussarde, 13-22.

BUTEO AUGUR, 17.

- BRACHYPTERUS, 45.
- DESERTORUM, 14.
- FEROX, 16.
- LINEATUS, 18.
- unicinctus, 19.
- VULGARIS, 13.

Buteogallus nigricollis, 20. **Buteoninae**, 13-22. *Butor étoilé*, 1189. **Butors**, 4187-1193.

Cacatoës, 918-925.

Cacatoës à huppe jaune, 919.

- rose, 921.

CACATUA GALERITA, 920.

- ROSEICAPILLA, 921.
- SULPHUREA, 919.

Cacatuidae, 918-925.

Caccabinae, 1112-1115.

CACCABIS CHUCAR, 1113.

- PETROSA, 1115
- RUFA, 1114.
- SAXATILIS, 1112.

Caille commune, 1101.

— d'Australie, 1102.

CAIRINA MOSCHATA, 1323.

Calamodyte phragmite, 320.

Calamodytinae, 314-327.

CALAMOHERPE AQUATICA, 321.

– cariceti, 322.

CALAMOHERPE PHRAGMITIS, 320. CALAMORELLA BRACHYDACTYLA.

835.

— PISPOLETTA, 836. Calandrelle, 835.

Calao à bec blanc, 852.

- bicorne, 851.
- rhinocéros, 850.

Calaos, 850-856.

CALIDRIS ARENARIA, 1247.

Callacatinae, 591-593.

Callipepla squamata, 1109. Calliphlox amethystinus, 720. Calliste brasiliensis, 737.

- CAYANA, 735.
- CYANOCEPHALA, 732.
- FLAVA, 734.
- -- MEXICANA, 738.
- РЕТІОЗА, 736.
- PUNCTATA, 733.
- татао, 731.

Caloenadinae, 1063.

CALOENAS NICOBARICA, 1063.

Calorhamphus fuliginosus,

930.

CALOTHORAX LUCIFER, 255.

Calyptorhynchinae, 923-

924.

CALYPTORHYNCHUS BANKSI, 923.

- GALEATUS, 924.

CALYPTOMENA VIRIDIS, 155.

Calyptomeninae, 155.

CAMPEPHAGA PHOENICEA, 501.

Campephaginae, 500-505.

CAMPEPHILUS MALHERBI, 945.

— MELANOLEUCUS, 946. CAMPETHERA PUNCTATA, 955.

CAMPYLOPTERUS HEMILEUCURUS,

235.

- LARGIPENNIS, 234. CAMPYLORHYNCHUS ZONATUS, Canard à collier, 1326. [306.

— à iris blanc, 1330.

-- chipeau, 1319.

-- de Miquelon, 1335.

-- garrot, 1331.

— d'Islande, 1332.

- milouin, 1328.

_ milouinan, 1327.

- morillon, 1325.

- pilet, 1309.

- 'sanvage, 1311.

- siffleur, 1307.

- d'Amérique, 1308.

- - huppé, 1324.

— souchet, 1321.

— tadorne, 1304.

Canards, 1301-1345.

CANCROMA COCHLEARIA, 4195.

Cancrominae, 1195.

Cannabina flavirostris, 765.

- sanguinea, 764.

Cannepetière, 4133.

Capito erythrocephalus, 934.

Capitonidae, 927-934.

Caprimulgidae, 120-128.

Caprimulginae, 121-127.

CAPRIMULGUS EUROPAEUS, 121.

- madagascariensis, 123.

- RUFICOLLIS, 122.

Carancho, 12.

CARDINALIS VIRGINIANUS, 799. CARDUELIS ELEGANS, 760. CARIAMA CRISTATA, 4169a. Cariamidae, 1169a.

CARPODACUS ERYTHRINUS, 797. CARPOPHAGA MAGNIFICA, 1018.

- NORFOLCIENSIS, 1019.

- oceanica, 1017.

— SYLVATICA, 1016.

CARYOTHRAUSTES BRASILIENSIS,

749.

- POLIOGASTER, 750.

— VIRIDIS, 748.

Casarka rutila, 1305.

Casarke, 1305. Casoar, 1130.

Casoars, 1130.

Casse-noix à bec fin, 595.

— à bec robuste, 594.

Cassicus haemorrhous, 647.

— MONTEZUMA, 645.

- Persicus, 646.

Casuariidae, 1129-1130.

Casuariinae, 1130.

Casuarius galeatus, 1130. Catharista aura, 7.

- Burrowiana, 8. Ceblephyris cana, 504.

- PECTORALIS, 503.

- sp., 505.

CELEUS ELEGANS, 957.

Centropodinae, 986-991.

CENTROPUS AEGYPTIUS, 987.

- BENGALENSIS, 990.

- PHILIPPINENSIS, 989.

-- SENEGALENSIS, 986.
-- SUPERCILIOSUS, 988.

- SULERGIBIOSOS,

— тоигои, 991.

Centurus aurifrons, 960. Céphaloptère orné, 539.

CEPHALOPTERUS ORNATUS, 539. CERIORNIS MELANOCEPHALUS, 1093.

- Temmincki, 1094.
 Certhia familiaris, 299.
 Certhiidae, 299-300.
 Certhiauda garrula, 840.
 Certhiola chloropyga, 229.
 Ceryle alcyon, 186.
 - MAXIMA, 184.
 - RUDIS, 183.
 - топочата, 185.

CETTIA SERICEA, 319. CHALCOPAREIA CINGALENSIS, 218 CHALCOPHAPS JAVANENSIS, 1058 CHAMAEPELIA AMAZILIA, 1043.

- GRISEOLA, 1042.
- PASSERINA, 1041.
- RUFIPENNIS, 1044.

Chanteurs, 308-368.

Charadriadae, 1138-1141.

Charadrinae, 1141.

CHARADRIUS PLUVIALIS, 1151.

- vociferus, 1152.

Chardonneret, 760.

CHAULELASMUS STREPERA, 1319.

CHAUNA CHAVARIA, 1286.

Chaune cendrée, 1286.

CHELIDON URBICA, 140.

CHELIDOPTERA TENEBROSA, 168.

CHENISCUS CIRRHATUS, 1434.

CHEN HYPERBOREUS, 1294.

CHENALOPEX AEGYPTIACA, 1300.

Chettusia gregaria, 1142. Chevalier aboyeur, 1227.

- arlequin, 1226.
- cul-blanc, 1222.

Chevalier Gambette, 1225.

- stagnatile, 1221.
- sylvain, 1223.

Chevaliers, 1221-1233.

Chirurg, 1284.

CHLOROCERYLE AMERICANA, 187.

- INDA, 188.

Culorolampis chrysogaster,

CHLORONERPES AURULENTUS,

- selysi, 963. [962.
- тернгороря, 964.
- YUCATANENSIS, 961.

CHLOROPHONIA OCCIPITALIS, 757.

-- viridis, 756.

Chocard des Alpes, 607.

Chordeiles virginianus, 128. Choucas, 605.

Chouette caparacoche, 89.

- chevèche, 91.
- chevèchette, 95.
- de Tengmalme, 117.
- -- effraie, 118.
- épervière, 89.
- hulotte, 112.
- laponne, 114.
- méridionale, 92.
- naine, 95.

Chouettes nocturnes,

112-119.

CHROICOCEPHALUS GELASTES,

1381.

— мінития, 1380.

CHRYSOBRONCHUS VIRESCENS,

246.

CHRYSOCOCCYX SMARAGDINUS,

996

CHRYSOLAMPIS MOSQUITUS, 273. CHRYSOLOPHUS AMHERSTIAE,

1086.

— рістия, 1085.

CHRYSOMITRIS ATRICEPS, 767.

- spinus, 766.

CHRYSOPTILUS MELANOCHLORUS, 958.

CHRYSOTIS AESTIVALIS, 910.

- -- AMAZONICA, 907.
- LEUCOCEPHALUS, 909.
- LEVAILLANTI, 908.
- SP., 912.
- VITTATA. 911.

CICINNURUS REGIUS, 649. CICONIA ALBA, 1196.

- EPISCOPUS, 1198.
- NIGRA, 1197.

Ciconiidae, 1196-1200.

Cigogne blanche, 1196.

- noire, 1197.

Cigognes, 1196-1200.

Cincle plongeur, 436.

Cinclus aquaticus, 436.

- MELANOGASTRA, 437.
- Pallasi, 438.

CIRCAETUS GALLICUS, 34.

Circinae, 82-87.

CIRCUS AERUGINOSUS, 82.

- RANIVORUS, 83. CISSA ORNATA, 590.

CISTICOLA SCHOENICOLA, 311. CITRINELLA ALPINA, 768.

CLANGULA ALBEOLA, 1333.

- GLAUCION, 1331.
- HISTRIONICA, 1334.
- ISLANDICA, 1332.

CLYTOLAEMA RUBINEA, 264. COCCOTHRAUSTES VULGARIS, 781.

Coccothraustinae, 781-782 Coccystes glandarius, 999.

— SERRATUS, 1000.

Coccyzinae, 982-985.

Coccyzus americanus, 982. Cochevis huppée, 832.

COEREBA CAERULEA, 226.

- CYANEA, 225.

Coerebidae, 225-229.

COLAPTES AURATUS, 967.

- CHILENSIS, 969.
- MEXICANUS, 968.

Colaptinae, 967-969.

Colibris, 230-282.

Coliidae, 843-844.

Colin huppé, 1110.

Colius capensis, 843.

-- MACRURUS, 844.

Colluricincla harmonica, 558.

Colombe bizet, 1021.

- pie, 1060.
- -- ramier, 1022.

COLUMBA CORENSIS, 1023.

- -- GUINEA, 1024.
- LIVIA, 1020.
- PALUMBUS, 1022.
- PLUMBEA, 1025.
- OENAS, 1021.
- -- RUFINA, 1026.

- sp., 1027-1028.

Columbae, 1003-1064. Columbidae, 1003-1061.

Columbinae, 1016-1053.

COLUMBULA CRUZIANA, 1045.

Colymbidae, 1422-1424.

COLYMBUS ARCTICUS, 1423.

- GLACIALIS, 1422.
- SEPTENTRIONALIS, 1424.

Combattant, 1238.

Condor, 5.

Condor, 5.

Condore, 5-8.

Conders, 5-8.

Conirostres (Passeres),

577-856.

Conurus Aeruginosus, 882.

- CRUENTATUS, 883.
- CYANOPS, 880.
- LEUCOTIS, 884.
- MITRATUS, 881.

COPSYCHUS MINDANENSIS, 432.

- PICA, 433.

Coq de bruyère, le grand, 4116.

- de bouleau, 1119.
- de Lafayette, 1092.
- de Sonnerat, 1091.
- sauvage, 1090.

Coq-de-roches, 550.

- sanguinolant, 551.

Coqs, 1090-1094.

Cogs-de-roches, 549-551.

Coraciadae, 142-150.

CORACIAS ABYSSINICA, 146.

- AFFINIS, 144.
- CYANOGASTER, 145.
- GARRULA, 142.
- PILOSA, 143.

CORACOPSIS NIGRA, 899.

- vaza, 900.

Corbeau commun, 600.

— noir, 599.

Corbeaux, 577-608.

Corelle, 918.

CORIPHILUS TAITANUS, 885.

Cormoran, 1406.

- d'Australie, 1407.
- nain, 1412.
- *d'Afrique*, 1413.
- -- d'Inde, 1414.

Cormorans, 1406-1415.

Corneille mantelée, 601.

Corvidae, 577-608.

Corvinae, 594-606.

CORVINELLA CORVINA, 569.

CORVULTUR ALBICOLLIS, 606.

Corvus corax, 599.

- cornex, 601.
- CORONE, 600.
- FRUGILEGUS, 602.
- MEXICANUS, 604.
- Nobilis, 603.

CORYDALLA RICHARDI, 411.

COTINGA CAERULEA, 530.

- CAYANA, 532.
- cincta, 531.

Cotingidae, 527-551.

Cotinginae, 529-534.

COTURNICULUS MANIMBE, 786.

COTURNIX AUSTRALIS, 1402.

- DACTYLISONANS, 1101.
- sp., 4103.

COTYLE RIPARIA, 138.

— RUPESTRIS, 139.

COUA CAERULEA, 976.

- CRISTATA, 975.

Couanae, 975-976.

Coucou, 992.

Coucous, 971-4002.

Courlis cendré, 1215.

Courlis courlieu, 1216.

— tenuirostre, 1217.

Couroucou Paon, 162.

Couroucous, 157-162.

Cracidae, 1070-1073.

Cracidae, 1073.

Cracidae, 1073.

Crapier huppé, 1182.

Craspedophora magnifica, 610.

Crateropodinae, 448-455.

Crateropus atriceps, 454.

- AThipennis, 449.
- FULVUS, 452.
- LEUCOCEPHALUS, 455.
- LEUGOPYGIUS, 451.
- MELANOPS, 453.
- PLATYCIRCUS, 450.
- -- REINWARDTI, 448.

Crave, 608.

Crax globulosa, 1073.

Crésellerette, 57.

Créserelle, 52.

CREX PRATENSIS, 1263.

Crithagra Chrysopyga, 796.

— SULPHURATA, 795.

CROTOPHAGA ANI, 979.

- MAJOR, 980.
- sulcirostris, 981.

Crotophaginae, 979-981.

CRYPSIRHINA AFRA, 592.

— GUCULLATA, 593.

Cuculidae , 971-1002.

Cuculinae, 992-1002.

Cuculus canorus, 992.

- CLAMOSUS, 995.
- LEPTODETUS, 995.
- Косні, 993.

Cursorinae, 1163-1165. Cursorius gallicus, 1164.

- superciliosus, 1165.

CYANECULA LEUCOCYANEA, 355.

-- SUECICA, 354.

CYANOCORAX CAYANUS, 587.

- Luxuosus, 588.
- PILEATUS, 586.

CYANOLANIUS BICOLOR, 464.

Cyanophaia cyanea, 278.

CYANOPICA CYANEA, 598.

Cyanospizinae, 787-797.

Cyanurus coronatus, 584.

— cristatus, 583.

- ORNATUS, 585.

Cyclorhis flaviventris, 556.

-- GUIANENSIS, 555.

Cygne muet, 1287.

- noir, 1289.
- sauvage, 1288.

Cygnes, 1287-1289.

Cygninae , 1287-1289.

CYGNUS ATRATUS, 1289.

- musicus, 1288.
- -- olor, 1287.

Cymbirhynchus macrorhynchus,

154.

Cymindis cayennensis, 65.

- uncinatus, 66.

Cypselidae, 129-132.

CYPSELUS ABYSSINICUS, 131.

- -- APUS, 129.
- MELBA, 130.
- PARVUS, 132.

CYRTOSTOMUS PECTORALIS, 221.

DACELO GAUDICHAUDI, 170.

— GIGAS, 169.

Daceloninae, 169-177.

DACNIS CYANEA, 227.

-- BICOLOR, 228.

Dafila acuta, 1309.

- oxyura, 1310.

Dämmerungsschwalben

198

Dandalus rubeculus, 353.

Daption capensis, 1359.

Dasyptile de Pesquet, 895.

Dasyptilus Pesqueti, 895.

Delattria viridipallens, 254.

Dendrocitta rufa, 591.

Dendrocolaptinae,292-95?

DENDROCYGNA AFRICANA, 1302.

- ARCUATA, 1301.
- -- viduata, 1303.

DENDROICA AESTIVA, 388.

- BLACKBURNIAE, 387.
- CANADENSIS, 386.
- SPECIES, 389.

DENDROPICUS GOERTAN, 951.

- LAFRESNAYI, 950. DENDROPHILA FRONTALIS, 298.

DENDROPLEX PICUS, 292.

Dentirostres (Passeres),

308-576.

DICAEUM FLAMMEUM, 224.

Dickfüsse, 1138-1140.

Dickkopfwürger, 558-560.

Dickschnäbler, 577-856. Dicruridae, 456-460.

DICRURUS FORFICATUS, 457.

- MODESTUS, 456.
- PARADISEUS, 458.

Dindon sauvage, 1095.

Dindons, 1095.

DIOMEDEA CHLORORHYNCHA, 1361.

- EXULANS, 1360.

Diomedeinae, 1360-1361.

DIPHYLLODES MAGNIFICUS, 618.

Diplopterinae, 977-978.

DIPLOPTERUS NAEVIUS, 977.

Docimastes ensiferus, 257.

Dohle, 605.

Alpendoble, 607.

Dolichonyx oryzivorus, 667.

Donacobius atricapillus, 305.

Dromaiinae, 1129.

DROMAIUS NOVAE-HOLLANDIAE,

1129.

Dromococcyx mexicanus, 978.

Drongo -- Flaggendrongo, 458.

Drongos, 456-460.

Drossel — Blaudrossel, 423.

Mistel- — 414-415.

Roth- — 417.

Sing- 416.

Spott- - 424.

Stein- 422.

Wander- 421.

Drossein, 414-435.

Drossling, 451.

DRYMOICA ERYTHROPTERA, 309.

-- MADAGASCARIENSIS, 310.

DRYOCOPUS LINEATUS, 949.

- MARTIUS, 947.
- PILEATUS, 948.

DRYOSCOPUS GAMBENSIS, 574.

Dünnschnäbler, 204-307.

Dysithamnus guttulatus, 485.

- MENTALIS, 486.

Ėchasse, 98.	<i>Émou</i> , 1129.
— à manteau noir, 1235.	Emous, 1129.
Échassiers, 1132-1286.	Emu, 1129.
ECLECTUS CARDINALIS, 896.	Emus, 1129.
— POLYCHLORUS, 897.	Engoulevent à collier rouge,122.
Écorcheur à tête rousse, 564.	— ordinaire, 121.
ECTOPISTES MARGINATA, 1029.	Engoulevents, 120-128.
- MIGRATORIUS, 1030.	Ente — Berg- Ente, 1327.
Edelfafken, 42-59.	Bisam- — 1323.
Egrette, 1177.	Brand- — 1304.
Eider à tête grise, 1338.	Braut- — 1306.
— magnifique, 1336.	Brillen- — 1339.
— vulgaire, 1337.	Eider- — 1357.
Eiderente, 1337.	Eis- — 1335.
Königseiderente, 1338.	Knäck 1312.
Pracht- — 1336.	Königseider- — 1338.
Eisvögel , 169-188.	Kolben- — 1324.
Eisvogel, 178.	Kragen- — 1334.
Elainia pagana, 507.	Krick- — 1313.
Elaininae, 507-512.	Löffel- — 1321.
ELANUS LEUCURUS, 68.	Moor 1330.
MELANOPTERUS, 67.	Moschus- – 1323.
Ellisia typica, 313.	Pfeif- — 1307.
Elster, 596.	— — die ameri-
Blauelster, 598.	kanische, 1308.
Paradies- — 621.	Prachteider-Ente, 1336.
Wander- — 591.	Reiher- — 1325.
Emberiza aureola, 819.	Ringel- — 1326.
сіа, 818.	Rost- — 4305.
— cirlus, 816.	Ruder- — 1344.
— CITRINELLA, 815.	Sammet 1341.
- HORTULANA, 817.	Schell- — 1331.
- PYRRHULOIDES, 821.	— — die islän-
— RUSTICA, 820.	dische, 1332.
Emberizidae, 813-826.	Schnatter- Ente, 4319.
Émeraude, le grand, 614.	Spiess- — 1309.
Émérillon, 50.	Stock- — 1311.

Tafel- Ente, 1328.
Trauer- — 1340.
Enten, 1301-1345.
Entenvögel, 1287-1349.

Entenvögel, 1281-1349 Épciche, 937.

- le moyen, 938. Épervier, 73. Ephialtes scops, 106.
- var. Longipennis, 106. Epimachinae, 609-613. Epimachus maximus, 611. Épimaque à collet, 611. Épimaques, 609-613. Eremit, 231.
- braunbauchiger, 232. ERIOGNEMIS AURELIAE, 281.
- VESTITA, 280.
 ERIONOTUS CAYANENSIS, 484.
 ERISMATURA LEUCOCEPHALA,
 1344.

- RUBIDA, 1345. Érismature couronnée, 1344. Eroessa tenella, 312. Erythropsar frontalis, 668. Erythropus vespertinus, 56. Erythrosterna parva, 493.

Esacus magnirostris, 1140. Estrelda amandava, 697.

- BENGALA, 695.
- MELPODA, 694.
- MINIMA, 698.
- NATALENSIS, 696.
- NIGRICAUDA. 693.
- NIGRICOLLIS, 699.
- PHOENICOPTERA, 700. Etourneau noir, 630.
 - vulgaire, 629.

Étourneaux, 623-646.

Eudromias asiaticus, 1154.

— MORINELLUS, 1453. EUDYNAMYS HONORATA, 1001.

EULABAEORNIS BERNIERI, 1258.

Eulabes javanensis, 623.

Eulabetinae, 623.

Eule - Fischeule, 104.

javanische,105.

Habichts- Eule, 116.

Kaninchen- - 98.

Schleier- — 118.

Schnee- 90.

Sperber- — 89.

Sumpfohr- — 110.

_ _ nord-

amerikanische, 111.

Waldohr- Eule, 109.

Zwergohr- — 106.

Eulen, 89-119.

Eulenpapagei, 926.

Eulenschwalben, 120.

EUPETOMENA MACRURA, 237.

EUPHEMA ELEGANS, 871.

EUPHONIA CHLOROTICA, 753.

- -- ELEGANTISSIMA, 752.
- MINUTA, 754.
- VIOLACEA, 755.

Euphoninae, 752-757.

EUPLECTES AFER, 685.

- FLAMMICEPS, 683.
- FRANCISCANUS, 684.

EUPODOTIS DENHAMI, 1134.

- ноивака, 1137.
- -- MELANOGASTER, 1135.
- senegalensis, 1136.

Euryceros Prevosti, 633.

Eurycerotinae, 633.

Eurylaimes, 151-155.

Eurylaimidae, 151-155.

Eurylaimus Horsfieldi, 451.

- OCHROMELAS, 152.

- OCHROMELAS, 152.
- SUMATRANUS, 153.

EURYPYGIA HELIAS, 1264.

Eurypygidae, 1264.

EURYSTOMUS AFER, 148.

— MADAGASCARIENSIS, 147.

EUSPIZA MELANOCEPHALA, 813.

— PITHYORNUS, 814.

EUTIMA LAFRESNAYI, 256.

Faisan à collier, 1081.

-- argenté, 1088.

— commun, 1080.

- de Lady Amherst, 1086.

— doré, 1085.

— vėnėrė, 1084.

— versicolore, 1083.

Faisans, 1080-1089.

FALCO CANDICANS, 43.

algo candicans, 40

— GYRFALCO, 44.

- ISLANDICUS, 42.

- LANARIUS, 46.

- PEREGRINUS, 45.

- SACER, 47.

Falconidae, 12-87.

Falconinae, 42-59.

FALCULIA PALLIATA, 210.

Falke - Baumfalke, 48.

Edelfalke, der grönländische, 43.

Edelfalke, der isländische,

42.

44.

- der norwegische,

Eleonorfalke, 49.

Jagdfalke, der isländische, 42.

der norwegische,

Nachtfalke, 128. [44

Rothhalsfalke, 51.

Rothfuss- - 56.

Rüttel- - 57.

Thurm- - 52.

Wander- - 45.

Würg- -- 46.

Zwerg- - 50.

Falken, 12-87.

Fasan — Buntfasan, 1083.

der mongolische, 1082.

Edel- Fasan, 1080.

Glanz- — 1089.

Glatiz- 1009.

Gold- — 1085.

Halsband- — 1081.

Königs- — 1084.

Lady Amherst- 1086.

Silber- — 1088.

Fasanen, 1080-1089.

Fasanenkukuke, 977-978.

Fasanenvögel, 1076-1097.

Faucon à pieds rouges, 56.

— commun, 45.

— Eléonore, 49.

— lanier, 46.

Faucons, 12-87.

Faulvögel, 163-168.

Faulvogel — Dickschnabelfaulvogel, 463.

Fauvette à lunette, 331.	Flamants, 1203-1204.		
- à tête noire, 331.	Flamingo, 1203.		
— aquatique, 321.	Flamingos, 1203-1204.		
- babillarde, 333.	Fliegenfänger, 490-505.		
- cendrée, 332.	Fliegenfänger, der graue, 490.		
— des jardins, 338.	Halsbandfliegenfänger, 492.		
– épervière, 337.	Schleppen, — 497.		
— <i>orphée</i> , 336.	Trauer- — 491.		
— rayėe, 337.	Zwerg- — 493.		
Fauvettes, 328-346.	Fliegenschnäpper, 495-		
Feldhühner , 1098-1103.	FLORISUGA FUSCA, 253. [499.		
Feldhuhn, 1100.	MELLIVORA, 252.		
Felsenhähnchen, 155.	Flossentaucher, 1440.		
Felsenraben, 607-608.	Flötenvogel, 577.		
Fersenkukuke, 982-985.	Flughühner, 1065-1069.		
Fink — Bengalifink, 695.	Flughuhn, das gebänderte, 1066.		
Berg- — 759.	Ringelflughuhn, 1065.		
Blau- — 788.	Spiess- — 1067.		
Buch- 758.	Formicariidae, 477-486.		
Distel- — 760.	Formicariinae, 477-480.		
Grün- — 771.	Formicarius moniliger, 478.		
Lein- — 761.	Fou, 1404.		
— Langschna-	— d'Australie, 1405.		
bel, 762.	Foudia erythrops, 682.		
	MADAGASCARIENSIS, 681.		
— — nordischer, 763.	Foulque géante, 1277.		
	— macroule, 1275.		
Reis- — 704. Schnee- — 774.	Foulques, 1275-1277.		
Finken, 758-812.	Fourmiliers, 477-486.		
Fischer — Graufischer, 183.	Fous, 1404-1405.		
Grossfischer, 184.	Francolin à collier, 1099.		
Halsband- 185.	Francolinus bicalcaratus, 1098		
Fissirostres (Passeres),	- VULGARIS, 1099.		
120-203.	Frankolin, 4099.		
Flaggendrongo, 458.	Doppelspornfrankolin, 1098.		
Flaggensylphe, 248.	FRATERCULA ARCTICA, 1432.		
Flamant rose, 1203.	GLACIALIS, 1433.		

Frégate aigle, 1421.
Frégates, 1421.
Fregattsegler, 1355.
Fregattvögel, 1421.
Fregattvogel, 1421.
Fregattvogel, 1421.
Fregilus graculus, 608.
Freux vulgaire, 602.
Friquet, 776.
Fringilla coelebs, 758.

— MONTIFRINGILLA, 759.
FRINGILLARIA CAESIA, 824.
Fringillidae, 758-812.
Fringillinae, 758-780.
Fruchtdrosseln, 439-441.
Fruchtdauben, 1003-1015.
Fulica atra, 1275.

- CRISTATA, 1276.
- GIGANTEA, 1277.

Fulicinae, 1275-1277. Fuligula americana, 1329.

- collaris, 1326.
- -- CRISTATA, 1325.
- FERINA, 1328.
- MARILA, 1327.
- NYROCA, 1330.
- RUFINA, 1324.

Fulmarus giganteus, 1356.

- GLACIALIS, 1357.
- GLACIALOIDES, 1358.

Gabelschwanzgnome, 237. Galbula albirostris, 202.

- LEUCOGASTER, 203.
- RUFICAUDA, 201.
- RUFOVIRIDIS, 200.

Galbula viridis, 199.

Galbulidae, 199-203.

GALERIDA CRISTATA, 832.

— ISABELLINA, 833.
GALEOSCOPTES CAROLINENSIS, 428
GALLICREX CRISTATUS, 1274.
GAllinacés, 1065-1126.
GALLINAGO GALLINULA, 1251.

- MAJOR, 1249.

- scolopacina, 1250.

GALLINULA CHLOROPUS, 1268.

- PORZANA, 1269.

PUSILLA, 1270.PYGMAEA, 1271.

— sp., 1272.

Gallinulidae, 1265-1277. Gallinulinae, 1268-1274.

GALLOPHASIS LEUCOMELANUS,

1087.

GALLUS BANKIVA, 1090.

- LAFAYETTI, 1092.
- Sonnerati, 1091.

Ganga, 1067.

— unibande, 1065.

Gangas, 1065-1069.

Gänse, 1290-1300.

Gänsesäger, 1346.

Gans — die ägyptische, 1300.

Bläss- Gans, 1292. Grau- — 1290.

Nonnen- 1296.

Ringel- — 1295.

Saat- — 1291.

Schnee- — 1294.

Zwerg- — 1293.

Garrot histrion, 1334.

Garrulinae, 578-590. Garrulus cervicalis, 581.

- GLANDARIUS, 579.
- MELANOCEPHALUS, 580 Gartenspötter, 344.

Garzette, 1178.

Gaukler, 41.

Gavilan, 65.

Geai, 579.

- à tête noire, 580.
- de Bohême, 523.

Geais, 578-590.

Gecininae, 952-959.

GECINUS CANUS, 953.

- VAILLANTI, 954.
- Viridis, 952.

Geier, der graue, 3.

 Kappen Geier, 10.

 Königs — 6.

 Kranich — 88.

 Kutten — 2.

 Lämmer — 1.

 Mönchs — 2.

 Schmutz — 9.

7.

Trutthuhn- — Geierfalken, 12.

Gelinotte, 1120.

GENNAEUS NYCTHEMEBUS, 1088. GEOPELIA HUMERALIS, 1033.

- TRANQUILLA, 1032. GEOTRYGON CRISTATA, 1054.

- LINEARIS, 1055.

Geranoetus melanoleucus, 40. Geranospiza gracilis, 71. Gerfault, 42.

— de Norvège, 44.

GERONTICUS CALVUS, 1210.

- CARUNCULATUS, 1212.
- -- COMATUS, 1214.
- HAGEDASCII, 1213.
- MELANOCEPHALUS, 1211 GERVAISIA ALBOSPECULARIS, 434.
 - SECHELLARUM, 435.

Gilbvögel, 645-671.

Gimpel, 793.

Gross- Gimpel, 796.

Haken- - 811.

Karmin- — 797.

Meisen- - 798.

Girlitz, 769.

Girrvögel , 4003-4064.

Glanzstaare, 634-646.

Glanzvögel, 199-203.

Glanzvogel — braungrüner, 200.

grünschillernder

Glanzvogel, 199.

rothschwänziger- 201.

weissbauchiger- 203.

weissschnäbliger- 202

GLAREOLA MEGAPODIA, 1162.

- MELANOPTERA, 1161.
- -- PRATINCOLA, 1160. Glaréole, 1160.

Glaréoles, 1160-1165.

Glareolidae, 1160-1165.

GLAUCIDIUM PUMILUM, 94.

GLAUCIS HIRSUTUS, 239.

— мадерра, 240.

GLAUCOPTERYX CINERACEUS, 86.

- PALLIDUS, 87.

Gleitaar, 67.

Gobe-mouche rougeatre, 493.

Gobes-mouches, 490-505.

Goëland à manteau bleu, 1371.	Grand-Ducs, 99-111.		
— noir, 1366.	Grasmücke		
– à pieds bleus, 1365.	Bartgrasmücke, 330.		
— jaunes, 1368.	Brillen- — 331.		
- Bourgmestre, 1369.	Dorn- — 332.		
îchthyète, 1372.	Garten- — 338.		
— leucoptère, 1370.	Masken- — 335.		
Goldhähnchen, $347-348$.	Oliven- — 339.		
Goldhähnchen, feuerköpfiges,	Schlupf 329.		
348.	schwarzköpfige – 334.		
– gelbköpfiges, 347.	Sperber- — 337.		
GONIPHAEA CAERULEA, 800.	Zaun- <u> </u>		
— CYANEA, 801.	Grasmücken, 328-346.		
Gorge-bleu à plastron blanc, 355.	GRAUCALUS CALLDONICUS, 502.		
- ordinaire, 354.	Grèbe arctique, 1428.		
GOURA ALBERTISI, 1064.	- castagneux, 1429.		
Goura couronné d'Albertis, 1064			
Gourinae, 1064.	- jougris, 1426.		
Gouverneur, 658.	— oreillard, 1427.		
Graculinae , 1406-1415.	Grèbes , 4425-4430.		
GRACULUS AFRICANUS, 1413.	Grimpereau, 299.		
- BRASILIENSIS, 1410.	Grimpereaux, 299-300.		
CARBO, 1406.	Grive chanteuse, 417.		
- CRISTATUS, 1409.	— de vigne, 416.		
Gaimardi, 1411.	- draine, 414.		
- MELANOGASTER, 1408.	- litorne, 415.		
- MELANOGNATHUS, 1414.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
- NOVAE-HOLLANDIAE, 1407			
— PYGMAEUS, 1412.	Gros-bec incertain, 797. [298.		
sinensis, 1415.	- vulgaire, 781.		
Grakeln, 623.	Gros-becs, 781-782.		
Grallae, 1132-1286.	Grossfusshühner, 1075.		
GRALLARIA GUATEMALENSIS, 477.	Grousse d'Écosse, 1124.		
GRALLINA PICATA, 402.	Grue cendrée, 1170.		
Grammicus nasutus, 854.	- couronnée, 1172.		

SEMIFASCIATUS, 855.

Grand-Duc, 99.

demoiselle, 1171.

Grues, 1170-1172.

Gruidae, 1170-1172. Grünspechte, 952-959. Grünwürger, 552-557. GRUS CINEREA, 1170. Guépier vulgaire, 189. Guêpiers, 189-198. Guignette vulgaire, 1230. Guillemot à miroir, 1437. Guillemots, 1437-1439. GYGIS ALBA, 1396. GYMNOCEPHALUS CALVUS, 538. Gymnoderinae, 536-539. GYMNORHINA LEUCONOTA, 577. Gypaète barbu, 1. Gypaètes, 1. Gypaëtidae, 1. GYPAETUS BARBATUS, 1. Gypohieracinae, 11. GYPOHIERAX ANGOLENSIS, 11. GYPS FULVUS, 3. — Колы, 3.

807.

HYPOXANTHUS, 806.LINEOLUS, 805.

Gyratores, 1003-1064.

GYRINORHYNCHUS COLLARIUS,

— NIGROAURANTIA, 804.

Habicht, 69.

Finken- Habicht, 73.

Heuschrecken- 81.

Habichte, 69-81.

Hadrostomus minor, 528.

Haematopodidae, 1166
1169.

HAEMATOPUS LONGIROSTRIS,
1168.
— OSTRALEGUS, 1166.

-- PALLIATUS, 1167.

Hähnchen

Felsenhähnchen, grünes, 155. Gold- – feuerköpfiges, 348.

— — gelbköpfiges,

Hahnenschweifwittwe, 688-690.

HALCYON AMAUROPTERA, 176.

- CAPENSIS, 174.

— cinereifrons, 172.

— JAVANA, 175.

— SANCTA, 177.

- SEMICAERULEA, 173.

HALIAETUS ALBICILLA, 37.

- LEUCOCEPHALUS, 38.

- vocifer, 39.

Hammerköpie, 1194. Harelda Glacialis, 1335. Harfang, 90. Harle huppé, 1347.

-- le grand, 1346.

— *piette*, 1349, **Harles**, 1346-1349.

Harpie, 36.

Harporhynchus rufus, 429. Harpye, 36.

HARTLAUBIA AURATA, 644.

Hänfling — Berghänfling, 765.

Blut- — 764.

Hautschnäbler, 1287-1349. Heckenwürger, 561-569. Hedymeles' Ludovicianus, 802. HEDYMELES MELANOCEPHALUS, 803.

Heher, 578-590.

Heher — Blauheher, 583.

Busch-584.

Eichel-579.

- schwarzköpf. 580.

Schmuck- -585.

Tannendickschnä-

bliger, 594.

dünnschnäbliger, 595.

Unglücks- — 582. HELIANGELUS CLARISSA, 262.

Heliantheus Bonapartei, 260.

HELIANTHEUS, 259.

Heliomaster mesoleucus, 258. Heliornis fulica, 1278.

Heliornithidae, 1278-1280.

HELIOTHRIX AURITUS, 282.

Heliotrypha Parzudacki, 263.

Helochera rubrocristata, 534 HELOTARSUS ECAUDATUS, 41.

Héron cendré, 1173.

pourpré, 1174.

Hérons, 1173-1195.

HERPETOTHERES CACHINNANS, 72 HESPERIPHONA VESPERTINA, 782 Hibou brachyote, 110.

- de l'Oural, 116.

Hiboux, 89-119.

diurnes, 89-98.

HIERAETUS PENNATUS, 30.

HIMANTOPUS CANDIDUS, 1235.

- INTERMEDIUS, 1236.
- NIGRICOLLIS, 1237.

Hirondelle de cheminée, 133.

- de fenêtre, 140.
- de mer, 1384.
- épouvantail, 1390.
- la petite, 1389.
- leucoptère, 1395.
- moustache, 1391.
- de rivage, 138.
- de roches, 139.

Hirondelles, 133-141.

Hirondelles de mer, 1383-

1398.

Hirundinidae, 133-141.

HIRUNDO ALBIVENTER, 137.

- LUNIFRONS, 136.
- MELANOCRISSA, 135.
- RUSTICA, 133.
- SENEGALENSIS, 134.

Hoazin huppé, 1074.

Hoazins, 1074.

Hobereau, 48.

Hochequeues, 393-413.

Hodoiporus migratorius, 421.

Hokko — Berghokko, 1072.

Hokkos, 1073.

Hokkovöget, 1070-1073.

Honiganzeiger, der grosse, 971.

Honigkukuke, 971.

Honigsauger, 211-224.

Hopf — Baumhopf, 207.

Faden-___ 612.

Kragen- — 611. Paradies- — 609.

Schild-610.

204. Wiede-

- Senegal, 205

Hopfe, 204-210.

HOPLOPTERUS CAYANUS, 1148.	Schottenhuhn, 1124.	
- MELANOPTERUS, 1149.	Smaragd- — 1266.	
— SPINOSUS, 1146.	Sonnerats- — 1091.	
- VENTRALIS, 1147.	Spiessflug- — 1067.	
Hornrachen, 151-155.	Stein- — 1112.	
Hornvögel, 850-856.	Steppen- — 1069.	
Hornvogel	Teich- — das grünfüs-	
Doppelhornvogel, 851.	sige, 1268.	
Nas- — 850.	Trut- — das wilde,	
Weiss- — 852.	1095.	
Huhn — Auerhuhn, 1116.	Wasser- — 1275.	
Bankiva- — 1090.	- das Riesen,	
Birk- — 1119.	[1277.	
Bläss- — 1275.	Hühnchen —	
— — Kamm-	Laufhühnchen, 1105.	
1276.	— — das schwarz-	
Chukarstein- — 1113.	kehlige, 1106.	
Djungel- — 1092.	Sumpf- — das getüpfelte,	
Feld- — 1100.	1269.	
Flug- — das gebän-	das kleine, 1270.	
derte, 1066.	— — das Zwerg, 1271.	
Hammer- — 1075.	Taucher- — 1278.	
Hasel- — 1120.	Hühnerralle, 1274.	
Klippen- — 1115.	Hühnervögel, 1065-1126.	
Moor- — 1123.	Hühnerwallnister, 1075.	
Perl- — dasgemeine,	Huîtrier pie, 1466.	
1096.	Huitriers , 1166-1169.	
Prairie- — 1121.	Huppe, 204.	
Purpur- — 1267.	Huppes, 204-210.	
Rackel- — 1117.	Hydrobatidae, 436-438.	
Reb- — 1100.	Hydrochelidon anosthaetus,	
Ringelflug- — 1065.	1394.	
Roth- — 1114.	— FISSIPES, 1393.	
Schnee- — 1125.	нувкіда, 4391.	
Schnee- — das arktische,	- LEUCOPAREIA,1395.	
1126.	— NIGRA, 1390.	
Schopf- — 1074.	- PLUMBEA, 1392.	

Hydrophasianus chirurgus, 1284.

Hylocharis sapphirina, 274. Hylophilus poicilotis, 554. Hyphantornis brachypterus,

679.

- MELANOTIS, 678.
- PERSONATUS, 677.
- техтов, 676.

HYPOCHAERA NITENS, 708.

- sp., 709.
- HYPOLAIS ICTERINA, 346.
 - POLYGLOTTA, 345.
 - salicaria, 344.

Hypomorphnus urubutinga, 21. Hypotriorchis Aesalon, 50.

- ELEONORA, 49.
- RUFICOLLIS, 54.
- SUBBUTEO, 48.

Ibidinae, 1207-1214. **Ibis**, 1207-1214. lbis falcinellus, 1208.

- -- var. BENGALENSIS, 1209.
- RUBRA, 1207.
- Ibis gemeiner Ibis, 1208.

Nacktkopf- — 1210.

rother — 1207.

Ibis commun, 1208.

- rouge, 1207.

Ibise, 1207-1214.

ICTERIA VIRENS, 557.

Icterianae, 557.

Icteridae, 645-674.

Icterinae, 645-671.

ICTERUS JAMACAI, 649.

Iduna caligata, 323.

Indicator major, 971.

Indicatorinae, 971.

Inséparable, 915.

IRRISOR ATERRIMUS, 209.

- ERYTHRORHYNCHUS, 207.
- SENEGALENSIS, 208.

IXOCINCLA CRASSIROSTRIS, 443.

— MADAGASCARIENSIS, 442.

Jacamars, 199-203. **Jacanas**, 1281-1284.

Jacana commun, 1281.

- d'Afrique, 1282.
- indien, 1283.

Jacus, 1070-1071.

Jako, 901. *Jaseur*, 523.

— d'Amérique, 524.

Jaseurs, 523-526.

Jassana, 1281.

JERAX CAERULESCENS, 59.

Jewar, 4093.

Jodopleura pipra, 548.

Jonornis martinicus, 1267.

Juida aenea, 634.

- AURATA, 636.
- -- nitens, 638.
- PURPUROPTERA, 635.
- SPLENDIDA, 637.

Juidinae, 634-644.

Kahnschnabel, 1195.	Regenpfeiferkiebitz, 1150.		
Kahnschnäbler, 1195.	Sporn- — 1146.		
Kaka, 894.	Steppen- — 1142.		
Kakadu —	Kirschkernbeisser, 781.		
Arara- Kakadu, 925.	Kiwi, le petit, 1131.		
grosser Gelb'- — 920.	Klaffschnäbel, 1200.		
Helm- — 924	Klaffschnabel, 1200.		
Nasen- — 922.	Kleiber, 296.		
Raben- — 923.	Felsenkleiber, 297.		
Rosen- — 921	Klettervögel, 857-1002.		
schwefelgelber — 949	Klippenvögel , 549-551.		
Kakadus, 918-925.	Klippenvogel, 550.		
Kamichi, 1285.	Scharlach-Klippenvogel,551.		
Kamichi, 1285.	Knacker , 198-807.		
Kamichis, 1285-1286.	Knacker — Rosenbrustknacker		
Kammhühner, 1090-1094.	Kobez, 56. [802.		
Kampfläufer, 1238.	Koel, 1001.		
Kanarienvogel, 770. Königsvogel, 518.			
Kapuzinervogel, 538. Königswürger, 506-5			
Kardinal, der graue, 791. Kolibri —			
— der rothe, 799.	Chimborazokolibri, 233.		
Kasuar — Helmkasuar, 1130.	Sonnenkolibri, 230.		
Kasuare, 1130.	Topaskolibri, 251.		
Katzenvogel, 428.	Kolibris , 230-282.		
Käuzchen	Kolkrabe, 599.		
Sperlingskäuzchen, 95	Korella, 918.		
Kauz — Bart- Kauz, 114.	Kormoran, 1406.		
Lapplands- — 114.	- der chinesische, 1415.		
Rauchfuss- — 117.	Kotinga — Blaukotinga, 530.		
Stein- — 191.	Cayenn- — 532.		
Wald- — 112.	Halsband- — 531.		
Wüsten- — 92.	Pompadur- — 533		
Kehllappenträger, 1073.	Kotingas, 527-551.		
Kernbeisser, 781-782.	Krähe — Alpenkrähe, 608.		
KETUPA CEYLONENSIS, 104.	Nebel- — 601.		
— JAVENSIS, 105. Raben— 600			
Kiebitz, 1141.	Saat- — 602.		

Kranich, der graue; 1170. Jungfernkranich, 1171. 1172. Pfauen-Kraniche, 1170-1172. Kranichgeier, 88. Kreuzschnäbel, 808-812. Kreuzschnabel — Fichtenkreuzschnabel, 808. 809. Kiefern-Weissbinden — 810. Krokodilwächter, 1163. Krontauben, 1064. Kropfvögel, 536-539. Kua — Blaukua, 976. Hauben- 975. Kuas, 975-976. Kukuk, 992. 978. Fasanenkukuk, 982. Regen-Riesen-1002. 983. Roth-996. Smaragd-999. Strauss-Trauerbusch- — 973. Kukuke, 992-1002. Kukukspecht, 969. Kukuksspechte, 967-969. Kukuksvögel, 971-1002. Kurol, 149. Kuruku — Pfauenkuruku, 162. Kurzfüsser, 439-455.

Lagopède des Alpes, 1125. — du Nord, 1123.

Kruzschwanzpapageien,

896-917.

LAGOPUS ALBUS, 1123.

- MUTUS, 1125.
- RUPESTRIS, 1126.
- scoticus, 1124.

Lamellirostres, 1287-1349.

LAMPORNIS MANGO, 238.

LAMPROCOCCYX CHRYSITES, 998.

- KLAASI, 997.

Langschwanzkakadus, 923—924.

Laniarius barbarus, 573.

Laniidae, 558-576.

Laniinae, 561-569.

LANIO ATRICAPILLUS, 718. LANIUS COLLARIS, 566.

- collurio, 565.
- Excubitor, 561.
- MERIDIONALIS, 563.
- MINOR, 562.
- -- Nubicus, 567.
- RUFUS, 564.
- TEPHRONOTUS, 568.

Laridae, 1362-1399.

Larinae, 1365-1382.

Lärmvogel, 848.

Gürtel-Lärmvogel, 849.

LARUS ARGENTATUS, 1371.

- -- canus, 1365.
- Fuscus, 1368.
- GLAUCUS, 1369.
- ICHTHYAETUS, 1372.
- LEUCOPTERUS, 1370.
- marinus, 1366.
- vetula, 1367.

Lasurblauvogel, 225.

Laubvögel, 442-447.

Laubvogel — Fitislaubvogel,341.

340.

Weiden- -342.Laufhühnchen, 1105. - das schwarzkehlige,1106. Lauftauben, 1054-1062. Laufwachteln, 1105-1106. LEGATUS ALBICOLLIS, 509. Leierschwanz, 301. Leierschwänze, 301. Leinfink, 761. Langschnabelleinfink, 762. Nordischer 763. LEISTES SUPERCILIARIS, 659. LEPTOPTERUS VIRIDIS, 462. LEPTOPTILA VERREAUXI, 1053. LEPTOPTILUS DUBIUS, 1199. LEPTOSOMUS DISCOLOR, 149. Lerche - Alpenterche, 827. Feld-830. Hauben-832. Hehersand-840. Heide-831. Howa-842. Isabell-833. Kalander-837. Mohren-839. Steppen-836.

Waldlaubvogel,

Lerchen, 827-842.

Stummel-

Lestridinae, 1362-1364.

Weissflügel- -

835.

838.

LESTRIS CREPIDATA, 1364.

- PARASITICA, 1362.
- POMARINA, 1363. Leucopolius tenellus, 1159.

LEUCOSARCIA PICATA, 1060.

LEWINIA ALBIVENTER, 1259.

LICMETIS NASICUS, 922.

Liest — Baumliest, 173.

Jäger- — 169.

Lieste, 169-177.

LIGURINUS CHLORIS, 771.

LIMICOLA PYGMAEA, 1246.

LIMNOCORAX FLAVIROSTRIS, 1273.

LIMOSA AEGOCEPHALA, 1218.

- FEDOA, 1220.
- LAPPONICA, 1219.

Limosinae, 1215-1220.

LINARIA ALNORUM, 761.

- BOREALIS, 763.
- Holboelli, 762.

Linotte, 764.

des montagnes, 765.

Lipauginae, 535.

LIPAUGUS CINERACEUS, 535.

LOBIVANELLUS INDICUS, 1143.

- LOBATUS, 1144.
- SENEGALENSIS, 1145.

LOCUSTELLA FLUVIATILIS, 325.

NAEVIA, 326.

Locustelle fluviatile, 325.

tachetée, 326.

Löffelreiher, 1201-1202.

Longipennes, 4350-1399.

Lophophore resplendissant,

1089.

LOPHOPHORUS IMPEYANUS, 1089.

LOPHORNIS MAGNIFICUS, 272.

ORNATUS, 271.

LOPHORTYX CALIFORNICA, 1110.

GAMBELI, 1111.

Lori — Breitschwanzlori, 887.

Pesquets-Berg- — 895.

Pflaumkopf-889.

888. Rothbrustleri, Lori, 887. Loriculus Galgulus, 886. Lorinae, 885-893. Loriot, 466. de Paradis, 622. Loriots, 465-471. de Paradis, 622. Loris, 885-893. LORIUS ERYTHROTHORAX, 888. LORI, 887. Loxia curvirostra, 808. LEUCOPTERA, 810. PITHYOPSITTACUS, 809. Loxianae, 808-812. LULLULA ARBOREA, 831. Lumme — Grylllumme, 1437. Trottel- — 1438. Lummen, 1437-1439. Lund, 1432. Eislund, 1433. Luscinia minor, 349. Luscinidae, 308-368. Luscininae, 349-355. LUSCINIOLA MELANOPOGON, 324Lusciniopsis luscinioides, 318. Lycos monedula, 605. Lyre, 301.

Macareux glacial, 1433.

— moine, 1432.

MACHETES PUGNAX, 1238.

Macreuse, 1340.

— à large bec, 1339.

Lyres, 301.

Macreuse, la double, 1341. Macronyx capensis, 412.

— CROCEUS, 413.

MACROPYGIA AMBOINENSIS, 1031.

MACRORHAMPHUS GRISEUS, 1248.

Madenfresser, 979-981.

Madenfresser, der grosse, 980. Madenhacker, der rothschnäblige, 632.

Madenhacker, 632.

Magnifique, 618.

Mähnentauben, 1063.

Malaconotinae, 570-576.

MALACORHYNCHUS MEMBRANA-CEUS, 1322.

Maléo, 1075.

Malurinae, 308-313.

Mango, 238.

Marabou, 1199.

Marabu, 1199.

MARECA AMERICANA, 1308.

— PENELOPE, 1307.

MARMONETTA ANGUSTIROSTRIS, 1320.

Martin-chasseur géant, 169. Martin-pêcheur, 178.

Martin roselin, 624.

Martins-pêcheurs, 169-188.

Martinet à ventre blanc, 130. — de murailles, 129.

Martinets, 129-132.

Mauerläufer, 300.

Mauerläufer, 300.

Mäusevögel, 843-844.

Mäusevogel, 844.

Meerläufer, 1354.

MEGACEPHALON MALEO, 1075. MEGALAIMA ASIATICA, 931.

- наемасернала, 933.
- LINEATA, 932.

Megalophonus crassirostris, 834.

Megapodidae, 1075.

MEGARHYNCHUS PITANGUA, 513. MEGASCOPS ASIO, 407.

Meise — Bartmeise, 383.

Beutel- — 382.

Blau- — 376.

Gürtel- — 374.

Hauben- — 378.

Kohl- — 369.

Lasur- - 375.

Schwanz- - 381.

Specht- — 296.

— — Ural,296.

Sultans- — 380.

Sumpf- - 371.

-- -- nordische, 372.

Tannen- - 370.

Trauer- — 373.

Ultramarin-

Blau- = 377.

Meisen, 369-384.

Melaenornis edolioides, 459. Melanerpes erythrocephalus

965.

- Flavifrons, 966.

Melanerpinae, 960-966.

MELANOCHLORA SULTANEA, 380. MELANOCORYPHA CALANDRA, 837.

- LEUCOPTERA, 838.
- TATARICA, 839.

MELANOPSAR CAYANENSIS, 654. MELANOTIS CAERULESCENS, 427.

Meleagrinae, 1095.

MELEAGRIS GALLOPAVO, 1095.

MELIERAX POLYZONUS, 81.

MELIPHAGA PHRYGIA, 284.

Meliphagidae, 283-291.

Meliphagidés, 283-291.

MELITHOPHAGUS PUSILLUS, 198. MELOPSITTACUS UNDULATUS, 870

MENURA SUPERBA, 301.

Menuridae, 301.

Merginae, 1346-1349.

MERGULUS ALLE, 1439.

MERGUS ALBELLUS, 1349.

- CUCULLATUS, 1348.
- MERGANSER, 1346.
- SERRATOR, 1347.Merle, 419.
 - à plastron blanc, 420.
 - bleu, 423.
 - des roches, 422.
 - noir, 419.

Merles, 414-435.

Merles d'eau, 436-438.

Meropidae, 189-198.

MEROPS AEGYPTIUS, 191.

- Albicollis, 193.
- APIASTER, 189.
- HIRUNDINACEUS, 197.
- NUBICUS, 195.
- ORNATUS, 196.
- Savignyi, 192.
- SUPERCILIOSUS, 190.
- viridissimus, 194.

MERULA TORQUATA, 420.

- VULGARIS, 419.

Mésange à longue queue, 381.

- à moustache, 383.
- azurée, 375.
- bleue, 376.
- charbonnière, 369.
- des marais, 371.
- du nord, 372.
- des sapins, 370.
- huppée, 378.
- nonnette, 372.
- remiz, 382.

Mésanges, 369-384.

MESOMORPHA BENGALENSIS, 102. MICROGLAUX OCCIPITALIS, 93. Microglosse noir, 925.

Microglossinae, 925.

Microglossus aterrimus, 925. MICROPTYNX GNOMA, 96.

- PASSERINA, 95.
- sp. x, 97.

Milan, der afrikanische, 63.

- der rothe, 61.
- der schwarzbraune, 62.

Milan d'Afrique, 63.

- noir, 62.
- royal, 61.

Milane, 60-68.

Milans, 60-68.

MILIARIA EUROPAEA, 822.

Milvinae, 60-68.

MILVULUS FORFICATUS, 522.

- TYRANNUS, 521.
- MILVUS AEGYPTIUS, 63.
 - ATER, 62.
 - REGALIS, 61.

MIMETA VIRIDIS, 470.

Mimus gracilis, 426.

MIMUS POLYGLOTTUS, 424.

THENCA, 425.

MIRAFRA HOVA, 842.

JAVANICA, 841.

MNIOTILTA VARIA, 385.

Miniotiltidae, 385-392.

Moineau, 775.

Molothrus aeneus, 670.

- ATER, 669.
- BONARIENSIS, 671.

Momotidae, 156.

Momots, 156.

Momotus brasiliensis, 156.

Monasa fusca, 167.

NIGRA, 166. Monticola saxatilis, 422.

Montifringilla nivalis, 774. MOTACILLA ALBA, 393.

- FLAVIVENTRIS, 395.
- SULPHUREA, 396.
- YARELLI, 394.

Motacillidae, 393-413.

Motacillinae, 393-402.

Motmot, 156.

Mouette à capuchon, 1374.

- mélanocéphale, 1375.
- naine, 1380.
- rieuse, 1373.
- tridactyle, 1382.

Mouettes, 1362-1399.

Möve — Eismöve, 1369.

Möve, 1372. Fischer-

1368. Härings-

Hut-1375.

1374. Kaputzen-___

1373.

Lach-

Mantel-1366.

Polar-Möve, 1370. Raub-— Kreisch, 1364 - Schmarotzer, 1362. Spatel, 1363. 1381. Rosensilber- — Silber-1371. Stummel-1382. Sturm-1365. 1380. Zwerg-Möven, 1362-1399. Moyen-Duc, 109. Muscicapa albicollis, 492. ATRICAPILLA, 491. GRISOLA, 490. Muscicapidae, 490-505. Muscicapinae, 490-494. MUSOPHAGA VIOLACEA, 845. Musophage violet, 845. Musophages, 845-849. Musophagidae, 845-849. Muti, 59. Myiagrinae, 495-499. Mylarchus crinitus, 515. FEROX, 517. Swainsoni, 516. Myiodynastes maculatus, 512.

Nachtigall, 349.

Baumnachtigall, 327. Nachtigallen, 349-355. Nachtkäuze, 112-119. Nachtpapageien, 926. Nachtraubvögel, 89-119.

Myiozetetes cayennensis, 508.

Nachtschwalben, 120-128. Naisraketenschwanz, 171. Nandou, 1128. Nandous, 1128. Nandu, 1128. Nandus, 1128. Nashornvogel, 850. Natatores, 1287-1440. NAUGLERUS FURCATUS, 64. NECTARINIA ANGLADIANA, 217. CÝANOCEPHALA, 214.

- PLATURA, 216.
- PULCHELLA, 215.
- SENEGALENSIS, 213.
- SOVIMANGA, 212.
- SPLENDIDA, 211.

NEMOSIA FULVICEPS, 740. NEOPHRON PERCNOPTERUS, 9.

PILEATUS, 10.

Neophroninae, 9-10.

NESTOR MERIDIONALIS, 894.

Nestorinae, 894-895.

NETTAPUS AURITUS, 1298.

- COROMANDELICUS, 1299. NEWTONIA BRUNNEICAUDA, 494. Nicobar à camail, 1063. Nigrita bicolor, 687. Nimmersatt, 1206.
- der amerikanische, 1205 Nimmersatts, 1205-1214. Nisuoides Francesi, 80. Noddi, 1397. Notauges chrysogaster, 640. Nucifraga leptorhynchus, 595.
- PACHYRHYNCHUS, 594. Numenius arquatus, 1215.
 - риаеория, 1216.

Numenius tenuirostris, 1217. Numida meleagris, 1096.

— MITRATA, 1097.

Numidinae, 1096-1097.

NYCTALE TENGMALMI, 117.

NYCTALEUS LACTEUS, 103.

NYCTEA NIVEA, 90.

NYCTIGORAX CALEDONICUS, 1192.

- EUROPAEUS, 1191.

- NAEVIUS, 1193. NYCTIDROMUS ALBICOLLIS, 125 NYMPHICUS NOVAE-HOLLANDIAE, 918.

OCYDROMUS AUSTRALIS, 1257. OCYPHAPS LOPHOTES, 1057. Odinshenne, 1256.

Odontophorinae, 1107-

Oedicnème criard, 1138. **Dedicnèmes**, 1138-4140. **Dedicneminae**, 1138-4140. Oedicnemus crepitans, 1138.

— SENEGALENSIS, 1139.
OENA CAPENSIS, 1031.
Ohreulen, 99-111.
OIDEMIA AMERICANA, 1342.

- Deglandi, 1343.
- Fusca, 1341.
- NIGRA, 1340.
- PERSPICILLATA, 1339.

Oie Bernache, 1296.

- cendrée, 1290.
- cravant, 1295.
- des neiges, 1294.

Oie naine, 1293.

- rieuse, 1292.
- sauvage, 1291.

Oies, 1290-1300.

Oiseau du Tropique, 1400. Oiseau-souris, 844.

Oiseaux, 1-1440.

- barbus, 927-934.
- -- du Tropique, 1400
- **souris**, 843-844.

Opisthocomidae, 1074.
Opisthocomus cristatus, 1074
Orchesticus capistratus, 746.
Oreopelia montana, 1052.
Oréophase de Derbi, 1072.
Oréophases, 1072.
Oreophasinae, 1072.
Oreophasis Derbianus, 1072.
Oreotrochilus chimborazo,

233.

Organisten, 752-757. **Oriolidae**, 465-471. Oriolus auratus, 467.

- GALBULA, 466.
- -- INDICUS, 468.
- MELANOCEPHALUS, 469. ORTALIDA VETULA, 1071. ORTYX PECTORALIS, 1108.
- virginianus, 1107.Otididae, 1132-1137.

OTIDIPHAPS NOBILIS, 1061.

Otis tarda, 4132.

— TETRAX, 1133. Otocoris alpestris, 827.

- вігорна, 829.
- cornuta, 828. Otus vulgaris, 109.

Outarde à ventre noir, 1135.

- barbue, 1132.
- de Denham, 1134.
- du Sénégal, 1136.

Outardes, 1132-1137.

Pabst, 789.

Pachycephalinae, 558-560.

PALAMEDEA CORNUTA, 1285.

Palamedeidae, 1285-1286.

PALAEORNIS DOCILIS, 873.

- ERYTHROCEPHALUS, 875.
- LATHAMI, 876.
- TORQUATUS, 874.

Pandion haliaëtus, 35. Panurus biarmicus, 383. Paon, 1076.

- des Zoses, le petit, 1264.
- sauvage, 1077.

Paons, 1076-1079.

Paons des Zoses, 1264.

Papagei —

Amazonenpapagei, 907.

Eulen- 926.

Grünedel- — 897.

Rothedel- — 896.

Rothkopf- — 903.

Senegal- — 904.

Sperlings- — 913.

Zwerg- der schwarz-

schulterige, 914

— — der unzertrennliche, 915.

Papageien, 864-917.

Paradieshopfe, 609-613.

Paradiespirole, 622.

Paradiesvögel, 609-622.

Paradiesvogel, der grosse, 614.

- der kleine, 615.
- der rothe, 616.

Königsparadiesvogel, 619.

Papu- — 615.

sechsstrahliger- — 620.

PARADISEA APODA, 614.

- MINOR, 615.
- SANGUINEA, 616.

Paradiseidae, 609-622.

Paradiseinae, 614-621.

Paradisier de Wilson, 617.

- jaune, le grand, 614.
- le petit, 615.
- rouge, 616.

Paradisiers, 609-622.

PARDALOTUS STRIATUS, 559.

Paridae, 369-384.

PAROARIA CUCULLATA, 791.

- GULARIS, 790.

PAROTIA SEXPENNIS, 620.

PARRA AFRICANA, 1282.

- indica, 1283.
- JACANA, 1281.

Parridae, 1281-1284.

Parus ater, 370.

- BOREALIS, 372.
- cinctus, 374.
- coeruleus, 376.
- cristatus, 378.
- CYANEUS, 375.
- LEUCOPTERUS, 379.
- LUGUBRIS, 373.
- MAJOR, 369.
- PALUSTRIS, 371.

Parus ultramarinus, 377. Passer domesticus, 775.

- IIISPANIOLENSIS, 778.
- ITALIAE, 777.
- MONTANUS, 776.

Passereaux, 120-856.

Passerella Iliaca, 785.

Passerellinae, 783-786.

Passeres, 120-856.

- Conirostres, 577-
 - 856.
- Dentirostres, 308-
 - 576.
- **Fissirostres**, 120-203.
- Tenuirostres, 204-

Passerina ciris, 789. [307.

-- CYANEA, 788.

Pastor roseus, 624.

PAVO CRISTATUS, 1076.

— MUTICUS, 1077.

Pavoninae, 1076-1079.

Pégot des Alpes, 367.

— mouchet, 368.

Pégots, 367-368.

Pelecanidae, 1404-1421.

Pelecaninae, 1416.1420.

Pelecanus crispus, 1417.

- Fuscus, 1420.
- onocrotalus, 1416.
- RUFESCENS, 1418.
- TRACHYRHYNCHUS, 1419 Pelekan, 1416.
- der krausköpfige, 1417.

Pelekane, 1404-1421.

Pélican frisé, 1417.

- onocrotale, 1416.

Pélicans, 1404-1421.
Pendulinus rufaxilus, 653.
Penelope Jacuaca, 1070.
Penelopinae, 1070-1071.

Perdicinae, 1098-1103.

Perdrix, 1098-1103.

Perdrix des roches, 1115.

- grise, 1100.
- rouge, 1114.

Pericrocotus cinereus, 500.

Perisoreus infaustus, 582.

Peristera cinerea, 1051.

Perlhühner, 1096-1097.

Pernis apivorus, 60.

Perroquet cendré noir, 902.

— gris, 901.

Perroquets, 864-917.

Perruche de Pennant, 864.

- omnicolore, 865.
- ondulée, 870.

Petit-Duc, 106.

PETASOPHORA ANAIS, 241.

— THALASSINA, 242. Pétrel des glaces, 1357.

— géant, 1356.

— tempête, 1352.

Pétrels, 1350-1361.

PETROCINCLA CYANEA, 423.

Petroica phoenicea 365.

Pezites Defilippii, 665.

- MILITARIS, 666.

Pezoporinae, 864-876.

Pfarrvogel, 285.

Pfau - Hauspfau, 1076.

Spiegel- — 1078.

Wild- — 1077.

Pfauen, 1076-1079.

Pfeiferfresser, 857-863. Pfeifkrähen, 577.

PHAETHORNIS EREMITA, 231.

- EURYNOME, 230.
- RUFIGASTER, 232.

PHAETON AETHEREUS, 1400.

Phaëtontidae, 1400.

PHAINOPEPLA NITENS, 526.

Phalaropodidae, 1255-1256

PHALAROPUS FULICARIUS, 1255.

— HYPERBOREUS, 1256.
Phaps chalcoptera, 1059.
Pharomacrus mocinna, 162.

Phasianidae, 1076-1097.

Phasianinae, 1080-1089.

Phasianus colchicus, 1080.

- Mongolicus, 1082.
- TORQUATUS, 1081.
- versicolor, 1083.

PHEMONOE CUPREIVENTRIS, 279.

Duengopeping species v 207

Pheugopedius species x, 307.

Phibalura flavirostris, 529.

PHILEPITTA JALA, 476.

Philetaerus socius, 686.

PHLEGOENAS LUZONICA, 4062.

Phoenicocercus carnifex, 549.

Phoenicophaeinae, 972-

974.

Phoenicophaeus curvirostris,

972.

Phoenicopteridae, 1203-

1204.

PHOENICOPTERUS ANTIQUORUM,

1203.

ERYTHRAEUS, 1204.

PHOENICOTHRAUPIS RUBICOIDES,

730.

PHOENICOTHRAUPIS RUBICUS,

729.

Pholidauges Leucogaster, 639 Phonipara pusilla, 792.

PHYLIDOR SUPERCILIARIS, 295.

PHYLLOPNEUSTE BONELLI, 343.

- RUFA, 342.
- SIBILATRIX, 340.
- TROCHILIUS, 341.

PHYLLORNIS COCHINCHINENSIS,

447.

Phyllornithinae, 442-447.

PIAYA CAYANA, 983.

- Мешневі, 984.
- RUTILA, 985.

Pic à front doré, 966.

- à tête rouge, 965.
- cendré, 953.
- doré, 967.
- épeichette, 939.
- leuconote, 940.
- noir, le grand, 947.
- tridactyle, 936.
- -- vert, 952.

PICA CAUDATA, 596.

— MAURITANICA, 597.

Picidae, 935-970.

Picinae, 936-951.

PICOIDES TRIDACTYLUS, 936.

PICOLAPTES TENUIROSTRIS, 294

Pics, 935-970.

Pics-verts, 952-959.

Picumninae, 935.

Picumnus minutissimus, 935.

Picus Analis, 941.

- LEUCONOTUS, 940.
- MAJOR, 937.

Picus medius, 938.

- MINOR, 939.
- PUBESCENS, 942.
- varius, 944.
- villosus, 943.

Pie bleue, 598.

- ordinaire, 596.

Pie-grièche écorcheuse, 565.

- grise, 561.
- la petite, 562.

Pieper — Baumpieper, 406.

Brach- 409.

Felsen- — 404.

Rothkehl- — 408.

Sporen- -- 411.

Wasser- -- 403.

Wiesen- — 407.

Piepern, 403-413.

Pies-grièches, 558-576.

Pigeon migrateur, 1030.

Pigeons, 1003-1064.

Pingouin torde, 1431.

PINICOLA CANADENSIS, 812.

- ENUCLEATOR, 811.

Pinzelzüngler, 283-291.

Pinzelzungenpapageien,

885-893.

Pinson des montagnes, 759.

- des neiges, 774.
- -- ordinaire, 758.

Pinsons, 758-812.

Pintades, 1096-1097.

PIONIAS MELANOCEPHALUS, 906.

- MEYERI, 905.
- внороря, 903.
- SENEGALENSIS, 904.

Pipilo erythrophthalmus, 783.

Pipit, 229.

Pipit à gorge rouge, 408.

- des arbres, 406.
- -- des prés, 407.
- -- farlous, 407.
- maritime, 404.
- spioncelle, 403.

Pipits, 403-413.

PIPRA AUREOLA, 542.

- CAUDATA, 541.
- CHRYSOPTERA, 543.
- -- ERYTHROCEPHALA, 544.
- GUTTURALIS, 545.
- PAREOLA, 540.
- SERENA, 546.
- Species x, 547.

Pipraidea melanonota, 739.

Piprinae, 540-548.

Piranga aestiva, 714.

- ERYTHROMELAENA, 717.
- LUDOVICIANA, 716.
- RUBRA, 713.
- SAIRA, 715.

Pirol, 466.

Paradiespirol, 622.

Pirole, 465-471.

Pisangfresser, 845-849.

PITANGUS MAXIMILIANI, 511.

— sulphuratus, 510.

PITHYS ALBIFRONS, 480.

PITTA CYANOPTERA, 472.

- ELEGANS, 475.
- GRANATINA, 474.
- MAXIMA, 473.

Pitta - Blauflügelpitta, 472.

Granatpitta, 474.

Gross- — 473.

Pittas, 472-476.

Pittidae, 472-476.

Pitylinae, 742-750.

PITYLUS ERYTHROMELAS, 747. PLATALEA AJAJA, 1202.

EUCORODIA, 1201.

Plataleidae, 1201-1202.

Plattschweifsittiche, 864-876.

PLATYCERCUS EXIMIUS, 865.

- HAEMATOGASTER, 866.
- NOVAE-ZEALANDIAE, 869.
- Pennanti, 864.
- SCAPULATUS, 868.
- spurius, 867.

PLATYLOPHUS GALERICULATUS, 578.

Platysteira cyanea, 495. Plectrophanes lapponicus,

826. — NIVALIS, 825.

Ploceidae, 675-709.

Ploceinae, 675-687.

PLOCEUS SANGUINIROSTRIS, 680. Plongeon cat-marin, 1424.

- _ imbrin, 1422.
- lumme, 1423.

Plongeons, 1422-1424.

Plongeurs, 1422-1440.

Plotidae, 1401-1403

PLOTUS ANHINGA, 1401.

- LEVAILLANTI, 1403.
- MELANOGASTER, 1402. PLUVIANUS AEGYPTIUS, 1163. Pluvier à collier, 1155.
 - - interrompu,1157.

Pluvier à collier, le petit, 1156.

- doré, 1151.
- guignard, 1153.

Pluviers, 1138-1141.

Podagerinae, 128.

Podarginae, 120.

Podargus papuensis, 120. Podica personata, 1280.

- SENEGALENSIS, 1279. Podiceps auritus, 1427.
 - CORNUTUS, 1428.
 - CRISTATUS, 1425.
 - DOMINICUS, 1430.
 - GRISEIGENA, 1426.
 - _ MINOR, 1429.

Podicipidae, 1425-1430.

Poë, 285.

Poecilornis sparverius, 58. Pogonorhynchus abyssinicus, 928.

- __ Dubius, 927.
- Vieilloti, 929.

Polyborinae, 12.

Polyborus tharus, 42. Polioptila mexicana, 384. Polyplectron bicalcaratum, Polytmus Linnaei, 244. [1078.

— TEPHROCEPHALUS, 245. Porphyrio melanotus, 1265.

- SMARAGNOTUS, 1266.

Porphyrioninae, 1265-

Pouillot Bonelli, 343. [1267.

- fitis, 341.
- le grand, 344.
- polyglotte, 345.
- siffleur, 340.
- *vėloce*, 342.

Poule d'eau Baillon, 1271.

- *commune*, 1268.
- *marouette*, 1269.
- — poussin, 1270.

Poules, 1265-1277.

Poules d'eau, 1268-1274.

Poules sultanes, 1265-1267

Prachtfinken, 691-709.

Prasitis prasina, 275.

Pratincola rubetra, 363.

- RUBICOLA, 362.
- SYBILLA, 364.

Prinia familiaris, 308.

Prioniturus flavicans, 872.

Prionops plumatus, 570.

— poliocephalus, 571.

Procellariidae, 1350-1361.

Drogning menga 754

Procnias tersa, 751.

Procniatinae, 751.

Progne purpurea, 141.

Proméfil, 610.

Promeropidae, 211-224.

PROSTHEMADERA NOVAE-ZEALAN-

DIAE, 285.

PSALIDOPRYMNA AMARYLLIS, 267.

Pseudaëtus Bonellii, 29.

Pseudoleistes viridis, 660.

Psilorhinus albirostris, 642.

могіо, 589.

Psittacidae, 864-917.

Psittacinae, 896-917.

PSITTACULA CANA, 916.

- INCERTA, 917.
- MELANONOTA, 914.
- PASSERINA, 913.
- PULLARIA, 915.

PSITTACUS ERYTHACUS, 901.

PSITTACUS TIMNEH, 902.
PTEROCLES ALCHATA, 1067.

- ARENARIUS, 1065.
- FASCIATUS, 1066.
- GUTTATUS, 1068.

Pteroclidae, 1065-1069.

PTEROGLOSSUS BAILLONI, 861.

- DISCOLOR, 860.
- Prasinus, 863.
- VIRIDIS, 862.

Pteroptochus megapodius, 302.

Pteroptochidae, 302.

PTILINOPUS JAMBU, 1014.

- MELANOCEPHALUS, 1013.
- PURPURATUS, 1012.

Ptilogonydinae, 526.

PTILONORHYNCHUS HOLOSERICEUS,

471.

PTILOPSIS LEUCOTIS, 108.

Ptilorhis de Paradis, 609.

PTILORHIS PARADISEUS, 609.

PUFFINUS ANGLORUM, 1351.

— MAJOR, 1350.

Pycnonotidae, 439-455.

Pycnonotidés, 439-441.

Pycnonotinae, 439-441. Pycnonotus cafer, 440.

- Jocosus, 441.
- obscurus, 439.

Pyrgita petronia, 773.

Pyrgitopsis diffusus, 780.

- SIMPLEX, 779.

Pyrocephalus rubineus, 514.

Pyroderus scutatus, 537.

Pyrrhocoracinae, 607-608

Pyrriiocorax alpinus, 607.

Pyrrhula coccinea, 794.

Pyrrhula europaea, 793.	Sonnenralle, 1264.		
— — MAJOR, 794.	Wasser- — 1260.		
	Wiesen- — 1263.		
	Rallen , 1257,1263.		
	Rallenreiher, 1182.		
QUERQUEDULA CAROLINENSIS,	Rallidae , 4257-1263.		
1315.	RALLUS AQUATICUS, 1260.		
— circia, 1312.	— ELEGANS, 1261.		
CRECCA, 1313.	Ramphastidae, 857-863.		
- CRECCOIDES, 1316.	RAMPHASTOS CARINATUS, 858.		
— DISCORS, 1314.	— тосо, 857.		
- ERYTHRORHYNCHA,	— VITELLINUS, 859.		
1317.	RAMPHOCELUS BRASILIUS, 711.		
FORMOSA, 1318.	— ЈАСАРА, 710.		
QUERULA PURPURATA, 536.	- SANGUINOLENTUS, 712.		
Quesal, 162.	Rapaces , 1-119.		
Quiscalinae, 672-674.	— diurnes, 1-88.		
Quiscalus aeneus, 673.	— nocturnes, 89-419		
- MACRURUS, 674.	Raubmöve —		
- PURPUREUS, 672.	Kreischraubmöve, 1364		
ŕ	Schmarotzer- — 1362.		
<u>—</u>	Spatel- — 1363.		
	Raubmöven , 1362-1364.		
Rabe — Geierrabe, 606.	Raubvögel, 1-119.		
Horn- — 856.	Rauchfusshühner, 1116-		
Raben, 594-606.	1126.		
Rabenkakadu, 923.	Raupenfresser, 500-505.		
Rabenparadiesvögel, 614-	RECURVIROSTRA AVOCETTA, 1234.		
621.	Recurvirostrinae, 1234-		
Rabenvögel, 577-608.	1237.		
Rake — Blaubauchrake, 145.	Regenpfeifer, 1138-1141.		
Blaurake, 142.	Regenpfeifer —		
Raken, 142-150.	Flussregenpfeifer, 1156.		
Râle d'eau, 1260.	Gold- — 1151.		
- de genéts, 1263.	Halsband- — 1155.		
Râles , 1257-1263.	Kiebitz- — 1150.		
Ralle - Hühnerralle, 1274.	Mornell 1153.		
	4		

Seeregenpfeifer, 1157. Steppen- 1154.

Regulinae , 347-348.

REGULUS CRISTATUS, 347.

— IGNICAPILLUS, 348.

Reiher, 4173-1195.

Reiher - Edelreiher, 1177.

Fisch- — 1173.

Löffel- — 1201.

der rothe,1202.

Nacht- — 1191.

Purpur- — 1174.

Rallen- — 1182.

Seiden- — 1178.

Reiherente, 1325.

Rennvögel, 1163-1165.

RHEA AMERICANA, 1128.

Rheidae, 1128.

Вимовтна силогориава, 974.

RHIPIDURA PECTORALIS, 496.

RHOPOTERPE FORMICIVORA, 479.

RHYNCHAEA BENGALENSIS, 1254.

- CAPENSIS, 1253.

RHYNCHOPS NIGRA, 1399.

Rhynchopsinae, 1399.

RISSA TRIDACTYLA, 1382.

Rohrdommel, 1189.

– Zwerg, 1187.

Rohrdommeln, 4187-4193.

Rohrsänger, 314-327.

Roi des oiseaux de Paradis, 619

— des Vautours, 6.

Roitelet huppé, 347.

Roitelets, 347-348.

Rollier à ventre bleu, 145. Rollier, violette, 147. Rollier vulgaire, 142.

Rolliers, 142-150.

Rollulinae, 1104.

Rollulus Roulroul, 1104. Rosella, 865.

Rossignol, 349.

Rossignols, 349-355.

Rothhalsnachtschatten, 122.

Rothkehlchen, 353.

Rothschwanz -

Gartenrothschwanz, 350.

Haus- — 351.

Rouge-gorge, 353.

Rouge-queue de murailles, 350.

tithys, 351.

Ruderfüssler, 1400-1421.

RUPICOLA CROCEA, 550.

- SANGUINOLENTA, 551.

Rupicolinae, 549-551.

RUPORNIS INSECTIVORUS, 70. RUTICILLA CAIRII, 352.

- phoenicurus, 350.
- тітнуя, 351.

Säbelschnäbler, 1234.

Säbelschnäbler, 1234-1237

SAEPIOPTERUS LAZULUS, 236.

Säger, 1346-1349.

Säger, der kleine, 1349.

— der mittlere, 1347. Gänsesäger, 1346.

Sägerraken , 156.

Sai, 225.

SALTATOR ATRICEPS, 744.

- MAGNOIDES, 743.

SALTATOR MAXIMUS, 742.	Saxicolinae, 356-366.	
— similis, 745	Scansores , 857-1002.	
Sammetköpfchen, 328:	SCARDAFELLA INCA, 1047.	
Sanderling, 1247.	- squamosa, 1046.	
Sanderling des sables, 1247.	Schakuaka, 1070.	
Sandläuferchen, 1245.	Schakuhühner, 1070-1071.	
Sänger , 308-368.	Scharbe —	
Sänger — Berglaubsänger, 343.	Australische Scharbe, 1407.	
Binsenrohr- 321.	Brasilianische — 1410.	
Cisten- — 311.	Gaimard- — 1411.	
Drosselrohr- — 314.	Krähen- — 1409.	
Flussrohr- — 325.	Trauer- — 1408.	
Gartenteichrohr- — 313.	Zwerg- — 1412.	
Heuschreckenrohr- — 326.	- afrikanis-	
Meister- 336.	che, 1413.	
Nachtigallenrohr- — 318.	indische,	
Seidenrohr 319.	1414	
Sumpfrohr- — 315.	Scharben, 1406-1415.	
Tamariskenrohr- — 324.	Schattenvogel, 1194.	
Teichrohr- 316	Scheerenschnäbel, 1399.	
Uferschilf- — 320.	Scheerenschnabel — Trauer-	
Sarcelle, 1313.	scheerenschnabel, 1399.	
— commune, 1312.	Schildvogel, 537.	
— la petite, 1313.	Schirmvogel, 539.	
Sarcorhamphinae, 5-8.	Schizorhis Africana, 848.	
SARCORHAMPHUS GRYPHUS, 5.	- zonurus, 849.	
— рара, б.	Schlangenhalsvögel ,	
Satyr de Temminck, 1094.	1401-1403.	
Saumfüsse , 1278-1280.	Schlangenhalsvogel, der afrika-	
Savacou huppé, 1195.	nische, 1403.	
Savacous, 1195.	- der schwarz-	
SAXICOLA AURITA, 357.	bauchige, 1402.	
— CACHINNANS, 361.	Schlangenstörche , 1169a,	
- ISABELLINA, 360.	pag. 164.	
— LEUCOMELA, 359.	Schlegelia Wilsoni, 617.	

Schmätzer, 356-366.

Schmätzer ---

OENANTHE, 356.

STAPAZINA, 358.

Gilb-Steinschmätzer, 358.	Haus- Schwalbe, 1383.		
Grau- — 356.	Küsten-See- — 140.		
Isabell- — 360.	Nacht- — 121.		
Nonnen- — 359.	Purpur- — 141.		
Röthel- — 357.	Raub-See- — 1388		
Trauer- — 361.	Rauch- — 133.		
Wiesen-Schmätzer, braunkeh-	Schild-See 1395.		
liger, 363.	Schleppen-Nacht – 126.		
schwarz-	Senegal-Rauch- — 134.		
kehliger, 362.	Sturm- — 1352		
Schmuckelfe, 271.	Tölpel-See — die weiss-		
Schmuckvögel, 540-548.	köpfige, 1398.		
Schmutzgeier, 9-10.	Trauer-Seeschwalbe, 4390.		
Schneegans, 1294.	Ufer- — 138.		
Schnepfe —	Zwerg-See- — 1389.		
Heerschnepfe, 1250.	Schwalben, 133-141.		
Moor- — 1251.	Schwalbenwader, 1160-		
Sumpf- — die grosse, 1269.	1165		
Ufer- — die schwarz-	Schwalbenwürger, 461		
schwänzige,1218.	Schwalm — [46		
Wald- — 1252.	Papu Riesenschwalm, 120		
Schnepfen , 1248-1254.	Schwan — Höckerschwan, 1287		
Schnepfenlimose, 1248.	Sing- — 1288		
Schnepfenstrausse, 4131.	Trauer- — 1289.		
Schnepfenvögel, 1215-1254	Schwäne, 1287-1289.		
Schnirkelschweif, der grün-	Schwarzspechte, 936-951.		
bauchige, 618.	Schwarzvögel, 672-674.		
— der nackt-	Schwarzvogel —		
köpfige, 617.	Glanz- Schwarzvogel, 673.		
Schoenicola schoeniclus, 823.	Langschwanz- — 674.		
Schwalbe —	L.		
Bart-Seeschwalbe, 1391.	Schwatzdrosseln, 487-489.		
Brachschwalbe, 1160.	Schweifkitta, die geschmückte.		
— Steppen, 1161.	590.		
Feen-See- Schwalbe, 1396.	Schwertschnabel, 257.		
Felsen- — 139.	Schwimmvögel, 1287-1440.		
Fluss-See- — 1384.	Scissirostrum dubium, 643.		
•	· ·		

Scolopacidae, 1215-1254.	Seidenschwänze, 523-526.	
Scolopacinae, 1248-1254.	Sekretär, 88.	
Scolopax Rusticola, 1252.	SELASPHORUS RUFUS, 269.	
Scopinae, 4194.	Séleucide éclatante, 612.	
Scops, 106.	Seleucides ignota, 612.	
Scopus umbretta, 1194.	SEMIOPTERA WALLACEI, 613.	
Scotornis cavennensis, 127.	Sémioptère de Wallace, 613.	
- Longicaudus, 126.	Seriema, 1169ª, pag. 164.	
Scythrops géant, 1002.	Serin, 769.	
SCYTHROPS NOVAE-HOLLANDIAE,	SERINUS CANARIA, 770.	
1002.	— HORTULANUS, 769.	
Secflieger, 1350-1399.	Serpentaire, 88.	
Seeschwalbe —	Serpentaires, 88.	
Bartseeschwalbe, 1391.	Serpentariidae , 88.	
Feen- — 1396.	Serpentarius reptilivorus, 88.	
Fluss- — 1384.	Setophaga miniata, 392.	
Küsten- — 1383.	— питіснья, 391.	
Raub- — 1388.	Sialia Wilsoni, 366.	
Schild- — 1395.	Simorhynchus cristatellus,	
Tölpel- — die weissköp-	1435.	
fige, 1398.	- Kamtschaticus, 1436.	
Trauer- — 1390.	SITTA EUROPAEA, 296.	
Zwerg- — 1389.	- VARIETAS URALENSIS,	
Seeschwalben, 4383-1398.		
Seetaucher , 1422-1424.	- SYRIACA, 297.	
Segler , 129-132.	Sittich —	
Segler —	Blaukopf-Keilzchwanzsittich,	
Abyssinischer Segler, 131.	880.	
Alpen- — 130.	Halsbandsittich, 874.	
Fregatt- — 1355. Pennants Plattschweifs		
Mauer- — 129.	864	
Sturm- 4353.	Rothbauch-Plattschweifsit-	
Zwerg- — 132. tich		
Seidenschwanz, 523.	Rothkopfsittich, 875.	
Amerikanischer Seiden-	Wellen- — 870.	
schwanz, 524.	Sittinae, 296-298.	
Rothflügel 525.	Sixfilet, 620.	

a mai	000 000		
Sizerin, 761.	Spechtmeisen, 296-298.		
— à bec long, 762.	Spechtvögel, 935-970.		
— boréal, 783.	SPECTYTO CUNICULARIA, 98.		
Smaragdhuhn, 1266.	Sperber, 73.		
Somateria mollissima, 1337.	Sperling — Feldsperling, 776.		
- SPECTABILIS, 1338.	Halsband- — 778.		
Sonnenrallen , 4264.	Haus- — 775.		
Soulcie, 773.	Rothkopf- — 777.		
Sourde, 1251.	Stein- — 773.		
Spaltschnäbler, 120-203.	Sperlingspapagei, 913.		
SPATULA CLYPEATA, 1321.	Sperlingstäubchen, 1041.		
Spatule blanche, 1201.	Sperlingsvögel, 120-856.		
— rose, 1202.	Spermestinae, 691-709.		
Spatules , 1201-1202.	Spermophilinae, 798-807.		
Specht —	Spermospiza guttata, 691.		
Blauspecht, 296.	— наематі ла , 692.		
Bunt- — der grosse, 937.	SPHECOTHERES FLAVIVENTRIS, 465		
der dreizehige, 936.	Spheniscidae, 1410.		
Gelbspecht, der zimmetbrau-	Spheniscus demersus, 1440.		
ne, 957.	Sphénisque à lunettes, 1440.		
Gelbstirnspecht, 966.	Sphénisques, 1440.		
Gold- Specht, 967.	Spint — Blauwangenspint, 191.		
Goldstirn 960.	Honig- — 198.		
Grau- 953.	Scharlach- — 195.		
Grün- — 952.	Schmuck- — 196.		
— — der afrikani-	Schwalben- — 197.		
sche, 954.	Weisskehliger — 493.		
Haubenschwarzspecht, 948.	SPIZAETUS OCCIPITALIS, 33.		
Klein- Specht, 939.	- ORNATUS, 31.		
Kukuks- — 969.	TYRANNUS, 32.		
Kupfer- — 968.	Sporenkukuke, 986-991.		
Mittel- 938.	Spornflügel, der afrikanische,		
Rothkopf- — 965.	1282.		
Schwarz- — 947.	- der indische, 1283.		
Weiss- 940.	Sprachmeister, 345.		
Zwerg- — 935.	SQUATAROLA MELANOGASTER,		
Spechtmeise, 296.	1150.		
1			

Staar —	Bachstelze, die graue, 396.		
Erzbauchglanzstaar, 640.	- die weisse, 393.		
Gemeiner — 629.	Elsterstelze, 402.		
GIanz- — 634.	Graukopfstelze, 399.		
Goldglanz- — 636.	Kappen- — 398.		
Helmschnabel- — 633.	Schaf- — die gelbe,397		
Lappen- <u>—</u> 631.	Sporen- — 400.		
Pagoden- — 627.	Trauer- — 394.		
Rosen- — 624.	Stelzen , 393-413.		
Schuppenglanz- 639.	Stelzenläufer, 1235.		
Schwarz- — 630.	- der schwarzhalsige,		
Trauer- — 625.	1237.		
Staare , 623-646.	Stelzvögel , 4432-4286.		
Standartenträger, 613.	Steppenhühner, 1069.		
Stärling —	Stercoraire labbe, 1363.		
Glanzkuhstärling, 670. – parasite, 1362			
Krähen• — Montezuma,	Stercoraires, 1362-1364.		
645.	STERNA ACUTIFLAVIDA, 1387.		
Kuh- — 669. — GANTIACA, 1386.			
Reiss- — 667.	— CASPIA, 1388.		
Stärlinge, 645-674.	- FLUVIATILIS, 1384.		
STARNA CINEREA, 1100.	- MACROURA, 1383.		
Steganopodes, 1400-1421.	— мінита, 1389.		
Stéganopodes, 4400-1421.			
STEGANURA UNTERWOODI, 268.	Sterninae , 4383-1398.		
Steiger , 292-298.	Storch, der schwarze, 1197.		
Steinwälzer , 4169.	- der weisse, 1196.		
Steinwälzer, 1169. Störche , 1196-1200.			
Steissfuss —	Strandläufer, 1238-1247.		
Haubensteissfuss, 1425.	Strandläufer —		
Horn- — 1428.	Alpenstrandläufer, 1243.		
Ohren- — 1427.	Rost- — 1239.		
Rothhals- — 1426.	See- — 1240.		
Zwerg- — 1429.	Sichler- — 1242.		
Steissfüsse, 1425-1430.	Streifen- 1241.		
Stelleria dispar, 1336. Zwerg-			
Stelze —	Strauss, 1127.		

Schnepfenstrauss, der kleine, 1131.

Strausse, 1127. Straussvögel, 1127-1131. Strausswachtel, 1104.

Strausswachteln, 1104.

Streperinae, 577.

STREPSILAS INTERPRES, 4169.

Strepsilinae, 1169.

STRIGICEPS CYANEUS, 84.

- MELANOLEUCUS, 85.

Strigidae, 89-119.

Strigopidae, 926.

Strigops habroptile, 926.

STRIGOPS HABROPTILUS, 926.

STRIX FLAMMEA, 118.

- PERLATA, 119.

STRUTHIO CAMELUS, 1127.

Struthiones, 1127-1131.

Struthionidae, 1127.

Sturmvögel, 1350-1361.

Sturmvogel —

Eissturmvogel, 1357.

Polar- — 1358.

Riesen- — 1356.

STURNELLA LUDOVICIANA, 662.

— MEXICANA, 664.

- NEGLECTA, 663.

Sturnidae, 623-646.

Sturninae, 624-631.

Sturnus unicolor, 630.

- VULGARIS, 629.

Sucriers, 225-229.

SULA BASSANA, 1404.

— SERRATOR, 41405.

Sularinae, 1404-1405.

Sultanshühner, 1265-1267.

Sumpfhühnchen, das getüpfelte, 1269.

- das kleine, 1270.

Zwergsumpfhühnchen, 1271. Sumpfläufer, 1246.

SURNIA ULULA, 89.

Surninae, 89-98.

Surukus, 157-162.

Sycalis Flava, 772.

SYLVIA ATRICAPILLA, 334.

-- CINEREA, 332.

- CONSPICILLATA, 331.

- CURRUCA, 333.

- HORTENSIS, 338.

- MELANOCEPHALA, 328.

- NISORIA, 337.

- OLIVETORUM, 339.

— опрнел, 336.

- provincialis, 329.

— Кёррец, 335.

- SUBALPINA, 330.

— UNDATA, 329.

Sylvianae, 328-346.

Sylvicolidés, 385-392.

Syrmaticus Reevesi, 1084. Syrninae, 112-119.

SYRNIUM ALUCO, 112.

— LAPPONICUM, 114.

- Nebulosum, 115.

— URALENSE, 116.

Woodford, 413.

Syrrhapte, 1069.

Syrrhaptes, 1069.

Syrrhaptes paradoxus, 1069.

Syrrhaptinae, 1069.

TACHYPHONUS CRISTATUS, 727.	Mähnen- — 1063.	
- MELALEUCUS, 725.	Ringel- — 1022.	
SURINAMUS, 726.	Schopf 1057.	
TADORNA CORNUTA, 1304.	Turtel- — 1035.	
Taeniopterinae, 506.	Wander- <u> </u>	
Tageulen, 89-98.	Warzen- — 1015.	
Tagraubvögel, 1-88.	Tauben, 1003-1064.	
Talegallinae, 1075.	Täubchen —	
Tanagrella velia, 741.	Gabel- Täubchen, 529.	
Tanagridae, 710-757.	Sperlings- — 1041.	
Tanagrinae, 710-741.	Taucher, 1422-1440.	
Tangara —	Taucher —	
Palmen- Tangara, 722.	Brillenfetttaucher, 1440	
Scharlach- 713.	Eis- — 1422.	
Sommer- 714.	Krabben- — 1439.	
Würger- — 718.	Polar- — 1423.	
Tangaras , 710-757.	Rothkehl 1424.	
Tangaren , 710-757.	Sturm- — 1351	
Tantale, 1206.	Taucherhühnchen, 1278.	
Tantales, 1205-1214.	Teichhühner, 1265 1277.	
Tantalidae , 1205-1214.	Teichhuhn, das grünfüssige,	
TANTALUS IBIS, 1206.	1268.	
- LOCULATOR, 1205.	Telephorus erythropterus, 576	
TANYGNATHUS MEGALORHYNCHUS,	— viridis, 575.	
Tanysiptera nais, 171. [898.	. TEMENUCHUS PAGODARUM, 627.	
Tarin vulgaire, 766.	- sinensis, 628.	
Taube —	Tenuirostres (Passeres),	
Albertiskrontaube, 1064.	204-307.	
Dolchstich- — 1062.	TERPSIPHONE BOURBONENSIS, 499	
Elster- — 1060.	,	
Erzflügel 1059.	,	
Felsen 1020.	,	
Gewürz- — 1003.	·	
Haubenlauf- — 1054.	,	
Hohl- — 1024.	/	
Kap 1359.	· ·	
Lach- — 1040.	Tetraoninae, 1116-1126.	

Tétras, 1116-1126. *Tétras cupidon*, 1121.

- des saules, 1123.
- Rackelhahn, 1117. Textor alecto, 675.

THALASSIDROMA GRALLARIA, 1355

- LEUCORRHOA, 1353.
- OCEANICA, 1354.
- PELAGICA, 1352.

THALURANIA FURCATA, 247.

GLAUCOPIS, 248.

Thamnophilinae, 481-486. Thamnophilus cinereus, 482.

- DOLIATUS, 481.
- LEACHI, 483.

THRASAËTUS HARPYIA, 36. THRAUPIS ABBAS, 723.

- DIACONUS, 720.
- EPISCOPUS, 719.
- ORNATA, 721.
- PALMARUM, 722.
- STRIATA, 724.

TIARIS JACARINA, 787.

TICHODROMA MURARIA, 300.

Tichodrome de murailles, 300.

Tichodromes, 300.

Tichodrominae, 300.

Tichornis cenchris, 57.

Timalia Nigricollis, 487. Timneh, 902.

TINNUNCULUS ALAUDARIUS, 52.

- Newtoni, 55.
- RUFESCENS, 53.
- RUPICOLUS, 54.

Tisserins, 675-709.

TITYRA CAYANA, 527.

Tityrinae, 527-528.

Toccus Erythrorhynchus, 853. Toco, 857.

Tok, 853.

Tölpel, 1404-1405.

Tölpel, 1404.

der australische, 1405.
 Tölpelseeschwalbe, die weissköpfige, 1398.

Topaza pella, 251. Torche-pot, 296.

- de l'Oural, 296.
- des roches, 297.

Torche-pots, 296-298.

Torcol, 970.

Torcols, 970.

Tordalk, 1431.

Totaninae, 1221-1233.

Totanus calidris, 1225.

- CHLOROPYGIUS, 1224.
- FLORIDANUS, 1228.
- Fuscus, 1226.
- GLAREOLA, 1223.
- GLOTTIS, 1227.
- -- ochropus, 1222.
- SEMIPALMATUS, 1229.
- stagnatilis, 1221.

Toucans, 857-863.

Touraco commun, 846.

- le grand, 847.
- varié, 848.

Tourne-pierre, 1169.

Tourne-pierres, 1169.

Tourterelle, 1035.

Tragopan-Temmincks, 1094.

Tragopan à tête noire, 1093.

Trappe —

Denhamstrappe, 1134.

Gross-	Trappe,	1132.
Kragen-	_	1137.
Schwarzbai	ıch- —	1135.
Senegal-	NO.	4436.
Zwerg-	-	4133.
appen, 11	3 2 -1137.	
104		

Tre

Trappist, 167.

schwarzer, 166.

Traquet moteux, 356.

- oreillard, 357.
- pâtre, 362.
- stapazin, 358.
- tarier, 363.

Traquets, 356-366.

TRERON ABYSSINICA, 1011.

- AROMATICA, 1003.
- AUSTRALIS, 1007.
- CALVA, 1008.
- CURVIROSTRA, 1004.
- DELALANDI, 1009.
- NUDIROSTRIS, 1010.
- PHOENICOPTERA, 1005.
- VIRIDIS, 1006.

Treroninae, 1003-1015. TRICHAS MARILANDICA, 390. Trichoglossus concinnus, 890.

- NOVAE-HOLLANDIAE, 889.
- PORPHYREOCEPHALUS, 892
- Pusillus, 891.
- SUBPLACENS, 893.

TRICHOTHRAUPIS QUADRICOLOR,

728.

Triel, 1138.

Tringa alpina, 1243.

- CANUTUS, 1239.
- MACULATA, 1241.
- MARITIMA, 1240.

TRINGA MINUTA, 1244.

- PLATYRHYNCHA, 1246.
- SUBARQUATA, 1242.
- TEMMINCKI, 1245.

Tringinae, 1238-1247.

Tringoides hypoleucus, 1230.

var. LEU-COPTERUS, 1231.

TRIPONAX JAVENSIS, 956.

Trochilidae, 230-282.

Troglodyte, 303.

TROGLODYTES HIEMALIS, 304.

PARVULUS, 303.

Troglodytes, 303-307.

Troglodytidae, 303-307.

TROGON AURANTIUS, 159.

- CALIGATUS, 158.
- collaris, 160.
- Massena, 157.
- PUELLA, 161.

Trogonidae, 157-162.

TROPIDORHYNCHUS CORNICULATUS,

287.

MARGINATUS, 288.

Tropikvögel, 1400.

Tropikvogel, 1400.

Troupiales, 645-674.

Trupial, Rothflügeltrupial, 657.

Truthuhn, das wilde, 1095.

Truthühner, 1095.

Tschagra, 576.

Tukan — Riesentukan, 857.

Turacus gigas, 847.

PERSA, 846.

Turako, 846.

der grosse, 847.

Turdidae, 414-435.

TURDUS ILIACUS, 417.

- Musicus, 416.
- PILARIS, 415.
- Swainsoni, 418.
- viscivorus, 414.

Türkenvogel, 302.

Turnicinae, 1105-1106.

TURNIX SYLVATICA, 1105.

- NIGRICOLLIS, 1106.

TURTUR AURITUS, 1035.

- CHINENSIS, 1038.
- PICTURATUS, 1037.
- RISORIUS, 1040.
- RUPICOLUS, 1036.
- SENEGALENSIS, 1039.

Tyrannidae, 506-522.

Tyranninae, 513-522.

TYRANNUS CAROLINENSIS, 518.

- MELANCHOLICUS, 519.
- SATRAPA, 520.

Tyrans, 506-522.

Uferläufer – Drosseluferläufer, 1232.

Flussuferläufer, 1230.

Uterschnepten, 1215-1220. Uhu, 99.

bengalischer, 102. nordamerikanischer, 101. südafrikanischer, 100.

Ultramarinblauvogel, 226. Upupa epops, 204.

- MARGINATA, 206.
- senegalensis, 205.

Upupidae, 204-210.

Uragus sibiricus, 798. Uranomitra cyanocephalus,

249.

- Franciae, 250.

Uria Grylle, 1437.

- TROILE, 1438.

Uriidae, 1437-1439.

Urinatores, 1422-1440.

Urolampra tyrrianthina, 266.

Vanellus cristatus, 1141. Vanga curvirostris, 572. Vanneau huppė, 1141.

- pluvier, 1150.
- social, 1142.

Vautour alimoche, 9.

- arrian, 2.
- chasse-fiente, 4.
- griffon, 3.

Vautours, 2-11.

Venturon, 768.

Verderolle, 315.

Verdier, 771.

VIDUA LATICAUDA, 690.

- PRINCIPALIS, 688.
- VERREAUXI, 689.

Viduanae, 688-690.

VIREO OLIVACEA, 552.

VIREOLANIUS PULCHELLUS, 553.

Vireonidae, 552-557.

Virconinae, 552-556.

Vocifer, 39.

Vögel, 1-1440.

VULTUR MONACHUS, 2.

Vulturidae, 2-11.

Wachtel, 1101. australische- Wachtel, 1102.	Weichschwanzspechte, 935.				
Baum- — 1107.	Weihe — Frosch- Weihe, 83.				
Gambels Schopf- 1111.	Korn- — 84.				
Kalifornische Schopfwachtel,	Rohr- — 82.				
1110.	Schwalben- — 64.				
Strausswachtel, 1104.	Steppen- 87.				
Wachtelkönig, 1263.	Sumpf- — 82.				
Waldhühner , 1098-1126.	Wiesen- — 86.				
Waldsänger, 385-392.	Weihen, 82-87.				
Wasserhuhn, 1275.	Wendehals, 970.				
Riesenwasserhuhn, 1297.	Wendehälse, 970.				
Wasserhühner, 1275-1277	Widavögel, 688-690.				
Wasserläufer, 1221-1233.	Wiltwe - Breitschwanzwittwe,				
Wasserläufer —	690.				
dunkler Wasserläufer, 1226.	Würger, 558-576.				
Gambett- — 1225.	Würger —				
heller — 1227.	Halsband- Würger, 566.				
Hochland- — 1233.	Hesperiden- — 563.				
punktirter — 1222.	kleiner Grau 562.				
Schwimm- 1229.	Masken- — 567.				
Teich- — 1221.	Raben- — 569.				
Wald- — 1223.	Raub- — 561.				
Wasserscherer, 1350.	Rothkopf- — 564.				
Wasserschwätzer, 436-438	Rothrückiger – 565.				
Wassertreter, 1255-1256.	weissschnäbliger				
Wassertreter —	Schwalben- 461.				
Pfuhlwassertreter, 1255.	Zweifarbenblau- 464.				
Weber —	Wüstenläufer, 1164.				
Alecto- Weber, 675.					
Feuer- — 684.	11				
Masken- — 685.					
Rothschnabel - 680.	Xanthomelinae, 622.				
Vieh- — 676.	XANTHOMELUS AUREUS, 622.				
Webervögel, 675-709.	XANTHOMISIS ZOSTEROPS, 445.				
Wehrvögel, 1285-1286. Wehrvogel, der graue, 1286.	XANTHOSOMUS ICTEROCEPHALUS, 661.				

XEMA ATRICILLA, 1374.

- CIRRHOGEPHALA, 1377.
- MELANOCEPHALA, 1375.
- РИПЛАВЕННИЯ, 1378.
- РОГОСЕРНАТА, 1376.
- RIDIBUNDUM, 1373.
- sp. x, 1379.

XIPHOLENA POMPADORA, 533. XIPHORHYNCHUS TROCHILIIROS-

TRIS, 293.

YPHANTES BALTIMORE, 656. **YUNGINGE**, 970. YUNX TORQUILLA, 970.

Zahnschnäbler, 308-576. Zanclostomus Tristis, 973. Zaunkönig, 303.

Winterzaunkönig, 304.

Zaunkönige, 303-307.

Zeisig — Erlen- Zeisig, 766. Zitronen- — 768.

ZENAIDA LEUCOPTERA, 1048.

- sp. x, 1049-1050.

Zigeunerhühner, 1074. Zonotrichia sp. x, 784. Zosterops haesitata, 290.

- MADAGASCARIENSIS, 291.
- SENEGALENSIS, 289.

Zuckervögel, 225-229.

Zusätze und Druckfehler-Berichtigungen.


No	8	lies	Burroviana	statt	Bu	irrowiana.
))	9))	Alimoche))	A	linoche.
))	170))	Gaudichaudi))	G	audichandi.
))	180	>>	caeruleocephal	a »	ca	aeruleo cephala.
))	198))	Melittophagus	>>	M	elithophagus.
))	243))	Argyrtria))	A	rgytria.
))	249))	cyanocephala))	cy	anocephalus.
))	256	D	Entima))	E	utima.
» ²	292-29	5 »	Dendrocolaptic	ae »	D	entrocoloptin <mark>ae.</mark>
))	309))	Gray))	C	ray.
))	333))	curruca))	cı	rucca.
))	409	fehl	t der * vor der N	lumm	er.	
))	415	lies	Wachholderdros	ssel s	tatt	Misteldrossel.
))	425))	thenca))	theuca.
))	472))	Forsten))	Forster.
))	524))	cedrorum))	gedrorum.
))	592))	Cryptorhina))	Crypsirhina.
))	598))	vom Amur))	von Amur.
))	841))	Horsf.))	Harsf.
))	1105))	hühnchen))	hähnchen.
))	1106))	$\mathbf{d}^{\mathbf{o}}$))	do.
))	1008))	vom Senegal))	von Senegal.
))	1119	fehl	t nach Elsass ein	1?		
))	1121	lies	Jowa	S	latt	Java.

Bei folgenden Nummern sollte die Anmerkung beigefügt sein, dass die betreffenden Arten auch schon im Elsass vorgekommen wären:

130 (Cypselus melba), 1164 (Cursorius gallicus), 1166 (Haematopus ostralegus), 1169 (Strepsilas interpres), 1203 (Phoenicopterus antiquorum), 1219 (Limosa lapponica), 1223 (Totanus glareola), 1234 (Recurvirostra avocetta), 1337 (Somateria mollissima), 1340 (Oidemia nigra), 1341 (Oidemia fusca), 1426 (Podiceps griseigena).







SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 7088 00338192 8

nhbird QL677.2.S35

Katalog der v?ogel welche im Naturhistor